

# **MITTHEILUNGEN**

**ÜBER DIE**

**MORGENLÄNDISCHE BRECHRUHR.**

---

Hoff



MITTHEILUNGEN

VON DER

MORGENLÄNDISCHE BRECHUNG



# MITTHEILUNGEN

ÜBER DIE

MORGENLÄNDISCHE BRECHRUHR,

VON

VICTOR ADOLF RIECKE,

Dr. M.

Zweiter Band.

STUTT GART,

bei Carl Hoffmann.

1 8 3 1.



MITTHEILUNGEN

ÜBER DIE

MORGENLÄNDISCHE BRUCHUNGEN

VON

VICTOR ADOLF NIECKE

Dr. M.

**Opinionum commenta delet dies, naturae iudicia confirmat.**  
**Cicero.**

Zweiter Band.

STUTTGART

bei Carl Hoffmann.

1834




Indem wir den vorliegenden Band dem  
 ärztlichen Publikum übergeben, können wir  
 nicht unterlassen, die Bitte um Nachsicht gegen  
 die Mängel unserer Arbeit, die schon beim er-  
 sten Bande in Anspruch genommen und dem-  
 selben auch zu Theil wurde, zu wiederholen.

Stuttgart, im Mai 1831.

Der Verfasser.

# V o r w o r t.



Der Umfang, zu welchem die im vorliegen-  
 den zweiten Bande der Mittheilungen über die  
 morgenländische Brechruhr enthaltenen Ab-  
 schnitte wider Vermuthen angewachsen sind, be-  
 stimmt uns, die Untersuchungen über die Ur-  
 sachen dieser Seuche und über ihre Kontagio-  
 sität für einen dritten Band, zu dem auch schon  
 noch weitere Materialien bereit liegen, zurück-  
 zubehalten. Bei dem mit jedem Tage sich stei-  
 gernden Interesse des Gegenstandes wird diese  
 Erweiterung unsers Unternehmens keiner Ent-  
 schuldigung bedürfen.



Indem wir den vorliegenden Band dem ärztlichen Publikum übergeben, können wir nicht unterlassen, die Bitte um Nachsicht gegen die Mängel unserer Arbeit, die schon beim ersten Bande in Anspruch genommen und demselben auch zu Theil wurde, zu wiederholen.

Stuttgart, im Mai 1831.

Der Verfasser.



## Inhaltsübersicht des ersten Bandes.

---

**Ei[n]leitung.** S. 1 — 10.

Allgemeine Bemerkungen über weit verbreitete Seuchen.

S. 1. — Symptome der morgenländischen Brechruhr. S. 3.

Leichenerfund bei den an dieser Krankheit Gestorbenen.

S. 7. — Frühere Brechruhrepidemien. S. 9. —

**Geschichte der neuesten Brechruhrepidemie.**

Anfang derselben. S. 10. — Ausbreitung der Krankheit in

Indien. S. 13. — Die Cholera auf der Morizinsel und Bour-

bon. S. 36. — Verbreitung der Krankheit gegen Osten. S.

38. — Westliche Verbreitung derselben. S. 47. — Die Cho-

leraseuche am persischen Meerbusen. S. 48. — Ihre Ver-

breitung durch Mesopotamien und Syrien. S. 55. — Ihr

Zug durch Persien. S. 59. — Ihr erstes Erscheinen im rus-

sischen Reiche. S. 67. — Brechruhrepidemie in Astrachan

1823. S. 74. — Die Brechruhr in den Jahren 1824 bis 1829.

S. 101. — Die Epidemie im Orenburgischen Gouvernement

im Winter 1829 auf 1830. S. 105. — Die Cholera in Per-

sien im Jahr 1829. S. 111. — Ihre Verbreitung durch das

russische Reich. S. 111. — Die Cholera in Moskau. S. 121.

— Ansichten der russischen Aerzte über die Ansteckungs-  
fähigkeit der Krankheit. S. 132.

**Beilagen.** S. 139 — 174.

I. Kurze Anweisung zur Heilung der unter dem Namen Cho-  
lera morbus bekannten Krankheit, verfasst von dem Peters-  
burger Medicinalrath. S. 139.

II. Bericht des Grafen Sakrewski an den Kaiser vom 9. Sept.  
1830. S. 152.

III. Bekanntmachung des Grafen Sakrewski in Betreff der  
morgenländischen Brechruhr. S. 165.

---



## **Inhaltsübersicht des zweiten Bandes.**

---

### **I. Weitere Nachrichten über die Verbreitung der morgenländischen Brechruhr. S. 1 — 88.**

Die Brechruhrepidemie im Orenburgischen Gouvernement im Winter 1829 auf 1830. S. 4. — Nachrichten über die Brechruhrepidemie im Astrachan'schen Gouvernement im Sommer 1830. S. 52. — Tagebuch des Pastors Huber in Saratow über die dortige Brechruhrepidemie. S. 57. — Weitere Nachrichten über die Brechruhrepidemie zu Moskau. S. 76.

### **II. Von den Symptomen und dem Verlaufe der morgenländischen Brechruhr, nebst Andeutungen über ihr Verhältniss zur gewöhnlichen Brechruhr und über das Wesen der Krankheit. S. 89 — 158.**

### **III. Von den Ergebnissen der Leichenöffnungen. S. 159 — 182.**

### **IV. Von der Behandlung der morgenländischen Brechruhr. S. 183 — 297.**

#### **Beilagen.**

A. Amtliche Untersuchung über die Ansteckung der Cholera durch Waaren. S. 298.

B. Instruktion für die österreichischen Sanitätsbehörden und Kontumazanstalten in Betreff der morgenländischen Brechruhr. S. 306.

---



## I.

### Weitere Nachrichten über die Verbreitung der morgenländischen Brechruhr.

---

**U**eber die weitere Verbreitung der mörderischen Seuche können wir glücklicherweise nicht viel berichten. So schnell dieselbe auch während des Sommers 1830 einen ungeheuern Länderstrich ihrem vernichtenden Scepter unterwarf, so verhielt sie sich doch seit dem Spätherbst sehr ruhig, sei es nun, dass durch die von der russischen Regierung getroffenen Maassregeln, oder durch die Kühle des Herbstes und die Kälte des Winters, die übrigens, so viel wir wissen, in Russland nicht besonders heftig war, ihren Verheerungen ein Ziel gesetzt wurde.

In folgender Uebersicht haben wir alle Provinzen des russischen Reiches zusammengestellt, in denen während des Jahres 1830 die Brechruhr sich gezeigt:

Die an Persien gränzenden Provinzen jenseits des Kaukasus: Schirvan und Georgien (Grusien);



diesseits des Kaukasus, die Provinz Daghestan; sämtliche vier Gouvernements des Astrachanschen Königreichs: Kaukasien, Astrachan, Orenburg, Saratow.

Im Königreich Khasan kam die Brechruhr vor in den Gouvernements Khasan, Pensa und Simbirsk. Die zwei nördlichen Gouvernements Wjätka und Perm blieben verschont.

In Grossrussland kam die Krankheit vor in den Gouvernements Moskau, Twer, Nowgorod, Wologda, Jaroslaw, Kostroma, Wladimir, Nishnei-Nowgorod, Tambow, Tula, Kaluga, Woronesch, Kursk. Verschont blieben die Gouvernements Archangel, Pskow, Olonez, Smolensk, Riäsan und Orel; eben so sämtliche Ostseeprovinzen des russischen Reiches.

In Kleinrussland herrschte die Brechruhr in den Gouvernements Kiew, Pultawa und Slobod-Ukrainsk. Das Gouvernement Tschernigow blieb verschont.

In sämtlichen Gouvernements von Neurussland: Jekaterinoslaw, Kherson, Taurien, Bessarabien und im Lande der Donischen Kosaken kam die Krankheit vor.

Die vormals polnischen und littauischen Provinzen blieben verschont, mit Ausnahme Volhyniens und Podoliens, von wo aus die Krankheit bereits die Grenzen Russlands überschritten hat, und in Galizien eingedrungen ist. Nachdem die Krankheit seit längerer Zeit in dem an der Gränze Galiziens gelegenen russischen Städtchen Satanow geherrscht hatte, erschien sie gegen Ende Decembers 1830 auch in dem Tarno-



poler Kreise Galiziens. Nach den neuesten Nachrichten erkrankten seit dem Ausbruch der Krankheit, vom 23. Dec. bis 29. Jan. 1831 in den Dörfern Kalaharowska, Wychwatynce, Wolika und Touste im Ganzen 24 Personen, von denen 13 ein Opfer der Krankheit wurden. Durch die schnellen und energischen Maassregeln der Regierung, schleunig angewandte ärztliche Hülfe und strenge Sperre der genannten Ortschaften, so wie durch Unterstützung der Einwohner mit Lebensmitteln wurde die Krankheit im Tarnopoler Kreise wieder völlig unterdrückt, und es ist zu hoffen, dass die getroffenen Maassregeln auch im Czortkower Kreise, wo sich die Cholera im Anfang Januars einstellte, denselben glücklichen Erfolg haben werden. In dem letztern Kreise erkrankten vom 3. bis 30. Januar im Ganzen 172 Personen an der Brechruhr, in der Stadt Hussiatyn 95, im Dorfe Szydlowce 27, in Olchowczyk 21, in Siekierzynce 17, in Sidorow 12. Von diesen 172 Personen waren gestorben 98, wiedergenesen 67, und nur 7 waren am 30. Januar noch krank \*).

Was die Verheerungen der Brechruhr im russischen Reiche betrifft, so sind sie nicht so bedeutend, als man bei ihrem ausgedehnten Verbreitungsbezirke erwarten sollte, indem sich die Krankheit über einen Länderstrich von mehr als fünfzigtausend Quadratmeilen mit einer Bevölkerung von etwa 30 Millionen ausbreitete. Nehmen wir auch die Zahl der an der Brechruhr Gestorbenen in Russland auf siebenzig bis acht-

---

\*) Oesterreichischer Beobachter. 1831. Nro. 53.



zigtausend an, was übrigens, so weit aus den freilich mangelhaften Nachrichten hervorgeht, leicht das Doppelte von der wirklichen Zahl sein könnte, so starb in den von ihr heimgesuchten Theilen von Russland doch nur ungefähr der vierhundertste Theil der Bevölkerung. Der Orte, wo die Brechruhr heftig wüthete, sind im Ganzen nur wenige; in manchen Gouvernements wurden auch nur einige wenige Dörfer oder Städte von der Krankheit heimgesucht, während die übrigen vollkommen gesund blieben. Mit einer Zusammenstellung der an einzelnen Orten Erkrankten und Gestorbenen, wozu die Zeitungen in den jüngst verflossenen Monaten eine Menge Materialien lieferten, wollen wir unsere Leser nicht ermüden, um so mehr, da dieselbe doch nur sehr unvollständig ausfallen könnte; dagegen wollen wir einige Brechruhr-Epidemien, über die wir genauere Nachrichten besitzen, einer ausführlicheren Betrachtung unterwerfen, nämlich die Epidemie im Orenburg'schen Gouvernement im Winter 18<sup>29</sup>/<sub>30</sub>, die Epidemie im Astrachan'schen Gouvernement, die in Saratow, beide im Sommer 1830, und die in Moskau im Winter 18<sup>30</sup>/<sub>31</sub>.

1. *Die Brechruhr-Epidemie im Orenburg'schen Gouvernement im Winter 1829 auf 1830.*

Ueber diese Epidemie hat der Medicinalrath zu St. Petersburg eine eigene Schrift unter dem Titel: *Sammlung von Aktenstücken und Verordnungen, bezüglich auf die zu Ende 1829 und zu Anfang 1830 im Orenburg'schen Gouvernement gewesenen Cholera*, herausgegeben vom Medicinalrathe. St. Petersburg 1830. (298



S. 8. mit einer Karte.) in russischer Sprache herausgegeben, und sich dadurch kein geringes Verdienst erworben. Professor Dr. J. R. Lichtenstädt hat jene Aktenstücke (mit einigen Abkürzungen) in's Deutsche übersetzt, und dieselben in seinem Buche: *Die asiatische Cholera in Russland in den Jahren 1829 und 1830*, (Berlin 1831) mitgetheilt. Die Aktenstücke (42 an der Zahl) sind theils ärztliche Berichte und Gutachten, von denen ein Paar sehr schätzbar sind, theils Beschlüsse des Petersburger Medicinalraths, die sich auf die genannte Epidemie beziehen. Es kann nicht unser Zweck sein, die vorliegenden Aktenstücke einer Kritik zu unterwerfen, indessen können wir uns nicht enthalten, auf einige Mängel, die bei der Bekanntmachung derselben hätten vermieden werden sollen, aufmerksam zu machen, obgleich wir nicht im geringsten verkennen, wie sehr man dem Medicinalrath sowohl als dem Uebersetzer für diese Mittheilungen verpflichtet ist. Bei Aktenstücken ist man mit Recht auf die grösste Genauigkeit gefasst; in den vorliegenden findet man Ungenauigkeiten, die leicht zu vermeiden gewesen wären. Eine nicht geringe Anzahl derselben ist ohne Datum, bei andern scheint dasselbe unrichtig angegeben zu sein. Wären in den Aktenstücken keine Widersprüche vorhanden, so hätte dieser Mangel wenig zu sagen; aber es kommen nicht selten welche vor, die sich zum Theil gewiss aufklären liessen, wenn das Datum überall richtig angegeben wäre, oder wenn sämtliche Aktenstücke wären bekannt gemacht worden \*). Nicht einmal der Ort,

---

\*) Nach den Vorbemerkungen des Medicinalraths könnte man



wo die Berichte abgefasst wurden, und wo der Berichterstatter seine Beobachtungen machte, findet sich überall angegeben; auch hierdurch könnte sich manches Widersprechende lösen. Es kommen namentlich in Beziehung auf die Verbreitung der Krankheit direkt entgegengesetzte Behauptungen vor, bei deren Wichtigkeit man voraussetzen darf, dass man sich alle Mühe gegeben hat, etwas Sicheres in Erfahrung zu bringen. Wüsste man, welcher Arzt an Ort und Stelle sich erkundigen konnte, so würde man ihm mehr Glauben schenken, als einem Andern, der nur nach Hörensagen urtheilte. Besonders wichtig wäre es auch zu wissen, welche Berichte während, und welche erst nach Beendigung der Epidemie abgefasst sind, indem letztere offenbar mehr Beachtung verdienen, da ihnen eine längere Beobachtung und eine ruhigere Beurtheilung des Beobachteten zu statten kommt. Es ist nicht zu zweifeln, dass der Petersburger Medicinalrath sich über einige auffallende Widersprüche Aufklärungen verschaffte, die in den nicht bekannt gemachten Aktenstücken begraben liegen, und die wenigstens auszugsweise den bekannt gemachten hätten beigefügt werden dürfen. Wer die Schrift mit Aufmerksamkeit durchliest, und die Stellen, welche sich auf denselben Gegenstand beziehen, mit einander vergleicht, der wird leicht Belege zu den vorstehenden Bemerkungen finden können; einige wird man

---

erwarten, dass er alle, die Orenburger Epidemie betreffenden Aktenstücke bekannt gemacht habe; indessen sieht man aus den vorliegenden, dass sie nur ein Theil der betreffenden Aktenstücke sind, indem in denselben öfters andere, nicht aufgenommene citirt sind.



auch in der folgenden Schilderung der Orenburger Epidemie berührt finden, in welcher das Wichtigste aus den Berichten der Orenburger Aerzte zusammengestellt ist. In Beziehung auf die darin vorkommenden Daten müssen wir noch bemerken, dass Lichtenstädt nirgends angibt, ob er dieselben nach dem russischen Kalender aufgezeichnet, oder in unsern Kalender übersetzt hat. Aus einer Vergleichung mit andern Nachrichten ersehen wir, dass ohne allen Zweifel das Erste der Fall ist; und wir haben desshalb der Gleichförmigkeit wegen die Daten nach dem bei der abendländischen Christenheit gewöhnlichen Gregorianischen Kalender beigefügt.

---

Die Orenburger Epidemie begann in der Stadt Orenburg, zu Anfang des Septembers 1829. Dieselbe liegt unter  $51^{\circ} 45'$  N. B. und  $72^{\circ}$  Länge in einer grossen, ganz offenen und waldlosen Ebene, welche durch die Vereinigung der Flüsse Sakamara und Ural gebildet wird, auf den steilen hohen Ufern des letztern. Auf dem linken gegenüberliegenden Ufer breitet sich die bis zum Kaspischen Meere sich hinabziehende Steppe aus, auf der die Kirgis-Kaisaken ihr nomadisches Leben führen. Die Lage des Orts ist ziemlich gleich und eben, der Boden ist lehmichtsandig und trocken. Die Strassen sind gerade und ziemlich breit, die Häuser in der Stadt grösstentheils, in den beiden Vorstädten durchaus, von Holz, das feucht und oft halb verfault ist.



Die Zahl der Einwohner beträgt 11,000 \*), worunter 6000 dem Militärstande angehören. Man bedient sich des reinen, hellen und ganz geschmacklosen Wassers aus dem Ural und aus zwei oder drei guten Brunnen. Dieselbe Annehmlichkeit hat man auch in den Nahrungsmitteln und den übrigen unentbehrlichen Bedürfnissen des Lebens; in wenigen Gegenden sind Waizen, Fische, Fleisch so wohlfeil; ein Stück schwarzes Brod ist in der Hütte des Landmanns eine eben so grosse Seltenheit, wie ein Stück weisses anderwärts, und das Fleisch macht bei seiner Wohlfeilheit auch die gewöhnliche Nahrung des gemeinen Mannes aus.

Die Einwohner Orenburgs und der Umgegend bilden ein wunderliches Gemisch von Menschen von verschiedenem Charakter, Sprache, Sitten und Glauben. Der russische Bauer, der Kosak, der verabschiedete Soldat und die Soldatenkinder \*\*), der Tartar, der Baschkir, der Metscheräk \*\*\*) und der Teptär theilen freundlich unter sich die grosse Ebene, der eine zum Landbau, der andere zur Pferdeweide. Da die Stände der Kosaken, der Soldatenkinder, der Teptären und Baschkiren von den gewöhnlichen Kronabgaben befreit sind und die Hälfte ihres Lebens im

---

\*) Hiernach ist die Bevölkerungsangabe im ersten Bande S. 105 zu berichtigen.

\*\*) Alle Kinder der Soldaten, zumal die männlichen, bilden in Russland gleichsam einen eigenen Stand. Die Knaben sind sämmtlich, insofern sie körperlich dazu geeignet sind, zum Soldatenstande bestimmt.

\*\*\*) Die Metscheräken gehören zu den nomadischen Völkern, welche dem russischen Scepter unterworfen und verpflichtet sind, eigene meistens unvollkommen disciplinirte Truppen zu stellen.



Liniendienste, auf dem Pferde und auf Vorposten zubringen, aber zu Hause wenig für sich arbeiten, so werden sie unmerkbar von einer sorglosen Gleichgültigkeit in Beziehung auf Arbeitsliebe und Thätigkeit ergriffen. Dasselbe gilt auch vom Stande der Tartaren, die sich ausschliesslich dem Handel, der Liebe zu den Weibern und dem Müssiggange ergeben. Aus dieser Quelle entstehen nicht nur sehr viele, oft sehr schneidende Fehler im sittlichen Charakter der dortigen Einwohner, sondern auch eine gewisse allgemeine, sehr bemerkbare physische Erschlaffung, die den Grund zu dem häufigen Vorkommen von asthenischen Krankheitsformen abgibt. Oft erzeugen drei bis vier Anfälle eines einfachen Fiebers bei einem Kosaken oder Baschkiren eine Wassersucht, gewöhnlich Brustwassersucht. Vermöge ihrer gesunden Lage, ihrer Regelmässigkeit und Reinlichkeit bietet die Stadt Orenburg nach Hofrath Reissner nicht die geringste Geneigtheit zur Erzeugung der Brechruhr in sich dar; man könne, sagt er, zur Erhaltung der menschlichen Gesundheit keine bessere Ortslage wünschen, was sich aus den wenigen und nur selten daselbst herrschend werdenden endemischen Krankheiten ergebe, so wie aus dem hohen Alter, das viele Einwohner erreichen. Dabei ist übrigens doch auffallend, dass nach dem Berichte des Staabsarztes Sokolow fast alljährlich eine grosse Menge Vieh, besonders Hornvieh, durch Seuchen weggerafft wird, über deren Natur er indessen nichts Näheres angibt \*).

---

\*) Bekanntlich kommen in diesen Gegenden der Milzbrand



Die Angaben über die Zeit des Ausbruchs der Cholera-Epidemie in Orenburg stimmen nicht ganz überein. Der Staabsarzt Smirnow, der den ersten Cholerakranken in Behandlung bekam, gibt den 26. August (7. Sept.) 1829 an. »An diesem Tage,« sagt er in seinem Berichte an den Petersburger Medicinalrath vom  $18/30$ . Sept., »kam in das mir anvertraute Hospital der Gemeinde Andreas Iwanow mit folgenden Zufällen: häufiges galliges Erbrechen, Durchfall, unerträglicher Leibschmerz, Durst, eingefallenes Gesicht, blaue Lippen, eine mit gallichtem Schleime bedeckte Zunge, Kälte der obern wie der untern Gliedmaassen und schmerzhaft Krämpfe in denselben, fast unmerklicher Puls, ungemein plötzliches Sinken der Kräfte und ausserordentliche Angst. Diese Krankheit wurde als Darmentzündung angesehen. Man entzog dem Kranken ein Pfund Blut, und verordnete ihm innerlich einhüllende Mittel und Calomel; ein versüßtes Getränk wurde gereicht, und auf den Unterleib fünfzehn Blutigel gesetzt. Nach dem Aderlasse veranstaltete man ein warmes Bad, und legte auf den Unterleib warme aromatische Umschläge. Ohnerachtet dieses Beistandes verschied der gefühllose und mit kaltem Schweisse bedeckte Kranke um 9 Uhr Abends. (Wann die Krankheit angefangen, ist nicht angegeben.) Man machte schon damals die Bemerkung, dass Darmentzündung in so hohem Grade in dem Hospital fast nie vorgekommen sei. Bei Eröffnung des Leichnams

---

und Karbunkel nicht selten vor; ohne Zweifel bezieht sich die Angabe Sokolows von alljährlichen Viehseuchen auf den Milzbrand.



wurde in der Kopf- und Brusthöhle nichts Krankhaftes bemerkt. Magen und Gedärme wurden stark entzündet und stellenweise brandig gefunden \*); in der Unterleibshöhle zeigte sich bei der Gallenblase ein Austritt von Galle; in der Harnblase war gleichfalls Entzündung, aber ziemlich leicht und mehr oberflächlich; in den übrigen innern Theilen war keine Verderbniss.»

Nach demselben Berichte wäre bis zum  $\frac{9}{21}$ . Sept. kein ähnlicher Krankheitsfall mehr vorgekommen, was sich übrigens nur auf das Hospital bezieht. Denn nach dem Berichte des Staabsarztes Sokolow starb acht Tage nach dem Andreas Iwanow nach kurzer Krankheit die Frau des Kassenbeamten Wladmirow;

---

\*) Lichtenstädt bemerkt hierbei mit Recht: „Ob hier wirkliche Entzündung gewesen sei, bleibt sehr zweifelhaft, da keine genauere Merkmale davon angegeben werden, und es in der That sehr schwierig ist, wirkliche Entzündung in den Darmhäuten von den vielen wirklich oder scheinbar verwandten Zuständen zu trennen, die ohne genaue Kenntniss der neuern anatomischen Forschungen leicht verwechselt werden können. Man glaubt Entzündung im Leben beobachtet zu haben, und so findet man leicht, was man zu finden wünscht und hofft. Ueberhaupt ist Entzündung ein Zustand, der nicht in wenigen Stunden eine volle Ausbildung erhalten kann, während Congestion sich schnell zu bilden vermag; ein Krankheitsfall, der binnen wenigen Stunden verläuft, kann daher schwerlich die Spuren einer starken Entzündung hinterlassen. Freilich ist hier nicht gesagt, ob der Kranke bald nach seinem Erkranken ins Hospital gebracht worden; es könnte also der Zustand viel älter sein, als die Erzählung angibt, und insofern eine Entzündung möglicherweise getroffen worden sein. (Da man übrigens dem Kranken noch ein ganzes Pfund Blut herauslassen konnte, so möchte nicht anzunehmen sein, dass die Krankheit lange vor der Aufnahme in das Hospital ihren Anfang genommen hatte.) Auch ob das, was als Brand angegeben wird, wirklich ein solcher gewesen, bleibt zweifelhaft.“



aus der von dem Letztern gemachten Beschreibung ihrer Krankheitszufälle schloss Sokolow, dass dieselbe höchst wahrscheinlich ein Opfer der Cholera geworden sei. Ein weiterer Brechruhrfall kam wieder nach einer Woche im Hause des Kriegsgouverneurs Essen vor; ein Leibeigener desselben, der Tischler Iwan Andrianow, wurde den  $\frac{8}{20}$ . Sept. um zwei Uhr in der Nacht von der Krankheit befallen; sie begann mit einem furchtbaren, jede Minute wiederkehrenden Durchfall. Obgleich es kalt und feucht war, so ging doch der Kranke zur Befriedigung seines Bedürfnisses immer wieder an die offene Luft, ohne alle Vorsicht, barfuss und entkleidet. Am Morgen um fünf Uhr war er schon ohne Gefühl und ohne Kräfte, in Krämpfen. Um sechs Uhr fand ihn Sokolow wieder bei Besinnung, aber mit eingefallenen, blassblauen Backen, die Augen waren trübe, Hände und Füße kalt, mit klebrigem Schweisse bedeckt. Der Kranke warf sich hin und her, klagte über Zittern der Hände und Füße, Druck in der Herzgrube und unerträglichen Durst. Das Erbrechen, welches sich nach seiner Aussage viel später als der Durchfall eingestellt hatte, war jetzt seltener, aber die Ausleerungen nach unten dauerten fort; nur bemerkte der Kranke sie nicht. Der erschöpfte Zustand des Kranken, besonders der durchaus unfehlbare Puls- und Herzschlag, die Erstarrung der Gliedmaassen, die Kälte der Zunge, des Leibes und der Präcordien liessen nicht die geringste Hoffnung zur Rettung. Die Anwendung von Mohnsaft mit Pfeffermünzöl und Schwefeläther innerlich und schleimiges Getränk hemmten nur auf kurze Zeit das Erbrechen. Stärkeklystiere mit Laudanum wurden zweimal



ohne Erfolg gegen den Durchfall angewendet. Weder das Reiben mit warmen Tüchern und aufregenden geistigen Flüssigkeiten, noch ein warmes Bad vermochten den Pulsschlag wieder zu beleben, oder dem Körper die Wärme wieder zu geben. Der Versuch, Blut zu lassen, war vergebens, und kam zu spät; in zwölf Stunden starb der Kranke. Es vergingen etwa zwanzig Minuten nach dem letzten Athemzuge — schon waschte man den Todten und kleidete ihn an — als auf einmal in der aufgedeckten Leiche ungewöhnliche, alle Umstehenden entsetzende Bewegungen ausbrachen. Es waren offenbar in Händen und Füßen sich wiederholende Krämpfe, deren Aehnlichkeit mit den durch die Anwendung des Galvanismus auf die entblösten Nerven hervorgebrachten nach Sokolow sehr deutlich war. Zuerst begannen schwache krampfhaft Bewegungen in einem oder zwei einzelnen Bündeln von Muskelfasern, besonders im Halse und im Schenkel, und diese Bewegungen, wurmförmig sich verbreitend, erstreckten sich plötzlich auf viele, wobei der Kopf sich bog, die Füße geschüttelt, einigemal gebogen, und dann in die Höhe gehoben werden. Die Krämpfe dauerten mit Zwischenräumen zehn Minuten fort, und wurden zuletzt ruhiger und seltener. Diese Erscheinung wurde später, nur in geringerem Grade, noch einmal an einem an der Brechruhr im Orenburgschen Hospitale Verstorbenen sechs bis sieben Stunden nach dem Ende der Krankheitserscheinungen bemerkt.

Am folgenden Tage wurde Nachts um elf Uhr der Gemeine Balandin von demselben Bataillon wieder oben erwähnte Jwanow und mit denselben Krank-



heitserscheinungen, die an diesem beobachtet worden waren, in das Hospital gebracht. Auch diessmal wurde die Krankheit für Darmentzündung gehalten, und gleich dem ersten Falle behandelt. Bei dem Aderlass floss nur wenig, etwa drei Unzen, Blut, daher wurden zwanzig Blutigel an den Leib gesetzt. Um fünf Uhr Nachmittags des folgenden Tags war Patient eine Leiche.

Am Todestage Balandins ( $10/22$ . Sépt.) kamen noch zwei Personen niedern Standes mit derselben Krankheit in das Hospital. Nun entstand der Verdacht, man möchte es mit der morgenländischen Brechruhr zu thun haben. Der Staabsarzt Smirnow entschloss sich daher, diese Kranken nach der vom Medicinalrathe zu Petersburg erlassenen (im ersten Bande Beilage I mitgetheilten) Anweisung über die Behandlung der Cholera zu behandeln, um so mehr, wie er sagt, »als man diese Behandlung auch in den gewöhnlichen Entzündungen ohne Nachtheil anwenden könne (?).« Beiden Patienten liess man zur Ader; da aber das Blut nicht fliessen wollte, setzte man die Kranken auf einige Minuten in ein warmes Bad. Nachdem man sie aus demselben genommen hatte, bemühte man sich abermals eine Blutentziehung zu veranstalten, aber ohne Erfolg; daher setzte man, nachdem man den Kranken zehn Gran versüßtes Quecksilber, und darauf vierzig Tropfen Opiumtinktur mit zwanzig Tropfen Pfeffermünzöl in Wasser gereicht hatte, an den Unterleib 20 Blutigel, bestrich die Präcordien mit flüchtigem Salmiakgeist, bedeckte den ganzen Körper mit warmen Decken, legte auf den Unterleib nach dem Abfallen der Blutigel warme aromatische Umschläge



und setzte Stärkeklystiere. Die Arznei wurde nach der ersten Gabe durch Erbrechen ausgeleert, und darauf die Gabe wiederholt. Nach einer Stunde zeigte sich bei dem Einen der Kranken, und nach zwei Stunden bei dem Andern, abermals Erbrechen; man gab nun zum dritten Mal versüßtes Quecksilber zu sechs Gran; zum Getränk bekamen die Kranken eine Salep-abkochung. In der Nacht trat bei beiden Kranken einigemal Erbrechen ein, der Durchfall dauerte fort, und alle Zufälle der Krankheit blieben auf derselben Höhe; aber am Morgen hatte das Erbrechen bei beiden Kranken nachgelassen, die Wärme in den Gliedmaassen war gestiegen, die Krämpfe hatten sich beruhigt, und der Puls war fühlbarer geworden; nur der Durchfall hatte sich nicht vermindert, und auch der Schmerz im Unterleibe dauerte fort. Man verordnete den Kranken eine Abkochung von Eibischwurzel mit Pfeffermünzwasser und Opiumtinktur (zwei Drachmen auf zehn Unzen, stündlich zu einem Esslöffel voll). Bei dem einen Kranken hörte von dieser Zeit an das Erbrechen ganz auf, nur der Leibschmerz dauerte fort, wie auch der Durchfall, jedoch geringer, als früher. Den  $12/24$ . bemerkte man kaum noch an den Gliedmaassen Krämpfe, die Wärme in denselben war natürlich geworden, der Puls wurde voller, nur ein geringer Schmerz war im Kopf und Unterleib geblieben. Es wurden schleimige, aromatische und einhüllende Mittel, Klystiere und Opiumtinktur angewendet. Fast ebenso war der Verlauf der Krankheit bei dem andern Kranken bis zum  $15/27$ . Sept.; man verordnete ihm dieselben Mittel, doch kehrte bei ihm das Erbrechen einigemal zurück, daher reichte man ihm sechs



Gran versüßtes Quecksilber mit arabischem Gummi. Seine Hände waren zu Zeiten kälter, worauf man sie mit warmen Tüchern bedeckte. Den  $15/27$ . Sept. gegen Abend aber erneuerten sich die Zufälle, mit denen er ins Hospital gekommen war, wozu sich noch Irreden und furchtbare Angst gesellte. Der Kranke starb am  $16/28$ ., obgleich alle am Tage seiner Ankunft angewendeten Mittel wiederholt worden waren.

Am  $11/23$ . Sept. wurde wieder ein an der Brechruhr erkrankter Soldat in das Hospital gebracht, am  $14/26$ . aber 3, die bald der Krankheit unterlagen.

Den  $16/28$ .,  $17/29$ . und  $18/30$ . Sept. starben auch mehrere Einwohner Orenburgs an der Brechruhr. Einer derselben hatte am  $14/26$ . Sept. Vormittags lange im kalten Wasser gebadet, wahrscheinlich zur Milderung der innern Hitze, die von geistigen Getränken herühren konnte, denen er ergeben war. Sodann ass er zu Mittag, genoss viele Arbusen (Wassermelonen) und trank Bier. Bald darauf klagte er über Schmerz in der Herzgrube; es zeigte sich Uebelkeit, heftiges Erbrechen mit Durchfall, Ergiessung von Schweiss an der ganzen Oberfläche des Körpers, grosses Sinken der Kräfte und Krämpfe der untern Gliedmaassen. Alle diese Zufälle endeten erst mit dem Tode, der am zweiten Tage der Krankheit erfolgte.

Am  $17/29$ . Sept. bildete sich ein Medicinalcomité, bestehend aus den Staatsärzten Pätnitzky, Sokolow und Onufriew, von welchem folgende Vorsichtsmaassregeln für nöthig erachtet wurden: 1) ein völliges Verbot der Ausfuhr und des Verkaufs von Arbusen, Melonen, Aepfeln und frischen Pilzen aller Art; 2) die Anordnung, dass die Einwohner von Oren-



burg sich nach Möglichkeit bestreben sollen, eine durchaus frische und gesunde Nahrung zu erhalten, mit Zusätzen von Pfeffer, Meerrettig und Senf, wozu auch ein Glas mit bitterer Tinktur passe; 3) Vorsicht, die Füße nicht nass zu machen oder zu erkälten, daher solle man nicht ohne warme Bekleidung aus dem Hause gehen; man müsse den Unterleib warm bedecken, z. B. mit einem Stücke Tuch oder Flanell; 4) baldige Herbeirufung ärztlicher Hülfe bei dem geringsten Eintritte von Erbrechen oder Durchfall; 5) die Häuser seien rein, warm und trocken zu erhalten; 6) die Polizei sei zu verpflichten, Rind- und anderes Fleisch, so wie alles zum Schlachten bestimmte Vieh und die Lebensmittel in strenge Aufsicht zu nehmen.

Die Ursache der Krankheit meinte man anfangs in dem häufigen Genusse von Obst suchen zu müssen, eine Annahme, die später nicht stichhaltig befunden wurde. Auch die Witterung wurde als Ursache der Krankheit angeschuldigt, wie aus dem Beschlusse des Medicinalrathes vom  $11/23$ . Oct. hervorgeht, worin gesagt wird: »Nach der Meinung der in Orenburg befindlichen Aerzte ist diese Krankheit von dem nachtheiligen Gebrauch der Früchte und vom Einflusse der feuchten und kalten Witterung entstanden, welche auf sehr grosse Hitze gefolgt ist, was durch eingesendete meteorologische Beobachtungen erläutert wird.« Letztere sucht man in den Aktenstücken vergeblich; erst vom 23. Oct. (4. Nov.) an findet man genauere Angaben über die Witterungsverhältnisse. Dr. Puppew glaubte den Grund in einer ungesunden Beschaffenheit des Roggens zu finden; es sei nämlich



dieser, wie die Einwohner erzählen, im Sommer 1829 an einzelnen Orten mit einer Menge schwarzer oder anderweitig verdorbener Körner gewachsen (Mutterkorn?). Untersuchungen, ob die Krankheit von Aussen durch Ansteckung eingebracht worden sei, scheinen im Anfang der Epidemie nicht stattgefunden zu haben; auch zeigten sich die Orenburger Aerzte in ihrem Gutachten vom 17/29. Sept. nicht geneigt, eine Kontagiosität der Krankheit anzunehmen, indem sie bemerken, »es sei, so viel man wisse, nicht eine einzige Krankheit, welche gleiche Zeichen habe, ansteckend gewesen.«

Da die Krankheit im Anfang nur sehr langsam um sich griff und nicht gleich von den Aerzten richtig erkannt wurde, so ist es wohl erklärlich, dass man bei den zuerst davon ergriffenen Personen nicht nachforschte, ob sie sich die Krankheit nicht durch Ansteckung könnten zugezogen haben; befremdend aber ist es doch, dass man diesem Umstande nicht mehr Aufmerksamkeit schenkte, weil man schon längere Zeit vor dem Ausbruche der Krankheit in Orenburg Verdacht hatte, dass die Brechruhr in Mittelasien herrsche. Es hatten sich nämlich schon zu Ende Juni's (a. St.), ehe noch die Karawanen aus der Bucharei und Khiwa zum Handel in Orenburg eingetroffen waren, dunkle Gerüchte verbreitet, dass in jenen Gegenden eine heftige ansteckende Krankheit, begleitet von Erbrechen und Durchfall, herrsche, die auch unter den Karawanen selbst sich fühlbar gemacht habe. Obgleich diese Gerüchte durchaus nicht verbürgt waren, so hatten sie doch die Aufmerksamkeit der Orenburgischen Behörden erregt, und es war dess-



halb ein eigenes Comité zur strengen Untersuchung dieser Nachrichten unter dem Vorsitze des Generalleutenants Weselitzky in Orenburg gebildet worden. Das Gutachten dieses Comité's vom 21. Juli (2 Aug.) enthielt im Wesentlichen Folgendes: Die Richtigkeit der Gerüchte in Betreff der in Buchara, Kabul, Taschkent und Khiwa herrschenden Krankheit zugegeben, sei jedenfalls nach dem Erachten der zu Rathe gezogenen Aerzte die Ursache derselben in örtlichen Verhältnissen jener Länder zu suchen, wesshalb man sie auch nicht für ansteckend halten könne (man begreift nicht wohl, wie die Aerzte über eine Krankheit, von der man nur durch unverbürgte Gerüchte Kenntniss hatte, ein solches, oder vielmehr überhaupt ein Urtheil fällen konnten); einige Erscheinungen jener Krankheit gleichen der Cholera, aber auch diese sei nach dem Ausspruche der Aerzte nicht ansteckend; die Ausdehnung der Steppen, durch welche die Karawanen ziehen, die Zeit von 33 bis 90 Tagen, welche die Leute auf der Reise zubringen, beweise hinlänglich, dass diese Menschen nicht ansteckend seien; ferner wenn man einen an den Waaren haftenden Ansteckungsstoff annehmen wollte, so wäre nicht zu begreifen, dass die Ansteckung sich nicht den Leuten sollte mitgetheilt haben, während sie der Karawane folgten, bei dem täglichen Auf- und Abpacken der Lasten und bei dem beständigen Aufenthalte der Wirthe und der Führer in den Waarenlagern. Weiter bemerkt das Gutachten, die Bestimmtheit und Uebereinstimmung in den Aussagen aller Personen der Orskischen Karawane, worunter sich auch zwei russische Unterthanen befanden, die den Winter in Taschkent



und Buchara zugebracht hatten, so wie die Aussage aller Leute der auf die Berdänskische Linie gezogenen bucharischen Karawane haben von dem Ungenügenden der Gerüchte über die Krankheiten und die Sterblichkeit in der Karawane selbst hinlänglich überzeugt. In dieser sollten der Sage nach viele Asiaten gestorben sein; in der That aber sei nur ein einziger Kirgise nach einer zwanzigtägigen Krankheit gestorben. Alle eingeführten Waaren seien ausgegeben und unter bekannten Einwohnern von Orenburg oft angewendet worden, ohne dass sich bisher eine Krankheit gezeigt habe. Der Obrist Zialkowsky zeige in seinem Berichte an, dass er in der Ueberzeugung, dass jede Ansteckung vorzüglich an Wolle und Papier hafte, die Bucharen der angekommenen Karawane veranlasst habe, aus der Mitte jedes Ballens Baumwolle herauszunehmen, sie zu kauen und Einer dem Andern zu übergeben, und dass nicht nur die Bucharen, bei denen man die grosse Geldgier im Verdacht haben könnte, sondern auch alle Khiwaer und Kirgisen sich mit Lachen auf die Waaren geworfen, ohne Auswahl und Vorsicht die Baumwolle herausgenommen, gekaut und einander zugeworfen haben. Aus allem diesem schliesse das Comité, dass man Leute und Waaren der angekommenen Orskischen und der an der Berdänskischen Linie angehaltenen bucharischen Karawane ohne Gefahr in den Tauschhof lassen könne. — Da somit die Kommission nichts Verdächtiges und die Gerüchte Bestätigendes fand, so wurde die bucharische Karawane zugelassen, und die Einwohner Orenburgs traten mit ihr in Verkehr.

Obgleich durch das obige Gutachten sogar die



Existenz einer epidemischen Krankheit in Mittelasien sehr in Zweifel gestellt ist, so bestätigten doch später sichere Nachrichten die früheren in dieser Beziehung verbreiteten Gerüchte. »Bald nach dem Ausbruche der Cholera in Orenburg,« sagt der Staabsarzt Sokolow, dessen Bericht über die Orenburger Epidemie der befriedigendste unter allen vom Petersburger Medicinalrathe mitgetheilten ist, »erhielt man durch den in Persien befindlichen Generalmajor Dolgorucki officielle Nachrichten von dem Wiedererscheinen dieser Krankheit in einigen Gegenden des genannten Reichs, zumal in Khorasan. Dies bestätigt eine Angabe Khiwa'scher Kaufleute, wonach ihr Khan, der in diesem Jahre (1829) einen Feldzug an die Gränze von Khorasan unternommen hatte, gezwungen gewesen sei, wegen einer Krankheit zurückzukehren, die ihn in kurzer Zeit der Hälfte seines Heeres beraubt habe. Bei dieser Erzählung bleibt jedoch der für uns wichtigste Gegenstand unerläutert, wann nämlich dieser Feldzug unternommen worden sei, ob vor oder nach dem Abgange der Karawanen nach Russland. Dieselben gingen nicht alle gleichzeitig ab; die bucharische, als die späteste, kam den 22. Juli (3. Aug., also 36 Tage vor dem ersten bekannten Brechruhrfalle) in den Orenburg'schen Tauschhof. Sollte nicht der Khan im Mai, als der günstigsten Zeit zu solchen Unternehmungen, den Feldzug gemacht haben? Dann wäre er nach Khiwa im Anfange des Junius vor dem Abgange der bucharischen Karawane nach Russland bereits zurückgekehrt gewesen.« Uebrigens ist Sokolow gegen die Annahme einer durch die Karawanen aus Mittelasien gebrachten Ansteckung, indem die Gesundheit



der dabei befindlich gewesenen Personen, die äusserst geringe Sterblichkeit auf der langen Reise, die vollkommene Abwesenheit der Cholera in den Festungen Troizka und Orsk, wohin, so wie nach Orenburg, gleichzeitig aus denselben Gegenden Asiens mit den Karawanen verschiedene Waaren gebracht worden waren, endlich die Erscheinung der Cholera in Orenburg selbst, unter der niedrigsten Volksklasse, nicht unter den Zollbeamten, die ihrem Amte zufolge den meisten Verkehr mit den ausländischen Kaufleuten haben, jener Ansicht entgegenstehen. Hofrath Reissner, Mitglied der Pensa'schen Medicinalbehörde, der übrigens nicht in Orenburg gewesen zu sein scheint, behauptet dagegen geradezu, die Cholera sei in Orenburg durch den Verkehr mit der bucharischen Karawane entstanden; auch sprachen die Orenburgischen Aerzte, die im Anfang sich der Annahme der Contagiosität nicht im Geringsten geneigt gezeigt hatten, in einem Gutachten, bei dem kein Datum angegeben ist \*), ihre Ansicht aus, dass es mehr als wahrscheinlich sei, dass die Cholera aus entfernten Gegenden Asiens in das Orenburg'sche eingeführt worden sei.

Nach allem Obigen kann man wohl dieses keineswegs als ausgemacht annehmen; mehr Wahrscheinlichkeit möchte die Einführung des Krankheitsstoffs durch die Kirgisen haben, welche auf der ganzen Gränze, besonders aber in Orenburg, zumal im Sommer und Herbste mit den Russen einen beständigen Tauschhandel führen, wiewohl auch in dieser Be-

---

\*) Aktenstück Nro. XXVI. in der Lichtenstädtischen Schrift. S. 90 u. ff.



ziehung nichts Bestimmtes nachgewiesen werden kann. Wir haben bereits im ersten Bande erwähnt, dass Alexander v. Humboldt auf seiner letzten naturhistorischen Reise, die er aus Auftrag des Kaisers von Russland in das innere Asien unternahm, im Sommer 1829 in den Kirgisensteppen auf eine Seuche gestossen sei, die unter dem Vieh herrschte, aber auch den Menschen gefährlich war. Es scheint nun ausser Zweifel zu sein, dass diese Krankheit die Brechruhr war. Sokolow sagt: »die eigenen, übrigens ungleichen Erzählungen der Kirgisen dienen zum klaren überzeugenden Beweise, dass die Cholera sich in einigen ihrer Horden gezeigt, am Ilek und Emba; aber ihr beständiges Misstrauen gegen uns und die verdächtige Heimlichhaltung werden sehr hinderlich zur Sammlung klarer Beweise, in welcher Ausbildung und Stärke diese Krankheit auf jenen halbwildem Nomadenstamm gewirkt hat.« Jedoch ist es nach seinen Angaben nicht wahrscheinlich, dass die Krankheit unter den Kirgisen weit um sich gegriffen hat: denn »ihre Sitte, alle Kranken und Verdächtigen (z. B. an Blattern, Masern u. dgl.) dem Schicksal zu überlassen und von einem Orte, wo sich solche Krankheiten gezeigt haben, zu einem andern entfernten zu wandern, ist in der That das beste Mittel gegen ihre Verbreitung.« Daraus liesse es sich auch erklären, dass, obgleich die Kirgisen an einem grossen Theile der Gränzen des Orenburgischen Gouvernements mit dessen Einwohnern in Verkehr stehen, die Uebertragung des Krankheitsgifts allein in der Stadt Orenburg selbst, wo überdiess der Verkehr am stärksten ist, stattgefunden, ein Umstand, den Sokolow, der als entschiedener



Antikontagionist auftritt, als Beweis dafür, dass die Krankheit nicht von Aussen hereingebracht worden sei, anführt \*).

Sokolow glaubt die Entstehung der Cholera in Orenburg weder aus der Witterung, dem Genuss von Früchten, noch anderweitigen örtlichen Krankheitsursachen, noch aus einem eingebrachten Contagium ableiten zu können, sondern von der Erdelektricität, ohne sich dabei auf eine nähere Erklärung einzulassen. Als Gründe für diese Annahme gibt er nur die Unzulänglichkeit der übrigen Erklärungen und die zuweilen in schon Verschiedenen eintretenden krampfhaften Zufälle an.

Im Anfang griff die Krankheit in Orenburg nur sehr langsam um sich; in den ersten 24 Tagen vom ersten Brechruhrfalle an, der am 26. Aug. (7. Sept.) vorkam, bis zum  $18/30$ . Sept. kamen, so viel bekannt ist, nur 15 Cholerakranke vor. Die meisten dieser Kranken kommen auf die letzten Tage dieses Zeitraumes, während die ersten Krankheitsfälle ganz vereinzelt waren. Nun aber begann die Krankheit schneller um sich zu greifen; nach Sokolow verlief die Epidemie deutlich in verschiedenen Perioden, nämlich der Anfang vom 26. Aug. (7. Sept.) bis  $10/22$ . Sept., die Zunahme vom  $10/22$ . Sept. bis 20. Sept. (2. Okt.), die grösste Höhe vom 20. Sept. (2. Okt.) bis  $10/22$ . Okt.

---

\*) Sehr auffallend ist es in dem Sokolowschen Berichte, dass sich der Verfasser am Ende für Errichtung einer Quarantaine nach den der Cholera verdächtigen Ländern und für alle Maassregeln der Sperrung, welche aus dem Begriffe einer lebensgefährlichen Ansteckung hervorgehen, erklärt, obgleich er vorher immer die Kontagiosität der Krankheit zu widerlegen sich bemüht hat.



und die völlige Abnahme bis zum  $\frac{8}{20}$ . Nov. Diesem Verlaufe entsprach nach ihm die Zahl der in das Militärhospital aufgenommenen Kranken, nämlich vom 26. Aug. (7. Sept.) bis 20. Sept. (2. Okt.) 15, von da bis zum  $\frac{10}{22}$ . Okt. 199, von da bis zum  $\frac{1}{13}$ . Nov. 71, und zuletzt vom  $\frac{1}{13}$  bis  $\frac{8}{20}$ . Nov. 14, wobei natürlich anderweitige Krankheitsfälle nicht mitgerechnet sind. In keinem Berichte findet sich eine Uebersicht der Krankheitsfälle nach den einzelnen Tagen. In der Stadt und den Vorstädten erkrankten nach dem Berichte des Polizeimeisters bis zum 22. Sept. (4. Okt.) 69 Personen; gestorben waren bis dahin 12. Bis zum 30. Sept. (12. Okt.) erkrankten aufs Neue 60 Personen; gestorben waren im Ganzen bis dahin 22. Bis zum Ende der Epidemie in Orenburg am 20. Nov. (2. Dec.) erkrankten in Allem 1100 Personen, davon genasen 900 und starben 200. Diese runden Summen sind auffallend und mögen einen Verdacht gegen die Genauigkeit der Angaben rechtfertigen.

Von jenen 1100 Personen kommen auf das Militärhospital 299 Kranke, darunter 79 Todte, also etwas mehr als der vierte Theil; auf die Stadt und Vorstädte 801 Kranke, darunter 121 Todte, also etwas mehr als der siebente Theil. Im Ganzen wurde der zehnte Theil der Einwohner von Orenburg von der Brechruhr befallen; vom Militärstande der zwanzigste Theil, von den übrigen Einwohnern mehr als der sechste Theil.

Im Gouvernement Orenburg überhaupt, wo von der Stadt aus sich die Seuche weiter ausbreitete, betrug die Zahl der an der Cholera Erkrankten nach der vom Petersburger Medicinalrath den Aktenstücken



beigefügten tabellarischen Uebersicht 3590 (die Kranken in Orenburg selbst mit eingerechnet), davon genesen 2725 und 865 starben. Indessen breitete sich die Krankheit nicht durch das ganze, 5626 Quadratmeilen umfassende, Gouvernement mit mehr als einer Million Einwohnern aus; von den zwölf Bezirken desselben wurden nur sechs von der Seuche heimgesucht, und ein Theil von diesen nur unbedeutend.

Das Uralgebirg theilt die Satthaltschaft in zwei ungleiche Hälften; die östliche bei weitem kleinere ist grösstentheils flach, voller Moräste und Seen, die westliche grössere ist gebirgig und von Zweigen des Urals durchzogen, zwischen welchen sich aber grosse und weite, theils mit Wäldern bedeckte, theils steppenartige Ebenen ausbreiten. Von diesen beiden Theilen des Gouvernements blieb die erste von der Krankheit ganz verschont: nur in der zweiten, deren örtliche Verhältnisse der Gesundheit günstiger sind, verbreitete sich dieselbe, doch blieben auch in ihr mehrere Bezirke ganz verschont.

Im Menselinskischen Bezirke kam die Krankheit nur in vier Dörfern vor; die Zahl der Erkrankten betrug nicht mehr als 35, davon sind aber 28 gestorben.

Im Belebei'schen Bezirke zeigte sich die Krankheit blos in zwei Dörfern; in diesen erkrankten 30 Personen, wovon nur 6 gerettet wurden.

Im Bezirke von Buguruslan litten vier Dörfer von der Krankheit; es erkrankten 293 Personen, davon sind gestorben 75. Am meisten litt das Dorf Tiriss-Usmanowa, wo die Zahl der Kranken in-



nerhalb 18 Tagen sich auf 147 belief, wovon 27 ein Opfer der Seuche wurden.

Im Sterlitamak'schen Bezirke wurden vier Dörfer von der Seuche heimgesucht; die Zahl der Brechruhrfälle betrug in denselben 89, worunter 53 mit tödtlichem Ausgang. Ueberdiess erkrankten in der Stadt Sterlitamak 83 Personen, davon starben 24.

Im Bezirke von Bugulma wurde die Cholera allein in der Kreisstadt dieses Namens beobachtet, wo sie vom  $\frac{7}{19}$ . Nov. bis  $\frac{4}{16}$ . Dec. 1829 anhielt. In dieser Zeit erkrankten 22 Personen, welche sämmtlich wieder hergestellt wurden.

Am ausgebreitetsten herrschte die Krankheit in dem Bezirke von Orenburg, wo nur wenige Orte verschont blieben, namentlich aber alle, die aufwärts von Orenburg am Uralflusse liegen, welcher nicht zur Schifffahrt benützt wird. Im Bezirke von Orenburg, mit Ausnahme der Stadt selbst, erkrankten 1938 Personen, wovon 261 der Krankheit unterlagen. An einigen Orten war die Zahl der Kranken höchst unbedeutend; in vier Dörfern kam nur ein einziger Brechruhrfall vor, in 2 andern nur 2. Die meisten Kranken hatte der Flecken Seitowskoi-Possade; daselbst erkrankten 309 Personen, es starben aber blos 17, der achtzehnte Theil der Erkrankten. In der Festung Razzipnaja erkrankten 305 Individuen, darunter starben 19, der sechzehnte Theil der Erkrankten. In der Festung Nischne-Osernaja kamen 203 Brechruhrfälle vor, wovon nur 7 einen tödtlichen Ausgang hatten, so dass also nur  $\frac{1}{29}$  der Erkrankten starb. Im Städtchen Sakmarsk star-



ben von 184 Kranken nur 11; dagegen starben im Dorfe Sarmanaewa von 73 Kranken 55 und im Dorfe Tockmack-Coran von 44 Kranken 27.

Die Cholera-Epidemie im Orenburg'schen Gouvernement begann, wie wir gesehen haben, in Orenburg selbst am 26. Aug. (7. Sept.) 1829; zuletzt war sie in der Festung Tschernoretschinskaja, wo sie den 23. Febr. (7. März) aufhörte; die Krankheit dauerte mithin im Gouvernement gerade ein Halbjahr. Die Dauer der Seuche in den einzelnen Orten ist in der tabellarischen Uebersicht des Petersburger Medicinalraths enthalten, bei jedem Orte ist der Tag des Ausbruchs und der Tag des Aufhörens angegeben. Bei einer aufmerksamen Betrachtung dieser Uebersicht kann man nicht verkennen, dass im Allgemeinen die Dauer der Epidemie an einem Orte mit der Zahl der von der Krankheit Befallenen (und wahrscheinlich mit der Einwohnerzahl, über welchen Punkt man die Angaben vermisst) in Beziehung stand. In der Stadt Orenburg, wo 1100 Personen erkrankten, dauerte die Epidemie am längsten, nämlich 87 Tage. In der Festung Nischnei-Osernaja, wo 203 Personen von der Seuche befallen wurden, dauerte sie 42 Tage; in dem Flecken Seitowskoi, wo 309 Personen erkrankten, und in dem Städtchen Sackmarsk, wo 184 erkrankten, 40 Tage. In der Festung Razsipnaja, wo 305 Personen an der Cholera litten, und im Dorfe Emangulewa, wo 113 erkrankten, war die Dauer der Epidemie 32 Tage; in der Iletzkischen Festung kamen innerhalb 23 Tagen 113 Cholerafälle vor, in derselben Zeit in der Stadt Sterlitamak 83, und im Dorfe Nowi-



Schalty 75; ferner innerhalb 14 Tagen im Dorfe Tschetirman 43, und in der Festung Tatischschewa 40. Im Dorfe Adnagulowa dauerte die Krankheit 8 Tage, und innerhalb dieser Zeit wurden 27 Personen von ihr befallen. Jedoch finden sich auch zahlreiche Abweichungen dieser im Allgemeinen aus der Uebersicht hervorgehenden Ordnung. So wurden z. B. im Dorfe Tiriss-Usmanowa innerhalb 19 Tagen 147 Personen von der Cholera befallen, während in Troitzkaja, wo die Krankheit am  $8/20$ . Okt. sich zeigte und am 28. Okt. (9. Nov.) aufhörte, also 21 Tage dauerte, während dieser Zeit nur 3 Personen die Cholera bekamen; diese Abweichungen finden übrigens zum Theil in einem Umstande, den wir sogleich berühren werden, ihre Erklärung.

Diejenigen, welche geneigt sind, einen Einfluss der Mondphasen auf die Entwicklung und den Gang der Epidemien, namentlich der Cholera-Epidemien, anzunehmen, können in der Uebersicht des Petersburger Medicinalraths über die Orenburger Epidemie leicht bestätigende Thatsachen finden. Die Zahl der Tage der Epidemie entspricht an manchen Orten der der Mondphasen; öfters zeigte die Seuche eine ein-, zwei-, drei-, vierwöchige Dauer. In der Station Berdsk begann die Krankheit am 30. Septemb. (12. Okt.) mit dem Eintritt des Vollmonds und hörte auf am  $15/25$ . Nov., den Tag vor Eintritt des Neumonds. Im Dorfe Adnagulowa begann die Krankheit am  $6/18$ . Jan. 1830 mit dem letzten Viertel, und hörte beim Eintritt des Neumonds auf am  $15/25$ . Jan. Untersucht man aber die Sache genauer, so findet sich, dass an den meisten Orten, wo man aus der Zahl der Tage, in-



nerhalb deren die Epidemie bestand, auf einen Zusammenhang mit den Mondsveränderungen schliessen könnte, dieser keineswegs stattfindet, indem weder der Anfang noch das Ende der Epidemie wirklich mit dem Mondwechsel zusammentrifft. Ueberdiess taugt die vom Medicinalrathe mitgetheilte Uebersicht auf keinen Fall dazu, Resultate der Art darauf zu bauen. Es ist in derselben auch das Dorf Nowaja-Masina aufgeführt, und als Zeit des Erscheinens der Cholera angegeben der  $6/18$ . Febr., als Zeit der Beendigung der  $13/25$ . Febr. 1830. Krank war 1 Person, die gestorben ist. Ferner ist beim Dorfe Cliutchi als Zeit der Erscheinung der Cholera angegeben der  $13/25$ . Nov., als Zeit der Beendigung der  $14/26$ . Nov. 1829; auch hier war nur ein einziger Kranker, der wieder genas. Man sieht daraus, dass in der Uebersicht des Petersburger Medicinalraths die Dauer der Epidemie an den einzelnen Orten von dem Erkranken des ersten Cholerakranken bis zur Wiedergenesung oder zu dem Tode des letzten gerechnet wurde. Die Dauer der Krankheit des Einzelnen, sie möge in Wiedergenesung oder Tod enden, ist aber von so manchen Umständen abhängig, dass unmöglich nach ihr die Dauer einer ganzen Epidemie festgesetzt werden kann. Will man nach einem Zusammenhang der Epidemie mit kosmischen Einflüssen forschen, so muss man als Dauer der Epidemie den Zeitraum vom Erkranken des ersten Kranken bis zum Eintritt der Krankheit beim letzten rechnen. Aus diesem Grunde lassen sich aus der Uebersicht des Medicinalraths in der genannten Beziehung weder positive noch negative Resultate ziehen. Auch erklären sich aus dieser Art, die Dauer der Epide-



mie zu bestimmen, die oben erwähnten Abweichungen von dem Zusammenhang, der im Allgemeinen zwischen der Dauer der Epidemie und der Zahl der Erkrankten statt zu finden scheint.

Was die Verbreitung der Cholera im Orenburg'schen Gouvernement betrifft, so ist dabei zu bemerken, dass die Krankheit eine ziemlich Zeit lang auf den Orenburg'schen Bezirk beschränkt blieb. Der erste Ort, welcher ausserhalb dieses Bezirks von der Cholera heimgesucht wurde, war die Stadt Sterlitamak im Bezirke gleichen Namens, der nördlich zunächst an den Orenburg'schen Bezirk angränzt; die Krankheit gelangte dahin am 7/19. Nov. 1829. Im Buguruslanschen Bezirke, der nordwestlich an den Orenburgischen stösst, kam die Krankheit erst am 5/17. Dec. zum Vorschein (im Dorfe Tiriss-Usmanowa). Im Bezirke von Belebei, der sich westlich an den von Sterlitamak anschliesst, zeigte sich die Krankheit zuerst am 6/18. Jan. 1830. Im Bezirke von Bugulma aber, der von Orenburg entfernter ist, als die beiden eben genannten, und vom Buguruslanschen nördlich, und westlich vom Belebei'schen liegt, hatte sich die Krankheit schon den 7/19. Nov. 1829, also früher als in den beiden Orenburg näher liegenden Bezirken gezeigt. Zuletzt gelangte sie in den nordwestlichsten Bezirk des Gouvernements, den von Menselinsk, der nördlich vom Bugulma'schen gelegen ist; in demselben zeigte sich die Krankheit erst am 2/14. Jan. 1830. Der westlich an den Orenburgischen Bezirk anstossende Bezirk von Busuluck, so wie der gegen Osten



angrenzende von Werchne-Uralsk blieben ganz verschont.

Man sieht aus vorstehender Uebersicht, dass bei der Verbreitung der Seuche von Bezirk zu Bezirk Sprünge statt fanden, so dass der entferntere Bezirk früher die Krankheit bekam als näher gelegene. Dasselbe findet sich auch, wenn man die Verbreitung in den einzelnen Bezirken verfolgt; ein von den bereits heimgesuchten Orten entfernter gelegener Ort wurde oft eher als die dazwischen gelegenen von der Seuche ergriffen. Der erste Ort, welcher nach Orenburg heimgesucht wurde, war die 100 Werste davon entfernte Festung Razzipnaja; dahin kam die Krankheit am  $13/25$ . Sept. 1829; fünf dazwischen gelegene Orte wurden erst später befallen: die am nächsten an Orenburg gelegene Festung Tschernoretschinskaja nicht eher als am  $19/31$ . Jan. 1830, weiter entfernt Ritschkowa am 29. Okt. (10. Nov.) 1829, weiterhin Talischtschewa am  $8/20$ . Okt.; auf dieses folgt auf der Strasse Zubotschistka, wo sich die Krankheit am  $9/21$ . Nov. zeigte, und zunächst an Razzipnaja die Festung Nischne-Ozernaja, wo die Krankheit am  $6/18$ . Okt. erschien. Das Nämliche liesse sich auch auf den beiden andern Strassen, der gegen Kasan und der gegen Ufa, auf welchen sich die Cholera hauptsächlich verbreitete, nachweisen; doch wird jenes Beispiel genügen.

Die Einwohner von Razzipnaja behaupten, die Krankheit sei durch den von Orenburg gekommenen Weinhändler Grigor Susdow eingeführt worden. Nach dem Berichte des Militärarztes Schumow war dieser Mensch am 19. Sept. (1. Okt.) erkrankt und



den folgenden Tag gestorben. Den 21. und 22. Sept. (3. und 4. Okt.) gab es keine Cholerakranken. Am 23. Sept. (5. Okt.) erkrankte aber gegen Abend ein längst an Diarrhöe leidender und überdiess trunkener Mensch, der nach 20 Stunden starb. Am 25. Sept. (7. Okt.) erkrankte wieder Einer, der nach siebentägiger Dauer der Krankheit starb; am 27. Sept. (9. Okt.) erkrankten drei, u. s. w. Sämmtliche Erkrankte, versichert Schumow, hatten mit den Kranken gar keine Gemeinschaft gehabt, und die Personen, welche mit dem oben genannten Weinhändler zu thun gehabt hatten, blieben sämmtlich gesund. Der ersteren Behauptung Schumow's widerspricht indessen, dass der Civilgouverneur von Orenburg unter den ersten Erkrankten in Razsipnaja den Urädnik (Bezeichnung eines Beamten im Kosakenheere) Wassili Mainialow und seine Frau aufführt (in seinem Berichte vom  $\frac{3}{15}$ . Okt. an den Civilgeneralstaabsarzt). Nicht zu übersehen ist, dass nach dem Berichte Sokolow's eine Kosakenabtheilung reitender Artillerie in der Nähe von Orenburg ein Lager hatte und dasselbe am  $\frac{1}{13}$ . Sept. verliess, um nach der Festung Razsipnaja sich zu begeben, wodurch auch eine Verbreitung der Krankheit statt finden konnte.

In der Festung Ilezkaja-Zaschtschika begann die Cholera am  $\frac{2}{14}$ . Okt. Dieselbe liegt 64 Werste südwestlich von Orenburg, an der Gränze der Kirgis-Kaisakschen Steppe. Das zwischen Orenburg und Ilezkaja gelegene Elischanskoi blieb von der Cholera unberührt. Nach dem Berichte des Staabsarztes Schimanski ist der Boden in der Festung selbst wie in der Umgebung sandig-thonig und



so fest, dass selbst nach langem Regen kein Schmutz entsteht. Nirgends sind Sümpfe vorhanden, und die Luft ist immer gesund. Nahe an der Festung läuft das Flösschen Elschanka, welches sehr reines und gesundes Wasser enthält; überdiess sind an den Ufern dieses Flösschens, wie in der Festung selbst, einige Brunnen mit sehr reinem und gesundem Quellwasser.

Die Cholera zeigte sich hier zuerst an Personen, die aus Orenburg gekommen waren, an einem Unterofficier Tichon Panow, und an einer Soldatenfrau Martha Tichonow, welche die Zufälle der Krankheit schon auf der Hälfte der Reise, bei ihrer Rückkehr von dort, gefühlt hatten. Da man bei ihrer Rückkunft nicht wusste, dass die Cholera, die sich bis dahin in Ilezkaja noch nicht gezeigt hatte, in den gedachten Fällen vorhanden sei, so wurde der Staabsarzt Schimanski erst Abends zu Hülfe gerufen, als die Krankheit schon so überhand genommen hatte, dass man nicht mehr im Stande war, die Kranken zu retten. Der Unterofficier starb in 36, die Soldatenfrau in 48 Stunden nach Anfang der Krankheit. Am dritten Tage darauf erkrankten der Mann obiger Soldatenfrau, zwei kleine Mädchen, Töchter des Kosaken Wugow, eine von 3, die andere von 9 Jahren, und nach ihnen ihre Muhme, die Kosakenfrau Anna Wugow mit ihren zwei kleinen Söhnen; die Mädchen starben binnen 24 Stunden, die übrigen genasen. — Sodann verbreitete sich die Krankheit so heftig, dass am 22. Okt. (3. Nov.) 113 Menschen von ihr befallen waren.

»Indem ich«, sagt Schimanski, »bei diesem gewaltsamen Gange der Krankheit mich hier allein be-



fand, und überdiess noch das Krankenhaus des Salzverkehrs, wozu viele Personen gehören, zu besorgen hatte, so konnte ich bei jenen 113 Personen keine Untersuchung über die Verbreitung der Krankheit anstellen; nur bei den ersten 8 gelang mir diess, und ich konnte mich dabei überzeugen, dass das Uebel von einem Menschen zum andern übertragen worden; denn die beiden ersten Kranken erhielten das Uebel zu Orenburg, wo die Krankheit wüthete. Es hat sich ergeben, dass dieselben in Orenburg Salz verkauft und im Tauschhof bei einem unbekannten Kaufmann Hammelfleisch gekauft hatten, dass sie von diesem mit Wein bewirthet und dass er zu gleicher Zeit von einem Anfalle der Cholera befallen worden. Tichonow wurde von seiner Frau angesteckt, und die zwei Mädchen des Wugow waren vermöge ihrer Nachbarschaft mit Panow bald nach der Ankunft bei ihm gewesen. Die Muhme wartete sie zur Zeit der Krankheit, und von ihr wurden ihre beiden Söhne angesteckt.»

»Auch hier«, bemerkt Schimanski ferner, »wie bei allen ansteckenden Krankheiten, wurden nicht alle in der Nähe der Kranken befindlichen Personen ergriffen; eben diese konnten jedoch die Ansteckung aus einem Hause ins andere bringen. Dass aber die Krankheit nicht aus der Luft, sondern durch Ansteckung entsteht, ergab sich auch in Tschernorettschinskaja, 18 Werste von Orenburg, wo sie sich am  $18/50$ . Jan. bei einer Kälte von 30 Graden neuerdings zeigte. Ein Kosak des Teptärschen Regiments starb am zweiten Tage daran, und bald dar-



auf erkrankte der Feldscheerer, der ihn eingerieben hatte» \*).

In der Kreisstadt Sterlitamak, die auf der Strasse von Orenburg nach der Gouvernementsstadt Ufa liegt, 230 Werste vom ersteren entfernt, erschien die Cholera am 7/19. Nov. In 22 Tagen ihrer Herrschaft daselbst ergriff sie 79 Person (nach der tabellarischen Uebersicht des Medicinalraths 83) bei einer Kälte von 20 bis 30 Graden; 20 Personen wurden ein Opfer der Krankheit. Sie war nach dem Bericht des Hofraths Reissner auf folgende Weise entstanden: »Im Oktober, zur Zeit des Jahrmarktes in jener Stadt, kamen aus Kargala, wo die Cholera furchtbar geherrscht hat, viele Tartaren zum Handel nach Sterlitamak. Es geschah diess vor der Sperrung von Kargala. Wahrscheinlich wurde nun die Krankheit durch diese Tartaren eingeführt; denn die ersten Opfer waren Tartaren, mit welchen andere angekommene Personen besonders viele Gemeinschaft gehabt hatten.»

»Meine Beobachtungen rücksichtlich der Ansteckung der Krankheit haben gezeigt, dass dieses entsetzliche Uebel sich durch Gemeinschaft mittheilen kann. Ich sah, wie an einem Orte Einer, dann nach Kurzem ein Anderer und endlich ein Dritter erkrankte. Noch merkwürdiger ist folgendes Ereigniss: Am Abend meiner Ankunft wurde in das Krankenhaus ein verdächtiger Mensch gebracht, welcher jedoch nach

---

\*) Aus der tabellarischen Uebersicht des Petersburger Medicinalrathes ergibt sich, dass sich die Krankheit in Tschernoretschinskaja weiter ausbreitete und bis zum 23. Febr. (7. März) 25 Personen befallen wurden.



24 Stunden wieder entlassen wurde, weil sich an ihm keine Erscheinung der Cholera zeigte. Aber nach vier Tagen kam er mit den völligen Zeichen der Cholera an. Nach drei Tagen wurde aus dem nämlichen Hause ein Frauenzimmer gebracht, welches an derselben Krankheit litt.»

Ueber die örtlichen Verhältnisse Sterlitamacks theilt Reissner im Wesentlichen Folgendes mit: Diese Stadt liegt auf dem linken Ufer des Flusses Bäla, in einer Entfernung von demselben in gerader Linie nach Süden etwa 4 Werste auf einer gleichen Ebene, die eine Ausdehnung von 223 Quadratdessätinen hat, zwischen zwei Flüssen. Von der rechten Seite bespült diese Ebene der fischreiche Aschkadar, der ein gutes Wasser hat, links der Fluss Sterla mit ungeniessbarem, lehmigem Wasser. Die Häuser sind alle von Holz; die Zahl der Einwohner beträgt 2332. Also wurde nur ungefähr der achtundzwanzigste Theil von der Krankheit ergriffen, während in Orenburg der zehnte Theil der Einwohner daran litt. Das Klima von Sterlitamak ist ziemlich beständig und gesund; zuweilen, besonders im Frühlinge, herrschen drei- und viertägige Fieber, jedoch selten und nicht lange. Die herrschenden Winde sind Süd und Südwest, letzterer immer von Regen oder Schnee begleitet.

Im Dorfe Tiriss-Usmanow (im Buguruslanschen Bezirke), dessen Einwohner Mohamedaner sind, bemühten sich diese aus Aberglauben die daselbst herrschende Cholera zu verheimlichen. Aus dem benachbarten Teptär'schen Dorfe Karamala kam ein gewisser Roslanow dahin; dieser war nach seiner



Rückkehr das erste Opfer der nun auch in Karamala ausbrechenden Seuche. Nach dem Berichte des Bezirksarztes Onufriew wurden nach dem Tode dieses Mannes zuerst seine nächsten Anverwandten, und dann in Kurzem viele Einwohner ergriffen. Bei der ersten Nachricht vom Erscheinen der Cholera in Karamala sperrten die nicht mehr als 40 Faden \*) davon entfernt wohnenden russischen Bauern ihr Dorf und schützten sich dadurch gegen die Krankheit.

Uebereinstimmend mit diesen Beobachtungen sagt der Bezirksstaabsarzt Troizki in seinem Berichte: »Indem ich mich zur Behandlung der Cholerakranken in den Niederlassungen des Buguruslan'schen und Orenburg'schen Bezirkes befand, fragte ich an allen, meiner Aufsicht unterworfenen Orten über die erste Erscheinung des Uebels. Zur Antwort erhielt ich überall die Kunde, dass die Cholera sich nicht eher gezeigt habe, bis Einer aus einem angesteckten Dorfe zu ihnen gekommen sey.« Ebenso versichert der Bezirksarzt Wodow, an seinem Beobachtungsorte habe sich der Uebergang der Krankheit von einem Menschen zum andern sehr deutlich nachweisen lassen; der unvollkommene Erfolg der Quarantaine aber lasse sich von der unvollständigen Ausführung derselben ableiten. Unbestimmt drückt sich der Staabsarzt Pupurew aus: »die Ansteckungsfähigkeit der Cholera«, sagt er, »kann man, wie es scheint, zugeben, weil sie sich an vielen Orten nicht gezeigt hat, welche doch denen nahe waren, wo die Krankheit geherrscht hat, wohin aber befallene Individuen viel-

---

\*) Ein Faden ist gleich sieben englischen Fuss.



leicht nicht gereist sind. Im Gegentheile hat sich die Cholera überall gezeigt, wo ein Kranker hinkam oder starb, wie in dem Dorfe Subowa \*). Obgleich ich übrigens bemerkt habe, dass die verderbliche Wirkung der Cholera sich oft in Familien verbreitete, und nur wenige Personen unberührt liess, die vielleicht keine Anlage dazu hatten — wie denn erwiesenermaassen zu jeder Ansteckung eine Anlage nöthig ist — so hörte doch die Cholera auf, wenn man die nöthigen Vorsichtsmaassregeln genommen hatte und der Kranke genesen war. Mit dem Tode des Einen ging sie gewöhnlich zu einem Andern über, wahrscheinlich weil der Leichendunst noch ansteckender ist.»

Nach einem Gutachten der Orenburgischen Aerzte ohne Datum \*\*) zählte man acht polizeilich bestätigte

---

\*) Man muss sich wundern, dass Pupurew einen so allgemein aufgestellten Satz, dem anderweitige Erfahrungen entgegenstehen, nur mit einer einzigen Thatsache zu belegen sich begnügt.

\*\*) Nro. XXVI. der Aktenstücke. In diesem Gutachten kommen die Orenburger Aerzte von ihrer Behauptung, dass die Brechruhr nicht ansteckend sey, zurück, gestehen jedoch die Ansteckungsfähigkeit nicht recht zu, indem sie sie nur durch Vermittlung der Atmosphäre annehmen. „Das hier beobachtete und wahrscheinlichste Mittel der Verbreitung der Krankheit besteht darin, dass ein Mensch, der an einem Orte, wo die Cholera herrscht die Anlage zu derselben bekommen hat, bei seinem Uebergange an einen andern Ort nun von derselben befallen wird und dem Luftkreise seines neuen Aufenthalts eine krankmachende Beschaffenheit mittheilt. Hier wächst sie, nährt sich und sich verbreitend ergreift sie schon die, welche durch innere Bedingungen des Körpers zur Aufnahme geneigt sind. — Diese, auf augenscheinlichen Zeugnissen beruhende Darstellung macht es wahrscheinlich, dass die Cholera aus entfernten Gegenden Asiens in das Orenburg'sche eingeführt sei: eben so hängt auch ihre Verbreitung in den Ortschaften dieses Gouvernements von dem Uebergang der Einwohner von ergrif-



und von Aerzten, welche auf den Gang der Cholera im Orenburgischen Gouvernement geachtet haben, beobachtete Fälle einer Uebertragung der Krankheit von Ort zu Ort. Dagegen sagt aber Sokolow, der durchaus eine Ansteckungsfähigkeit der Cholera nicht zugestehen will: »Es giebt zwar scheinbare Beweise, dass die Krankheit sich von Ort zu Ort fortgepflanzt habe; so beschuldigt man in Razzipnaja den Weinhändler Susdow, in der Berdskischen Station einen in Orenburg bei einem Begräbniss gewesenen Geistlichen, so in Uralsk zwei aus Orenburg gekommene Personen, die jedoch eine vierzehntägige Quarantaine ausgehalten hatten, endlich in Bugulma den Oberofficier Penski, welcher aus Orenburg zur Ueberführung der Rekruten hingeschickt war;

---

fenen Orten in freie ab, was oft früher geschieht, ehe die Behörde von dem Erscheinen der Cholera an einem Orte Kunde erhält, oder ehe die Anordnungen der Behörde wegen der Sperre in Ausführung gekommen sind. — Nichts desto weniger giebt es Erfahrungen und Beobachtungen, welche geradehin der ansteckenden Kraft der Cholera entgegenstehen, zumal wenn von einer solchen Stufe und Kräftigkeit derselben die Rede ist, wie sie bei den eigentlichen ansteckenden Krankheiten vorkommt. So ist weder die Annäherung zu Cholerakranken, noch das Gehen zu ihnen, ferner weder der Schweiss, noch das Blut, der Auswurf etc. Anderen nachtheilig geworden, wenn sie nicht schon eine deutliche Anlage zur Cholera hatten. Diese Anlage hängt eben so viel von besonderen Verhältnissen des ganzen Körpers ab, als, und vielleicht noch mehr, von den Verdauungsorganen. Es gibt Beispiele, dass an Orten, wo die Cholera herrschte, Leute davon ergriffen wurden, die nicht die geringste Verbindung mit Wohnungen und Menschen hatten, wo sie sich zuerst gezeigt hatte." Letzteres versteht sich von selbst; wenn in einer Stadt nach und nach ein paar Hundert Menschen von einer ansteckenden Krankheit befallen werden, so haben nicht alle von den zuerst Erkrankten die Krankheit bekommen.



nirgends aber ist erwiesen, dass die Cholera unmittelbar von den genannten Personen auf andere, mit ihnen bei ihrer Ankunft an die genannten Orte in nächster Verbindung gewesenen Personen übergegangen sei;» — eine Behauptung, die durch mehrere oben genau angegebene Beobachtungen widerlegt ist. Erwähnenswerth ist, was Sokolow weiter sagt: »Indem ich eine bedeutende Verletzung am Zeigefinger der rechten Hand hatte, verlor ich oft beim Blutlassen die Bandage und wurde vom Blute der Cholera-kranken, welches nicht selten in die Wunde selbst lief, benetzt. Ich sah Hospitaldiener und Hausmütter, denen das von den Kranken beim Erbrechen Ausgeworfene in's Gesicht spritzte, und die nichts destoweniger gesund blieben.«

Der Staabsarzt Smirnow sagt in seinem Gutachten in Betreff der Kontagiosität der Cholera: »Während der mehr als zweimonatlichen Dauer der Cholera in Orenburg dienten im dortigen Kriegshospitale den 299 Cholerakranken: ein Feldscheerer, 6 Zöglinge, eben so viele Baschkirische Knaben und 14 Hospitaldiener. Der Feldscheerer und die Zöglinge öffneten nach ihrer Pflicht den Kranken die Ader, rieben ihnen Hände und Füße, machten Umschläge, setzten Blutigel u. s. f.; die Diener wechselten die Wäsche, nahmen sie ab, setzten die Kranken in's Bad, u. s. f. Bei diesen Beschäftigungen musste man durchaus in die unmittelbare Nähe der Kranken kommen. Noch weniger war es möglich, die sie umgebende Luft nicht zu athmen, oder die in ihrer Nähe befindlichen Sachen nicht zu berühren; indessen hat Niemand von diesen 27 Personen die Cho-



lera bekommen \*). Während der ganzen Zeit der herrschenden Cholera waren aus der hiesigen Garnison als dejourirend abgegeben: Officiere, Fähnriche und Unterofficiere, und bis zur Versetzung der übrigen Kranken in's Lager, auch Feldscheerer und Zöglinge; alle diese kamen einigemal des Tages in die Hospitalsäle und athmeten dieselbe Luft mit den Cholerakranken, nicht einmal der Feldscheerer und Zöglinge zu gedenken, welche zuweilen die Kranken berühren mussten; doch ist nicht Einer von ihnen an der Cholera erkrankt. Auch die Wäscherinnen blieben frei; nur Eine, welche Officierwäsche reinigte, wurde krank, aber noch ehe ein an der Cholera erkrankter Officier in's Hospital gekommen war. Ich und der Staabsarzt Sokolow näherten uns häufig den Cholerakranken in allen Stufen des Uebels, ohne dasselbe zu bekommen. Zwar erkrankten einige Hospitaldiener an der Cholera, aber ohne bei solchen Kranken gewesen zu sein. Auch befiel sie einige an andern Uebeln leidende Kranke, welche jedoch von jenen ganz getrennt gewesen waren.» — Uebrigens äussert Smirnow am Ende seines Berichtes, dass er den Beobachtungen anderer Aerzte zufolge zu der Annahme geneigt sei, dass das früher nicht ansteckende Uebel ansteckend geworden sei.

---

\*) Dass der Staabsarzt Gamerilow und der Bezirksarzt Onufriew von der Cholera ergriffen wurden, was man aus dem Bericht des Operateurs Woskobrinikow vom 7/19. Okt. ersieht, verschweigt Smirnow. Nach dem Bericht des Orenburgischen Civilgouverneurs vom 3/15. Okt. waren um diese Zeit schon drei Aerzte in Orenburg erkrankt und Onufriew allein zur Hülfeleistung übrig geblieben, der, wie aus dem vorerwähnten Berichte hervorgeht, in den nächsten Tagen auch erkrankte.



Dem Berichte des Operateurs Woskobrini-  
kow vom 7/19. Okt. zufolge bekamen viele Leute, die  
nicht die geringste Gemeinschaft mit Kranken hatten  
und fern von Häusern lebten, in denen sich Kranke  
befanden, dennoch die Cholera. Dasselbe wird auch  
in einem Gutachten der Orenburg'schen Aerzte be-  
hauptet.

Ueber die gegen die Verbreitung der Brechruhr  
im Orenburgischen Gouvernement ergriffenen Maassre-  
geln geben die vom Medicinalrath in Petersburg be-  
kannt gemachten Aktenstücke nur einen sehr unvoll-  
kommenen Aufschluss. Das ärztliche Comité in Oren-  
burg erklärte sich, wie wir gesehen haben, in sei-  
nem ersten Gutachten vom 17/19. Sept. aus einem sehr  
unhaltbaren Grunde gegen die Annahme der Konta-  
giosität der Cholera. Dagegen modificirte dasselbe  
unterm 4/16. Okt. seine Ansichten dahin, dass die Frage  
über die Ansteckungsfähigkeit der Cholera noch un-  
entschieden sey. »Die hiesigen Aerzte«, heisst es in  
dem zweiten Gutachten, »haben bis jetzt keine An-  
steckung bemerkt; dasselbe wird auch von vielen aus-  
ländischen Aerzten versichert. Da jedoch unter den  
Letzten auch Einige der entgegengesetzten Meinung  
sind, und da der Medicinalrath des Ministeriums des  
Innern in der von demselben bei der im Jahr 1822  
(soll heissen 1823) in Grusien herrschend gewesenen  
Cholera herausgegebenen Verordnung die Aufstellung  
von Quarantainen an den ergriffenen Orten und da-  
durch gewissermaassen die ansteckende Natur aner-  
kannt hat, so erkennt der Rath der Orenburgischen  
Aerzte \*) zur Abwendung verderblicher Folgen, die

---

\*) Dieser Rath kann am 4/16. Okt. aus dem einzigen Onu-



aus dieser Krankheit hervorgehen könnten und nun die bei Unterlassung der in dieser Beziehung nöthigen Vorsichtsmaassregeln mögliche Verbreitung zu hindern, für nützlich, unter diesen Umständen auch hier sowohl in bürgerlichen als militärischen Beziehungen alle in der Verordnung des Medicinalraths angegebenen Vorsichtsmaassregeln zur Richtschnur zu nehmen. Diese geben hinlänglich an, was jeder Einzelne zu seinem Schutze thun müsse, so wie auch, was zur Bewahrung der benachbarten gesunden Ortschaften nöthig ist. Die Behandlung der in Orenburg befindlichen Cholerakranken ist bis jetzt übereinstimmend mit der Anordnung des Medicinalrathes gewesen.» Schliesslich ist noch die Bemerkung beigefügt: »Zur Quarantaine für Menschen und Waaren, die aus Orten kommen, wo die Cholera herrscht, werden 14 Tage für hinlänglich gehalten.»

Am 7/19. Okt. kamen die Quarantainemaassregeln in Vollziehung; jedoch geht aus der ungenügenden Weise, wie dies geschah, hervor, dass man in Orenburg wenig Werth darauf legte, wie man auch aus dem folgenden weitem Gutachten der Orenburgischen

---

friew bestanden haben, da man aus dem Bericht des Civilgouverneurs vom 3/15. Okt. ersieht, dass alle Aerzte, mit Ausnahme Onufriews, krank waren. — Letzterem widerspricht aber wieder ein vom 8/20. Okt. datirtes „Gutachten der Orenburg'schen Aerzte,“ worin es heisst: „Bis jetzt hat keiner der hiesigen Aerzte beobachtet, dass die Cholera sich von den daran leidenden Personen auf Gesunde fortgepflanzt habe. Es hat sogar keiner von denen, welche die Kranken abgewartet, so wie auch keiner von den Aerzten, die mit ihnen häufigen Verkehr gehabt haben, die Cholera bekommen.“ Ohne Zweifel ist das Datum dieses Gutachtens unrichtig angegeben.



Aerzte vom 10/22. Okt. sieht. Dieses lautet folgendermaassen:

»Obgleich nach den Beobachtungen aller Aerzte, welche die in Orenburg an der Cholera leidenden Kranken behandelt haben, diese Krankheit sich nicht als ansteckend erwiesen hat, so setzt dennoch, da nach den der Obrigkeit (zugegangenen Nachrichten die Krankheit sich schon in einigen Umgebungen und Dörfern dieser Stadt gezeigt hat, der auf Befehl des Kriegsgouverneurs vom 9/21. Okt. gebildete Rath folgende Vorsichtsmaassregeln fest:

1) Die militärische Umschliessung von Orenburg und den Vorstädten, welche durch die hiesige Obrigkeit in Ausführung gebracht worden ist, ist als nützlich anzuerkennen, nicht als Quarantaine, sondern als schützende Maassregel zu dem Zwecke, um zu einer allgemeinen Aufsicht und Untersuchung der Leute zu dienen, welche aus dieser Umgränzung hinausreisen. Ohnediess könnten viele von ihnen, wenn sie die ersten Anzeichen der Krankheit bekommen, auf dem Wege ein Opfer desselben und dadurch Schreck und Unruhe in entfernten Gegenden verbreitet werden. Diese Untersuchung kann sowohl für die hinausreisenden Personen als für die bei ihnen befindlichen und ihnen unentbehrlichen kostbaren Gegenstände auf einen Zeitraum von sieben Tagen \*) beschränkt werden, worauf denn die innegehaltenen Personen nach der Guyton-Morveau'schen Weise durch-

---

\*) Im vorigen Gutachten waren doch vierzehn Tage für nöthig gehalten worden. Solche halbe Maassregeln sind ganz zwecklos.



räuchert, und insofern sich keine Anzeigen von Krankheit darbieten, nach Wunsch entlassen werden können. Für die mit der Post abgehenden Papiere und Couverte genügt eine oberflächliche Durchräucherung \*).

2) Mit kaufmännischen Waaren und Paketen, welche mit der Post gehen, ist nach den Grundsätzen des Quarantainereglements zu verfahren.

3) Die Zulassung der Leute, welche aus gesunden Orten kommen, kann nur zur Bewahrung ihrer eigenen Gesundheit und ihres Lebens verboten werden.

4) Die zum Verkauf von essbaren Gegenständen und anderen zum Leben nothwendigen Bedürfnissen ankommenden Reisenden sind bis zur abgesteckten Gränze zuzulassen.

5) Für unvermögende Kranke muss man nach obrigkeitlicher Veranstaltung eigene Krankenhäuser errichten, um ihnen die nöthige Hülfe zu verabreichen. Wohlhabenden gestattet man, sich zu Hause behandeln zu lassen.

6) Alle an der Cholera leidende Personen sind fern von andern Kranken und in möglichster Geräumigkeit unterzubringen.

7) Es ist anzurathen, dass die Wäsche und die übrigen Kleidungsstücke sowohl von den an der Cholera Erkrankten als von den an derselben gestorbenen Personen in Salzwasser oder Lauge gewaschen und sodann ausgelüftet werden.

8) Um möglichst den nachtheiligen Einfluss der

---

\*) Wozu eine oberflächliche Durchräucherung? Wenn aus-  
sen am Briefe ein Ansteckungsstoff anhängen kann, so kann  
er es auch innen.



Luft abzuwehren, so ist die Polizei dahin zu verpflichten, dass unter ihrer unmittelbaren Aufsicht alle Häuser nach der Guyton-Morveau'schen Methode durchräuchert werden.

9) Wegen der feuchten und kühlen Jahreszeit müssen die militärischen Paraden, Uebungen und Wachtdienste vermindert werden, soweit es ohne Nachtheil der Kriegszucht geschehen kann.

10) Personen niederen Rangs, welche zu Wachtposten angewendet werden, muss man Winterschuhe und Pelze austheilen.

11) Die von der Cholera genesenen und aus dem Kriegshospitale ausgeschriebenen Personen muss man auf einige Zeit nicht zum Dienste verwenden, besonders nicht zu Nachtwachen.»

Der Petersburger Medicinalrath war gleich beim Ausbruch der Cholera in Orenburg der Meinung, man soll zu Quarantainemaassregeln seine Zuflucht nehmen; in seinem Beschluss vom 21. Okt. (2. Nov.) tadelt er den in dem oben mitgetheilten Gutachten der Orenburgischen Aerzte aufgestellten Zeitraum von 7 Tagen, worauf dieser auf 14 Tage ausgedehnt wurde, was sich übrigens durch spätere Erfahrungen auch noch als unzulänglich auswies. Aus dem Beschluss des Medicinalraths zu Petersburg vom 23. Dec. (4. Jan.) sieht man, dass durch die eingegangenen Berichte ihm selbst die Zweckmässigkeit der Quarantainemaassregeln zweifelhaft wurde. Es heisst darin unter Anderm, aus den Berichten des Orenburg'schen Civilgouverneurs gehe hervor, dass die Erfahrung gelehrt habe, dass weder Quarantaine noch strenge Sperre den ver-



derblichen Wirkungen der Cholera Gränzen zu setzen vermögen; jedoch habe sich die letztere Maassregel doch nützlich gezeigt, weil die Kranken, sich von ihrem Wohnorte entfernend, einem frühzeitigen Tode unvermeidlich anheimfallen, blos wegen Mangels an Hülfe; ferner, wenn sich irgendwo Zeichen von Ansteckung gezeigt haben, so müsse man annehmen, dass dies wohl mehr von grosser Unreinlichkeit in den Wohnungen der Bauern entstanden sei; blos aus dieser Ursache sei die Trennung der Kranken von den Gesunden und Reinigung der Häuser nöthig. Es sei wahrscheinlich, dass die Cholera nicht ansteckend sei, sondern sich gleich andern epidemischen Krankheiten durch die Luft verbreite. In seinen den Aktenstücken beigefügten Schlussbemerkungen aber erklärt der Medicinalrath die Cholera wieder für ansteckend und sagt, die polizeilichen und Quarantainemaassregeln, welche im Orenburg'schen Gouvernement gegen die Krankheit ergriffen wurden, seien ohne allen Zweifel sehr nützlich gewesen.

Am  $\frac{1}{13}$ . Nov. beschloss der Petersburger Medicinalrath, den Orenburgischen Aerzten die Anwendung des Chlorkalks als Mittel gegen die Verbreitung der Cholera zu empfehlen und zu diesem Ende für's Erste 100 Pfund Chlorkalk nach Orenburg zu schicken. Ob man sich desselben bediente und mit welchem Erfolg, darüber enthalten die Berichte der Aerzte im Orenburg'schen Gouvernement kein Wort.

Was die Prädisposition zu der Krankheit betrifft, so bemerken darüber die Orenburg'schen Aerzte: »Nach der Ueberzeugung aller Aerzte, welche die in Orenburg und den Umgegenden ergriffenen Kran-



ken behandelt haben, ist die unterste Volksklasse, besonders die Leute, welche in feuchten, dumpfigen und engen Stuben oder Küchen, in Unreinlichkeit und Unsauberkeit leben, geeigneter und öfter als Andere der Cholera unterworfen, mehr die Unenthaltamen als die, welche eine wohlgeordnete Lebensweise führen, mehr die Frauen und besonders die schwangern, als die Männer, mehr Leute des mittlern Alters als Kinder. Was das körperliche Befinden betrifft, so hat nicht sowohl Schwäche oder Stärke, als ein gewisser (?) innerer Zustand des Körpers, und mehr noch eine unordentliche und gestörte Verdauung, eine Geneigtheit zu dieser Krankheit verbreitet.» Nach Ppurew litten in Sarmanaewa beide Geschlechter gleichmässig an der Krankheit, und der grössere Theil der Kranken war schon im absteigenden Alter. Nach Sokolow verhielt sich die Zahl der kranken Frauen zu der der Männer in Orenburg wie 5 zu 3.

Derselbe Arzt sagt: »der epidemische Einfluss war so mächtig, dass auch bei den von der Cholera frei gebliebenen Personen eine dunkle gelbliche Austretung in der Bindehaut bemerkbar wurde, obgleich niemals galigte Erscheinungen bei ihnen bemerkt wurden.» Nach Onufriew blieb zur Zeit der Epidemie kaum irgend ein Einwohner von Orenburg ohne alle Zeichen gestörter Verdauung.

Endlich bleibt uns noch übrig, von der im Orenburg'schen Gouvernement vor und während der Cholera-Epidemie stattgefundenen Witterung zu sprechen. Der Seuche ging eine starke Sommerhitze und zweimonatliche Dürre voraus; beim Ausbruch derselben hatte man nach Onufriew klare und warme Tage



mit kalten Nächten bei hohem Stande des Barometers; und Hofrath Reissner bemerkt in seinem Gutachten: lange fortgesetzte meteorologische Beobachtungen des Staabsarztes Pätnitzky beweisen, dass zur Zeit der Erscheinung und der Herrschaft der Cholera durchaus gar keine bedeutende Veränderungen im Vergleiche mit früherer Zeit vorgekommen sind. Diese Witterungsbeobachtungen sind erst vom 23. Okt. (4. Nov.) an in den Aktenstücken des Medicinalrathes mitgetheilt und enthalten Folgendes:

Vom 23. Okt. (4. Nov.) bis 30. Okt. (11. Nov.) war der Himmel trübe; Mittags schien die Sonne. Der am 20. (1. Nov.) gefallene Schnee erhielt sich mit kleinen Nachtfrosten, am Mittag schmolz jedoch viel davon und verursachte Schmutz. Anhaltend weheten sanfte Westwinde (und doch breitete sich die Seuche nicht gegen Osten aus), die Mittagswärme war nicht über 4° R., die Nächte waren halbhell; zuweilen sah man sogar Mond und Sterne; am Morgen war es jedoch warm, feucht und nebelig. Die feuchte kühle Witterung und besonders das Nasswerden der Füße, gab zu vielen Erkältungskrankheiten Anlass, namentlich zu Husten, Halsschmerz, Lungenentzündung und Seitenstechen. Zugleich hatte sich die Cholera bei einigen Personen, die schon wieder ganz von ihr befreit waren, mit ziemlich heftigen Zufällen wieder eingestellt \*).

Vom 30. Okt. (11. Nov.) bis 6/18. Nov. war eben-

---

\*) Nach Sokolow waren wiederholte Anfälle der Cholera gar nicht selten; er selbst beobachtete drei solcher Fälle im Hospital und zwei in der Privatpraxis.



falls anhaltend trübes Wetter; schwache Süd- und Südwestwinde; die Mittagswärme gleichmässig wie die Morgenfröste, nicht mehr als 3 Grad; wenig Schnee, schwacher Regen und Thau.

Vom  $6/18$ . Nov. bis  $13/25$ . Nov. war anfangs dieselbe feuchte Witterung; aber in der Nacht auf den  $9/21$ . wurde der Himmel klar, und am ganzen folgenden Tag war Sonnenschein bei schwachem Nordwest mit einem Morgenfrost von 5 Graden. Die Luft wurde rein, trocken und kühl; bis zum  $13/25$ . blieb dieses Wetter, nur mit Veränderung der Windrichtung; am  $11/23$ . war ein Morgenfrost von 8 Graden. In Orenburg hatte die Cholera bedeutend abgenommen.

Vom  $13/25$ . Nov. bis 20. Nov. (2. Dec.) war ein unbeständiger Zustand des Luftkreises; am  $13/25$ .,  $14/26$ .,  $15/27$ . und  $16/28$ . war klarer Himmel mit Ost- und Nordwestwinden; die Luft wurde rein und trocken, die Nächte klar, Morgenfröste von 6 bis 12 Graden; vom  $17/29$ . anhaltend trüber Himmel; ein starker Südwest brachte viel Feuchtigkeit, der Thermometer zeigte bei Tag und bei Nacht einige Grade Wärme, es fiel Schnee, Reif und Thau, aber am 19. Nov. (1. Dec.) ein schwacher Regen. Die Erde war mit Glatteis überdeckt, es war sehr feucht und nass. Die Cholera hatte in Orenburg fast ganz aufgehört.

Vom 20. Nov. (2. Dec.) bis 27. Nov. (9. Dec.) war abwechselnd Frost und Thauwetter, sehr wenig Schnee, starke Winde, am meisten aus Südwest; Fröste bis zu 20 Graden. Vom  $15/27$ . Nov. begann die Reinigung der Häuser; die Cholera hatte in Orenburg aufgehört.

Am  $10/22$ . und  $11/23$ . Dec. erreichte die Kälte 24



bis 27 Grade. Vom 6/18. Jan. war sie nicht unter 18 Graden, zuweilen 22 und 25. Die Winde waren schwache Südweste, das Wetter klar. Ohnerachtet dieser Kälte hatte sich die Cholera an verschiedenen Orten des Gouvernements gezeigt. —

Was die Beobachtungen der Orenburg'schen Aerzte in Beziehung auf die Symptome der Brechruhr und die Behandlung betrifft, so werden wir hierauf am geeigneten Orte zurückkommen.

Die im Obigen dargestellte Cholera-Epidemie blieb durchaus auf das Gouvernement Orenburg eingeschränkt, in welchem sie am 23. Febr. (7. März) 1830 vollständig erlosch. Die weitere Ausbreitung der Seuche über einen grossen Theil des russischen Reichs im Laufe dieses Jahres erscheint ohne Zusammenhang mit der Orenburgischen Epidemie; die Krankheit drang von Neuem aus Persien ein und verbreitete sich dann von den Gegenden des Kaukasus aus über die übrigen Provinzen.

## 2. *Nachrichten über die Cholera-Epidemie im Astrachan'schen Gouvernement im Sommer 1830.*

Ueber diesen Abschnitt der grossen Brechruhrseuche hat man durch einen Bericht des Staabsarztes Solomow \*), der auf Befehl des Medicinalraths zu St. Petersburg gedruckt wurde, genauere Kenntniss erhalten. Dieser Bericht zeichnet sich ganz vorzüglich dadurch aus, dass darin die Verbreitung der Krankheit sehr genau nachgewiesen ist, wodurch er

---

\*) Lichtenstädt, die asiatische Cholera etc. S. 180 bis 196.



in Beziehung auf den Streit über die Contagiosität von grosser Bedeutung ist.

Diesem Berichte zufolge zeigten sich am  $\frac{5}{15}$ . Juli 1830 an den Gränzen des Astrachan'schen Gouvernements Cholerakranke auf einem Kriegsschiffe, das aus Baku gekommen war und neunzig Werste von Astrachan gelegen hatte. Bis zum 20. Juli (1. Aug.) war noch Alles ruhig; die Krankheit schien sich auf die Quarantaine von Sedlistof, wohin das Schiff mit den Kranken gebracht worden war, beschränkt zu haben; aber an diesem Tage erkrankten in Astrachan selbst vier Menschen, und zwar im dritten Stadttheile an dem Flusse Kutum. Von hier verbreitete sich die Krankheit unvermerkt in der ganzen Stadt und ergriff viele Menschen. Vom 27. Juli (8. Aug.) kam sie an die Vorstädte, erreichte zuerst die nahe gelegenen Dorfschaften und verbreitete sich dann allmählich fast im ganzen Gouvernement.

Unmöglich blieb es, den ersten Punkt nachzuweisen, von dem aus sich die Krankheit in Astrachan verbreitet hat. Nach Gerüchten, denen man glauben darf, waren schon vor dem 20. Juli (1. Aug.) Cholerakranke vorhanden, von denen die Obrigkeit aber Nichts wusste. Der Mäckler Borissow, welcher bei seinem Erkranken zuerst der Polizei Anzeige machte, war 1823 Aufseher eines Cholerahospitals gewesen; mit den Gefahren der Krankheit bekannt, musste er sich an die Obrigkeit wenden, um Hülfe zu suchen. Als einen Beweis dieser Verheimlichung kann man unter Anderm den Umstand betrachten, dass am Abend vor dem Erscheinen der Krankheit in demselben Quartier ein Greis heimlich beerdigt worden war,



von dem die Polizei erst erfuhr, als sich die Gerüchte über die Cholera verbreitet hatten.

»Will man behaupten,« sagt Solomow, »dass die Krankheit in Astrachan als rein epidemisch entstanden sei, und in Folge der Hitze, die selbst im Schatten 28 Grade hatte, ansteckend geworden sei, so muss man sich doch wundern, wie so diese Krankheit gerade hier herrschend geworden, während sie zugleich in den russisch-persischen Provinzen vorhanden war, mit denen so häufiger Verkehr statt hatte. Vor 2 Jahren, als um und in Astrachan viel ausgetretenes Wasser vorhanden war, war viel mehr örtliche Veranlassung zur Entstehung der Cholera. Und entstand sie wirklich aus örtlichen Ursachen, warum zeigte sie sich zuerst auf einem Kriegsschiffe? Die so oft ausgesprochene Behauptung, dass die mit Cholerakranken beschäftigten Personen nicht ergriffen wurden, ist unrichtig. Denn wer von ihnen war nicht krank? Drei Aerzte hatten die vollständigste Cholera; die übrigen liessen Blut bei Zufällen, welche den Anfang der Cholera ausmachten. Die Leichenöffnungen beweisen Nichts, denn es sind nur zwei gemacht worden; bei der ersten war ich zugegen und kein Arzt hatte an der Oeffnung selbst Theil; der Lehrling aber, welcher dieselbe besorgte, bekam in der That einen Anfall. Von dem Dienstpersonal in den Hospitälern starben sehr Viele, und Wenige blieben ganz frei, Frauen gar nicht.«

Sehr wichtig sind folgende Nachweisungen Solomow's über die Verbreitung der Cholera.

1) Am 27. Juli (8. Aug.) begannen die Einwohner der nahegelegenen (3—5 Werste) tartarischen



Ortschaften (Baschmakow, Kulakawsk, Osypnობugrow, Triprotozki u. s. w.), welche eine ununterbrochene Verbindung mit Astrachan hatten, und wohin überdiess viele Familien aus der Stadt geflohen waren, zu erkranken. Seit jenem Tage zeigten sich Kranke in der Entfernung von 12 Wersten in dem Dorfe Tscherepacha bei der Ankunft von Leuten, die in Astrachan auf Arbeit gewesen waren; Einer von ihnen war der erste Cholerakranke.

2) Vom 29. Juli (10. Aug.) ging die Krankheit von Astrachan durch die Kosakenstationen und die Stadt Enotaewsk auf dem grossen Wege nach Moskau; sie verbreitete sich hier mit dem flüchtenden Volke. Diese Unglücklichen trugen den Keim der Krankheit in sich, erkrankten daran auf dem Wege und retteten sich nicht, während sie durch Mittheilung der Ansteckung die Bewohner der Stationen tödteten.

3) In Enotaewsk verbreitete sich die Krankheit mit der Ankunft eines aus Astrachan gekommenen kranken Leibeigenen.

4) Am 29. Juli (10. Aug.) kam nach Tschernoijar eine Barke, auf welcher einige Ruderknechte an der Cholera erkrankt waren. Am  $\frac{8}{20}$ . Aug. begann die Krankheit unter den Einwohnern der Stadt zu herrschen und ging dann zu den in der Nähe befindlichen Kirgisen, und in die oberhalb gelegenen Ortschaften Solodnikowsko und Wäsowka. In einer derselben war der erste Cholerakranke ein Soldat, welcher, von der Cholera angesteckt, Gefangene nach Zaritzyn gebracht hatte und wieder zurückgekehrt war.



von dem die Polizei erst erfuhr, als sich die Gerüchte über die Cholera verbreitet hatten.

»Will man behaupten,« sagt Solomow, »dass die Krankheit in Astrachan als rein epidemisch entstanden sei, und in Folge der Hitze, die selbst im Schatten 28 Grade hatte, ansteckend geworden sei, so muss man sich doch wundern, wie so diese Krankheit gerade hier herrschend geworden, während sie zugleich in den russisch-persischen Provinzen vorhanden war, mit denen so häufiger Verkehr statt hatte. Vor 2 Jahren, als um und in Astrachan viel ausgetretenes Wasser vorhanden war, war viel mehr örtliche Veranlassung zur Entstehung der Cholera. Und entstand sie wirklich aus örtlichen Ursachen, warum zeigte sie sich zuerst auf einem Kriegsschiffe? Die so oft ausgesprochene Behauptung, dass die mit Cholerakranken beschäftigten Personen nicht ergriffen wurden, ist unrichtig. Denn wer von ihnen war nicht krank? Drei Aerzte hatten die vollständigste Cholera; die übrigen liessen Blut bei Zufällen, welche den Anfang der Cholera ausmachten. Die Leichenöffnungen beweisen Nichts, denn es sind nur zwei gemacht worden; bei der ersten war ich zugegen und kein Arzt hatte an der Oeffnung selbst Theil; der Lehrling aber, welcher dieselbe besorgte, bekam in der That einen Anfall. Von dem Dienstpersonal in den Hospitälern starben sehr Viele, und Wenige blieben ganz frei, Frauen gar nicht.«

Sehr wichtig sind folgende Nachweisungen Solomow's über die Verbreitung der Cholera.

1) Am 27. Juli (8. Aug.) begannen die Einwohner der nahegelegenen (3—5 Werste) tartarischen



Ortschaften (Baschmakow, Kulakowsk, Osüpnobugrow, Triprotozki u. s. w.), welche eine ununterbrochene Verbindung mit Astrachan hatten, und wohin überdiess viele Familien aus der Stadt geflohen waren, zu erkranken. Seit jenem Tage zeigten sich Kranke in der Entfernung von 12 Wersten in dem Dorfe Tscherepacha bei der Ankunft von Leuten, die in Astrachan auf Arbeit gewesen waren; Einer von ihnen war der erste Cholerakranke.

2) Vom 29. Juli (10. Aug.) ging die Krankheit von Astrachan durch die Kosakenstationen und die Stadt Enotaewsk auf dem grossen Wege nach Moskau; sie verbreitete sich hier mit dem flüchtenden Volke. Diese Unglücklichen trugen den Keim der Krankheit in sich, erkrankten daran auf dem Wege und retteten sich nicht, während sie durch Mittheilung der Ansteckung die Bewohner der Stationen tödteten.

3) In Enotaewsk verbreitete sich die Krankheit mit der Ankunft eines aus Astrachan gekommenen kranken Leibeigenen.

4) Am 29. Juli (10. Aug.) kam nach Tschernoijar eine Barke, auf welcher einige Ruderknechte an der Cholera erkrankt waren. Am  $\frac{8}{20}$ . Aug. begann die Krankheit unter den Einwohnern der Stadt zu herrschen und ging dann zu den in der Nähe befindlichen Kirgisen, und in die oberhalb gelegenen Ortschaften Solodnikowsko und Wäsowka. In einer derselben war der erste Cholerakranke ein Soldat, welcher, von der Cholera angesteckt, Gefangene nach Zaritzyn gebracht hatte und wieder zurückgekehrt war.



5) Am 25. Juli (6. Aug.) begann die Krankheit in Krasnoijar an der Wolga, 30 Werste von Astrachan, mit einem Gemeinen des Invalidenkommando's und einem 13jährigen Mädchen, die aus Astrachan gekommen waren.

6) Am  $\frac{3}{15}$ . Aug. kam die Krankheit in die Besetzung des Herrn Nekrasow, 15 Werste von Krasnoijar, und nach den Algarin'schen Hügeln in der Nähe der Stadt; zuletzt schlich sie sich auch in den Kosakenkordon an der kaspischen Linie, welche eine beständige Verbindung mit der Stadt haben.

7) Von den Ortschaften Makowsky und Schitinsky, welche unterhalb am kaspischen Meere am Ausflusse der Wolga liegen, befanden sich Fischer in Astrachan. Bei der Erscheinung der Cholera eilten sie erschreckt vor der Krankheit nach Hause, um sich zu schützen; aber schon hatten sie das Gift eingenommen; Einige erkrankten auf dem Wege, Andere in ihren Wohnungen an der Cholera, die sodann auf die übrigen Bewohner dieser Orte überging.

8) Am  $\frac{2}{14}$ . Aug. unterlag die Salzniederlage von Basinsk in der kaukasischen Reihe 15 Werste vom grossen Wege, dem allgemeinen Schicksale. Am  $\frac{1}{13}$ . Aug. war ein von der Cholera genesener Armenier dahin gekommen und hatte bei einem Gemeinen des Salzkommando's gewohnt, der am nächsten Tag erkrankte und starb. Seit diesem Tage erkrankten nun auch Andere.

9) Auf der Salzniederlage Rigatska, 30 Werste von Krasnoijar, erkrankte ein Gemeiner, den Solomow von Astrachan mit Arzneien und Verordnungen zur Heilung der Cholera dahin geschickt hatte,



nach seiner Ankunft an der Cholera, und nach ihm auch Andere.

Viele Gärten und Meiereien in der Nähe von Astrachan, welche den Verkehr mit den angesteckten Orten abgebrochen hatten, blieben frei; so auch viele Dörfer, deren Einwohner ähnliche Maassregeln ergriffen hatten, obgleich die Krankheit rings umher herrschte, z. B. die Dörfer der Herrschaften Smirnow, Beketow und Fürst Dolgorucki, Sarepta, und einige andere.

Die Kalmücken verliessen sogleich die Cholera-kranken, selbst mit den Kibitken, und suchten sich einen andern Platz, 20 Werste und weiter entfernt, aber sie entflohen der Krankheit nicht, denn auch auf dem neuen Weideplatze zeigten sich wieder Kranke in den einmal ergriffenen Familien.

In Astrachan erkrankten besonders unter dem gemeinen Stande ganze Haushaltungen durch einen Kranken. »Ich kenne Familien,« sagt Solomow, »die fünf bis sechs Todte gehabt haben. Führt man Beispiele an, dass viele Personen, die mit Cholera-kranken oder an dieser Krankheit Gestorbenen zu thun gehabt hatten, nicht angesteckt wurden, so kann man viel mehr Beispiele vom Gegentheile anführen.«

### 3. *Nachrichten über die Brechruhipidemie in Saratow im August 1830.*

Die nachstehende Schilderung der Epidemie in Saratow ist in mehrfacher Beziehung interessant; sie ist das Tagebuch des evangelischen Pastors Huber daselbst, das schon Lichtenstädt theilweise bekannt



gemacht hat. Wir geben hier dasselbe vollständig, insoweit nicht durch das Eingehen in persönliche Verhältnisse Auslassungen nöthig geworden sind.

---

Raum war die officiële Nachricht aus Astrachan eingegangen, dass die Cholera daselbst ausgebrochen sei und schnell und heftig um sich greife, wesshalb auch Aerzte dahin requirirt wurden, so hiess es, die Krankheit nähere sich von Süden her längs der Wolga mit Blitzesschnelle dem hiesigen Gouvernement und habe einen sehr bösartigen Charakter. Eben so schnell kamen Eilboten mit der Nachricht, das Uebel wäre schon in Zaritzyn und Dubowka ausgebrochen.

Ohne zu ahnen, dass uns der Todesengel so nahe sei, reisten der Vicegouverneur, der Medicinalinspektor, der Operateur\*) und der Spitalarzt dahin ab. Aber schon am 6/18. Aug. Abends hiess es, auch hier seien drei Personen, auf der Wolga von Astrachan kommend, befallen und in das Spital gebracht worden. Am 7/19. sollen alle diese gestorben und sofort Mehrere von der Krankheit befallen worden sein, und zwar mit so schnellem tödtlichem Verlauf, dass ein dumpfer Schrecken alle Gemüther erfüllte, vorzüglich derer, die im zweiten Stadttheile, näher an der Wolga, wohnten. Doch schon Tags darauf er-

---

\*) Diess ist der Titel des chirurgischen Mitglieds der ärztlichen Gouvernementsbehörden.



griff das Uebel auch einige Bewohner des dritten und ersten Stadttheils, und das Spital, sagte man, sei so überfüllt, dass man die Kranken nicht mehr bergen könne, und alle sollen in 6 bis 12 Stunden an Erbrechen, Durchfall und Krämpfen, blau werdend, ohne Rettung dahinsterven.

Das Uebel kam so schnell und unerwartet, dass an keine Vorkehrungen auch nur gedacht war. Der Vicegouverneur und die meisten Aerzte waren abwesend, um dem Uebel in der Ferne zu begegnen und ihm den Eingang nach Saratow zu wehren; aber es war schon da, ehe noch irgend eine Anstalt getroffen war, und ehe man wusste, wie man ihm begegnen sollte. Man glaubte anfänglich weder an die Grösse der Gefahr noch an irgend eine Ansteckung, jetzt aber ist die Grösse des Uebels durch die Menge der Opfer bekannt, und alle Aerzte sagen: diese Krankheit hat doch etwas Ansteckendes und ist nicht blos epidemisch, sondern auch contagiös; warum wären sonst so viele Dörfer ganz frei, während in ganz Saratow fast kein Individuum getroffen wird, das nicht über etwas Cholerartiges an sich zu klagen hätte \*)?

Was anfänglich immer vom gemeinen Volk erkrankte, ward über Hals und Kopf ergriffen und ins Spital geschleppt. Der Spitalarzt war abkommandirt; der Stellvertreter kannte das Lokal nicht, wusste zu wenig Bescheid, es fehlte an Raum, an Gehülfen, an Handlangern, sogar an präparirten Medikamenten für

---

\*) Diese Beobachtung könnte eher als ein Beweis für die rein epidemische Natur der Krankheit angesehen werden, als für die Contagiosität.



die schnell wachsende Zahl der Kranken. Die Aerzte mochten wohl die Krankheit in genere kennen, aber das hier herrschende Uebel, die eigentliche Natur der hiesigen Krankheit musste ihnen verborgen sein; denn was anderwärts die Krankheit geheilt haben soll, half hier nicht. Man liess zur Ader, gab versüßtes Quecksilber und Laudanum liquidum Sydenhami, es wurden Einreibungen aller Art verordnet und angewendet; doch Niemand entging anfänglich dem Tode. Ich selbst bin Augenzeuge gewesen, dass die verordneten Mittel zu rechter Zeit und pünktlich gebraucht wurden; dennoch ward, so zu sagen, Niemand gerettet, der von der ganzen Macht der Krankheit, so lange sie noch stieg, befallen wurde.

Als aber auch gleich in den ersten Tagen alle vier hier anwesenden Aerzte (zwei von diesen starben hier, die andern auf der Reise nach und in Zaritzyn) von dem Uebel befallen wurden, sich zur Ader liessen, von Krämpfen heimgesucht, von Durchfall u. s. w. geplagt wurden und Einer, aller angewandten Mittel ungeachtet, sogleich starb, da ward Angst, Furcht, Schrecken und Muthlosigkeit allgemein. Was aus der Stadt fliehen konnte, floh, und da man das Uebel nicht für ansteckend hielt, liess man, was fliehen wollte, ungehindert in alle Winde sich zerstreuen. Die meisten nicht in Diensten stehenden Herrschaften zogen auf das Land, und fast alle Dienstboten und Gesellen, Tagelöhner und Arbeiter und andere nicht ansässigen Russen, Deutsche, Tartaren u. s. w. machten sich davon. Wenn meine Gemeinde den 7/19. Aug. 550 Individuen zählte, so verringerte sie sich bis zum 10/22. dess. Monats gewiss um 150 Per-



sonen. Denn da die Polizeiknechte die mündlich gegebene Instruktion buchstäblich und roh genug befolgten, von Haus zu Haus herumgingen, nach Erkrankten fragten, die Kranken gemeiner Leute aufgriffen und in's Spital schleppten, wo keine Hülfe, keine Pflege sein und Alles sterben sollte, trieb Furcht und Angst unsere Kolonisten aus der Stadt auf ihre Dörfer. Mehrere sollen auf dem Wege gestorben sein und die Krankheit weiter verbreitet haben.

Vom 7/19. bis 20. Aug. (1. Sept.) stieg die Krankheit unerhört schnell, heftig und immer tödtend. Sie raffte anfänglich täglich 4, 5, 12, 40, 80, 120, 200, und an einem Tage, sagt man, sogar 260 Personen dahin. Und wie das Sterben zugenommen, so nahm es auch wieder ab. Bis zum 30. Aug. (11. Sept.) sollen 2170 Personen gestorben sein. Erst am 26. Aug. athmete man allgemein wieder freier, und das wiedergekehrte Sicherheitsgefühl erheiterte die Gemüther. Doch auch heute den 31. Aug. (12. Sept.) sind wir noch nicht ganz von diesem Todesengel befreit, doch ist er in vollem Abzuge. (Am 1/13. und 4/16. Sept. starben noch 2 Kinder.)

Den ganzen Monat Julius bis Anfang August war hier bei Tage eine fast unerträgliche Hitze, und die Nächte waren im Freien sehr kühl, aber in den Häusern lagen wir auch bei Nacht in einem unaufhörlichen Schwitzbade. Bei Tag und Nacht floss der Schweiss in Strömen, vom Durste wurde man unsäglich geplagt, gedrückt und ermattet. Gewitter hatten wir selten und keine erschütternde. Der Regen blieb aus, und wenn er auch hier und da sparsam herunterfiel, so leckte ihn die glühende Sonnenhitze



schnell wieder auf und brannte die Erde aus. So vorbereitet, ich möchte sagen, empfänglich gemacht für das verheerende Uebel, wurde die Cholera von Schiffsarbeitern über die Kaspische See nach Astrachan, nach Zaritzyn, nach Dubowka, nach Saratow gebracht. Eben solche Schiffsarbeiter, deren zwei ausgesetzt wurden, brachten etwas später die Cholera in die nächste Kolonie der Bergseite an der Wolga, wo Mehrere daran starben, übrigens, vielleicht weil die Kolonisten bessere Quarantainemaassregeln ergriffen, sie nicht weiter um sich griff. Auch, sagt man, hat der Koloniarzt auf Verlangen in jener Gegend an 400 Kolonisten zur Ader gelassen. Auch nach Wolsk, nach der Kosakensloboda, Saratow gegenüber, und nach Lesnoi-Karamisch soll durch ankommende Personen die Cholera hinggebracht worden sein, und sie wäre nicht ansteckend? Zum Glücke haben sich die Schreckensbotschaften aus jenen Gegenden nicht in so hohem Grade bestätigt, und es sollen daselbst Wenige, in Sarepta, wo die besten Quarantainen waren, gar Niemand gestorben sein. Jetzt, hört man, soll die Cholera aufs Neue in Orenburg ausgebrochen sein und sehr wüthen \*). Gott gebe, dass die Nachrichten falsch sein mögen! Auch auf unsere benachbarten Dörfer wurde das Uebel hinggebracht; doch herrscht es daselbst nicht in so hohem Grade, wie anfänglich hier der Fall war.

Ich kam am  $\frac{6}{18}$ . Aug. Nachts 10  $\frac{1}{2}$  Uhr von einer amtlichen Reise aus N. zurück, wobei ich mich über

---

\*) Diese Nachricht war falsch; nur in einigen Niederlassungen des Orenburgischen Gouvernements zeigte sich in diesem Sommer die Cholera.



das langsame Fahren geärgert und etwas erkältet hatte und einen wässerigen Durchfall bekommen hatte. Bis zum  $11/23$ . Aug. hatte ich in meiner Gemeinde noch keine Kranken; aber es waren der Todten um uns herum schon eine Menge begraben, und es wurden ihrer immer mehrere, denn das Uebel hatte sich schon in alle Gassen der Stadt verbreitet.

Am  $10/22$ . Aug., den zehnten Sonntag nach Trinitatis, predigte ich über das Evangelium: »Er sah die Stadt an und weinte über sie«; und da die Noth und Angst schon gross war, so weinten auch wir nicht nur über die Stadt, sondern auch über uns und unsere Kinder. Darauf ermunterte ich die Gemeinde nach Anleitung des 91. Psalms zum Vertrauen auf Gott und ermahnte dringend, die Angst und den Schrecken zu verbannen und den Muth und die Glaubensfreudigkeit nicht sinken zu lassen; und wer zugegen war, der fühlte sich gestärkt und standhafter in Erwartung der Dinge, die da kommen sollten. Ich aber fühlte ganz und von Stunde an das Gefahrvolle, aber auch das Heilige meines Berufs, und meine ganze Seele betete in mir: »Gott, erhalte mich für meine Gemeinde und für die Meinigen! Schonungslos will ich gerne mein Leben verlieren um deinetwillen, erhalte und stärke mich!« denn mir schwebte Matth. XVI. 25. recht lebendig und eingreifend vor Augen und im Herzen.

Am  $11/23$ . Aug. gegen Mittag wurde ich zuerst zu unserem kranken Kirchenwächter gerufen. Durchfall, Erbrechen und schreckliche Krämpfe hatten ihn befallen. Er empfing das Sterbesakrament. Ich tröstete ihn, sprach ihm Muth ein und hiess ihn, sich sogleich



zur Ader zu lassen; rieth ihm, sich tüchtig einzureiben und versüßtes Quecksilber einzunehmen. Ich wusste aber auch, dass er sich durch eine Erkältung eine Entzündung zugezogen habe; nicht bei Jedem und immer war dieses der Fall; daher half auch das Aderlassen und versüßtes Quecksilber nicht Allen und nicht immer. Unser alter Wächter aber lebt noch.

Darauf ward ich zu einer jungen schwangern Frau gerufen; ich that an ihr, was mein Amt erheischte; auch ihr ward zur Ader gelassen, sie wurde tüchtig eingerieben u. s. w., aber starb. Eben so erging es vier anderen Personen; sie starben alle nach 12 bis 24 Stunden; ich besuchte sie 3 bis 4 mal. Alle hatten Erbrechen, Durchfall und fürchterliche Krämpfe; von Galle war nichts zu sehen; Hände und Füße wurden kalt und blau, kalter Schweiss floss in Strömen. Den Todesdruck fühlten sie alle in der Herzgrube; unleidlicher, mit Nichts zu stillender Durst, der in Mund und Schlund brannte, verursachte unaussprechliches Schmerzgefühl. Einer jener Kranken, ein junger robuster Postknecht, wurde in's Spital gebracht und starb nach einem Aderlasse in wenig Stunden; bei den Andern, wo mehr Fleiss angewandt worden war, wurde das Leben um einen halben oder ganzen Tag verlängert. Es war der  $12\frac{1}{24}$ . Aug., als die Obigen starben (nebst 2 Kindern von einem Jahre an Krämpfen). Ich ging heute fast von Haus zu Haus und besuchte Gesunde und Kranke, sprach Trost, Muth und Vertrauen auf Gott ein und ermahnte, dass man sich ja nicht durch Angst und Furcht selbst tödten und die Heiterkeit des Geistes verloren gehen



lassen möchte. Einige waren auf's Neue erkrankt, und das Uebel griff immer weiter um sich.

<sup>13</sup>/<sub>25</sub>. August. Heute wurde ich zu einem achtzehnjährigen Kolonisten, dann zu dem Exsareptaner Schmiedmeister H., dann zur Frau P. und zu einer Dienstmagd gerufen. Sie empfingen alle das Sterbesakrament und starben alle bis auf die Dienstmagd, die noch lebt, minder heftig befallen war und immer warm blieb. Es war noch ziemlich frühe, als ich zu einem dieser Kranken gerufen wurde. In der Nacht vorher mussten Einige auf der Strasse von dem Uebel befallen worden sein, denn ich trat unversehens in den Nebenstrassen in Cholera-Exkremeute. Ich hatte Mühe, meine Natur zu bekämpfen. »Gott«, seufzte ich, »hilf! Wozu Religion, wenn sie nicht Alles besiegt und zur Pflichterfüllung begeistert und Geist und Muth oben hält?« — So gestärkt trat ich in die Jammerhütte, und die Frau des H. lag auf der Erde im Stroh, er im Heu, und ihre Exkremeute um sie herum. Mich befiel auf's Neue Eckel, ich wusste nicht, wo ich meinen Fuss hinsetzen sollte, Alles war besudelt. Ich behielt das Abendmahlgeräthe in den Händen, war in Todes- und Pestluft eingehüllt; meine Oberkleider hatte ich zwar in Vorhause abgeworfen; nachdem ich aber gethan, was meines Amtes gewesen, musste ich in's Freie, um meinen Eckel, Ueblichkeiten und Aufstossen zu bekämpfen. So was kehrte gar oft wieder, denn gross war die Noth, Angst und Armuth bei gar Vielen. Nach und nach wurde ich abgehärteter und muthiger.

Am <sup>14</sup>/<sub>26</sub>. Aug. besuchte ich mehrere Kranke, Furchtsame und Aengstliche, ergriff wohl auch Meh-



rere mit Macht und Ernst beim Arm und rief: »Auf mit Gott! Ihr habt die Krankheit nicht; warum wollt ihr euch vor der Hand tödten? Erhaltet euch euern Kindern und Familien. Auf mit Gott! Ihr sollt leben und nicht sterben!« So was half bei Manchem, aber ich habe mich auch oft bass geärgert; z. B. da kam der Nachbar links zu N. und sprach: »Ei, wie siehst du aus! Du hast die Krankheit, du stirbst!« Und der Nachbar rechts bekräftigt es und spricht: »Ja du stirbst, lass den Pastor rufen.« Und der Pastor kam, aber er wusste gleich, wer eine Bente des Todes war, und wer nicht; (die Kranken, welche mit den furchtbaren Krämpfen gleich mit oder nach dem Erbrechen und Durchfall befallen und an Händen und Füßen blau und kalt wurden, starben fast immer; wer aber warm blieb und warmen Schweiss in Strömen vergoss, starb selten, wenn er sich nur vor kaltem Trinken, Aerger, Angst und Furcht in Acht nahm); und hier das Letztere findend, ergriff er den Kranken und sprach: »Nein, ihr werdet nicht sterben, ihr habt gar nicht die Krankheit; fort, ihr leidigen Tröster! Wollt ihr Erschrockene tödten? Ihr aber Freund, fasst Muth, ihr braucht jetzt das heilige Abendmahl nicht, haltet euch nur warm, trinket nicht kalt und ängstigt und ärgert euch nicht, macht etwas Bewegung, stehet auf und betet zu Gott um Heiterkeit, frohen Sinn und Muth! Ihr braucht jetzt das heilige Abendmahl nicht. Jetzt muss ich zu einer andern Kranken, die mich nöthiger hat. Bald komme ich wieder, lasst euch von Niemand erschrecken!« Und ich kam wieder, fand den Mann besser; er lebt. Heute hatte ich auch fünf Leichen einzeln



in ihren Häusern eingesegnet und fuhr dann, weil ich Zeit hatte (denn am hellen Tage wurde ich selten zu Kranken gerufen), mit sämtlichen Leichen auf den Todtenacker. Während unsers Zuges begegneten uns mehr denn 60 Särge.

<sup>15</sup>/<sub>27</sub>. Aug. Von gestern auf heute wurde ich in der Nacht zu mehreren Kranken gerufen. Alle starben nach Verlauf von nicht 24 Stunden. Mit Herrn v. St. sprach ich noch heute Abend nach 6 Uhr. Er war sehr heiter, wie er denn seit 8 Tagen sehr heiter und froh war und sich in seinem Gemüthe wohl befand. Ich kam von Kranken, im Umblick sah ich ihn mit seinen Nichten am offenen Fenster sitzen; ich erzählte von vielen Kranken und von meinem Durchfall u. s. w. Er nahm wohlwollenden, innigen Antheil, und als bei wechselnder Laune die Querfrage scherzend gethan wurde, wie oft ich denn laufen müsste, erwiederte ich: so oft ich Zeit habe; denn buchstäblich heute von 7 bis 12 Uhr hatte ich Kranke und Sterbende zu besuchen, da hatte ich keine Zeit; kaum aber war ich eine Stunde zu Hause, so war auch des Laufens kein Ende. Wir schieden heiter von einander. Gegen 10 Uhr wurde er von Krämpfen, Erbrechen und Durchfall befallen; es wurde nach einem Arzte geschickt, es war keiner zu haben, alle waren krank. Endlich kam so ein Stück von weiland Arzt-discipel, dieser hielt keine Aderlässe für nöthig, man konnte auch nicht einmal eines Aderlassers habhaft werden, und so erkaltete der Kranke immer mehr; und um 4 Uhr des Morgens am <sup>16</sup>/<sub>28</sub>. Aug. reichte ich ihm das Sterbesakrament. Um 9 Uhr besuchte ich ihn wieder, im Gemüthe war er eben so heiter, ruhig



und in Gottes Willen ergeben. Er drückte schwach, aber freundlich mit seiner eiskalten Hand die meine. Um 11 Uhr war er eine Leiche. Gleich nach Herrn v. St. gab ich der Frau E. das Todesmahl; diese Frau hatte Alles, was diese hässliche Cholera mit sich bringt, aber sie war glühend heiss, schwitzte viel, ward besser und lebt noch; ich sagte gleich: »nur brav gerieben und in Schweiss gehalten! Sie wird nicht sterben.« Anders war es mit der Mutter, Baronin v. H.; sie war kalt und starb bald nach dem Genusse des Sakraments, übrigens zählte sie nahe an die 80 Jahre.

Nachdem ich diesen Sonnabend noch Einige begraben und einige Kranke und Gesunde besucht und ihnen nach meiner Weise Trost und Muth eingesprochen hatte, wurde ich von Mehreren angeredet, den 17/29. Aug. das heilige Abendmahl in der Kirche zu halten. Nachdem ich in der Nacht zu einigen Kranken gerufen und bis gegen 10 Uhr mehrere auch ungerufen besucht hatte, fing ich den Sonntagsgottesdienst an und verkündigte gleich anfangs: »Wer sich immer in dieser todesschwangeren Zeit aufgereggt und freudig fühlt, den Tod desjenigen zu verkünden, der Leben hat, der komme auch ungemeldet und empfangen Vergebung, Trost, Segen und Alles, was uns der Gott der Liebe bereitet hat in seinem Sohne.« Und so hielt ich die Vorbereitung und sprach die Absolution. Es kamen über hunderte. Das war ein wahres Todesmahl. Zur Demüthigung und Beugung diene uns der 90. Psalm und das Tagesevangelium: Gott sei mir Sünder gnädig; aber zum Troste und Vertrauen wählte ich den 91. und 93. Psalm. Auch heute



habe ich Einige begraben, denn schon in den ersten 24 Stunden rochen mehrere Leichen ganz furchtbar. An diesem Tage und in der Nacht wurden wieder Mehrere krank, verlangten und erhielten das Sterbesakrament. Nur Wenige von allen in diesen Tagen Erkrankten (ich möchte sagen, kein Einziger, der arg befallen wurde) kamen mit dem Leben davon. Für mich aber war Folgendes den 17/29. Abends das Angreifendste: Ein Webermeister H., dessen Frau und späterhin noch ein Kind ich beerdigte, dessen übrige drei Kinder aber alle an Erbrechen, Durchfall und Krämpfen darniederlagen, wollte heute mit der Gemeinde das heilige Abendmahl empfangen, musste aber bei seinen Kindern zu Hause bleiben. Er kam nun auf den Abend zu mir in's Haus, wo ich ganz allein war. Er äusserte das Verlangen, das Sakrament zu geniessen; denn es wäre ihm so, als wenn er sterben müsse. Dabei roch er wie eine Leiche. »Gut«, erwiderte ich, »wir sind jetzt ganz allein, und es ist so stille hier; ich habe ein Stündchen Zeit; und fühlt Er sich aufgereggt, so reiche ich es Ihm sogleich.« »Ach ja, wenn Sie wollten, es wäre mir sehr lieb.« Dabei war er äusserst bewegten Gemüths. Ich tröstete ihn, so gut ich konnte, nahm ihm die Beichte ab und sprach die Absolution, reichte ihm dann nach gemüthlicher Vorbereitung — denn ich war selbst sehr wehmüthig und ergriffen — das Sakrament. Kaum aber hatte ich den Segen über ihn gesprochen, so entfernte er sich schnell aus der halbdunkeln Gaststube, kam aber nur bis in den Saal und erbrach sich sogleich ganz fürchterlich, (so fing hier oft die Krankheit an, und nach wenigen Stunden folgte



der Tod); und der Geruch war eben so stark, als mein Schrecken und der mich überraschende Eckel gross war. Doch fühlte ich die Angst des Mannes, der Gott und mich beleidigt zu haben wähnte, mehr als mich selbst, bekämpfte und überwand meinen Eckel, tröstete den höchst verlegenen Mann, den es auch ängstete, das heilige Abendmahl ausgebrochen zu haben. Aber mein Trost wollte nicht haften, und er erbrach sich in der Vorstube zum zweiten Mal, dann unter der Hausthüre zum dritten Mal fürchterlich. Endlich hatte ich mich mit Gott völlig wieder gesammelt und ermannt und sprach nun mit Wehmuth, Liebe und Macht: »Lieber Mann! Es ist Krankheit; Er hat keine Schuld, ängstige Er sich auch nicht meinetwegen, noch des Abendmahls wegen; das Sakrament ist ja nicht für den Magen, es ist für den Geist, und Sein Geist hat es empfangen und behalten, Sein Leib aber hat nur Brod und Wein ausgebrochen, und vor Gott ist Brod, Milch u. s. w. Alles, Alles einerlei — und Er ist in Allem ohne Schuld, und wo keine Schuld ist, da ist auch keine Sünde, darum ängstige Er sich nicht, gehe Er nach Hause und lege Er sich, es wird Ihm besser werden.« Der Trost schien zu haften; der Mann ging nach Hause, ihm ist besser geworden, und er lebt noch. Ich aber musste doch räuchern, reinigen und lüften lassen und mir Heiterkeit und Ruhe erbeten. Es eckelte mich aber doch so lange, bis ich mich erbrach; darauf ward mir wieder wohl, und mein Geist ermannte sich wieder.

<sup>18</sup>/<sub>30</sub>. Aug. Nachdem ich in der Nacht zu einigen Kranken geholt worden war und auch am Tage ei-



nige nebst Gesunden und Furchtsamen besucht hatte, beerdigte ich die Leiche des Herrn von St., der Baronin v. H. und noch einige andere, die ich nicht auf den Gottesacker begleiten und nur in ihren Häusern einsegnen konnte. Hernach besuchte ich den guten L., dem ich schon früher das heilige Abendmahl gereicht hatte. Er ahnte seinen Tod, liess es sich nicht ausreden und endete wirklich den folgenden Tag sein Leben. Auch mein Vorsänger und Küster erkrankte. Ich wurde diese Nacht zu einigen Sterbenden geholt, der Todesengel stand auf seiner höchsten Stufe der Gewalt.

<sup>19/31</sup> Aug. Heute ging ich frühe aus zum Besuche einiger Kranken; gegen 9 Uhr wollte ich, wie ich meiner Frau kund gethan, bei Freund L. mich finden; dicht neben ihm wohnt Herr v. Kr. Auf dem Wege dahin begegnet mir in vollem Galopp ein Pferd mit einer Droschke; dieselbe kam mir nach, als ich bei L. eingetreten war und man mir ihn schon als Leiche angekündigt hatte. In diesem Augenblicke forderte man mich zu Kr., um ihm das heilige Abendmahl zu reichen. Als ich bei ihm eintrat, vernahm ich schon der Kinder Wehklagen und das Geschrei der verzweiflungsvollen Gattin und Mutter; der schon Entseelte lag auf einem Bette, das ihm auf der Diele bereitet war, (die Angst trieb fast alle Kranke aus dem Bette), die Augen waren von Krämpfen verzogen und der ganze Leichnam, obwohl eben verschieden, kalt und in's Bläuliche schimmernd, wie alle Leichen in dieser verhängnissvollen Zeit.

Wer immer vor den 20. Aug. (1. Sept.) — so lange war das Uebel im Steigen — heftig befallen



ward, der war verloren; Nichts und Niemand rettete ihn vom Tode. Als aber späterhin die Anfälle lange nicht so mächtig waren, da mag dieses oder jenes geholfen haben, aber Manche brauchten auch fast gar Nichts als Schwitzbäder und Einreibungen und genesen bald. Auch A. W. hatte einen Anfall, ihr halfen ohne Aderlässe 30 Tropfen Laudanum. Aber N. gab man 40 Tropfen und er starb. Wahrlich man muss über die Natur dieser Krankheit und über ihre Heilart reiflicher nachdenken und ernstlichere, zweckmässigere Vorkehrungen treffen; denn ansteckend ist sie gewiss.

Vom  $19\frac{1}{31}$ . Aug. an wurde ich von Stunde zu Stunde matter, schwächer und zuletzt so, dass ich mich kaum mehr auf den Beinen erhalten konnte; mein Durchfall raubte mir allen Lebenssaft. Hierzu kamen noch die furchtbarsten Träume, in welchen mir so viele Lieben und Freunde und Sterbende in krampfhaften Zuckungen mit offenem Munde und blauer kalter Farbe vorschwankten und mir das Nachtlager zur wahren Folterbank machten. Ach! wär' es doch immer Tag! seufzte ich oft.

20. Aug. (1. Sept.) Heute schon musste ich Kr. beerdigen, denn er ging schon über. Als ich bis spät Abends mehrere Kranke besucht, einige Leichen eingesegnet und einige Gesunde ermuntert hatte, bekam ich gegen 9 Uhr ein ungewöhnliches Jucken, heftiges Spannen und Drücken in Händen und Schenkeln, und Alles concentrirte sich in der Herzgrube. Mir war zu Muthe, wie Einem, der Mord und Todtschlag begangen und zum Hochgericht geführt werden soll. Doch vom Tode ahnte mir rein gar Nichts, und zum Ster-



ben fühlte ich mich noch viel zu kräftig. Ich legte mich, rieb mich und liess mich reiben und salben. Mir war unsäglich heiss, ich schwitzte, wie im Glühofen, und doch hatte ich Bedürfniss, mich mit einer Decke nach der andern zudecken zu lassen; und als meine Frau noch oben darauf einen Pelz legte, so sagte ich bald: »Nun gut, jetzt bin ich musterhaft zugedeckt, aber doch gerade recht, nicht zu viel und nicht zu wenig.« Nach 1  $\frac{1}{2}$  Stunden liess der Schweiss nach, der Körper wurde wieder wohl und leicht und ohne Schwäche, Muth und Geist stärkte und erheiterte sich, und ich fing bald an zu scherzen: »Ach wenn es nur Tag wäre!« Warum? fragt mich meine Frau. »Ich würde mich sogleich abtrocknen, aufstehen, mich warm anziehen und mir im Freien bessern Muth er- und alle Grillen verlaufen.« Indem ich so redete, klopfte es, und ich wurde zu einer armen Kranken, deren Sohn bereits Leiche war, gerufen. »Nun, ich habe am Tage hinauswollen, und Gott ruft mich in der Nacht; es sey!« Ich trocknete mich sehr vorsichtig ab, zog mich sehr warm an, ging, kam in ein warmes Stübchen und schwitzte auf's Neue tüchtig. Ich that mit herzlicher Theilnahme, was meines Amtes ist, hüllte mich darauf wieder warm ein, kam nach Hause, legte mich und schlief 2  $\frac{1}{2}$  Stunden so ruhig wie ein Kind. Mein Körper war eher stark als schwach und mein Geist unendlich froh. Bald darauf wurde ich wieder abgerufen, ich trank einige Tassen Kräuterthee, nahm 6 Tropfen Pfeffermünzöl; dieses wiederholte ich am Tage einigemal, und mein Durchfall verlor sich, den ich vorher weder durch Kohlenstaub, noch durch Laudanum, noch



durch rothen Gewürzwein bändigen konnte; auch legte ich Senfteige auf die Waden, um den Krämpfen vorzubeugen, und da dieses Pflaster etwas zu lang liegen blieb, zog es Blasen, und so hatte ich ganz natürliche Fontanellen, die bis heute (den letzten August) noch nicht ganz heil sind.

Ein ganz ähnlicher Zufall kam nach einigen Tagen wieder, aber schwächer, und ich wurde mehr abgehärtet, konnte mich schneller raffen, fühlte mich bald wieder von Innen und Aussen gestärkt, ermunthigt, froh und heiter.

21. August (2. Sept.) Mehrere Begräbnisse und Krankenbesuche. Zu meinem grossen Troste und zu meiner innig wohlthuenden Freude nahm die Zahl der Neuerkrankten in meiner Gemeinde sehr ab.

22. Aug. (3. Sept.) Heute starben in meiner Gemeinde nur 2 Personen, worunter ein Kind von 2 Tagen; die Mutter hatte fürchterlichen Durchfall und gar manches Andere von der hier herrschenden garstigen Krankheit, besonders auch einen erschrecklichen Durst, der denn, wie bei mir, durch das heftige Trinken immer ärger wurde. Am Tage seiner Geburt kam ich früh des Morgens zu der kranken Mutter, sie lag, aller ihrer Uebel los, munter im Bette und der Neugeborne neben ihr; die Hebamme meinte aber, das Kind werde sterben, daher ich sogleich zu der Taufe schritt. Die Mutter lebt, aber das Kind starb und war blau wie Alle, die an dieser Krankheit starben. Heute wurde auch die Frau des W. beerdigt, auch eines seiner Kinder starb bald darauf.

23. Aug. (4. Sept.) Einige wurden beerdigt, wor-



unter auch die Mutter des Kn., dessen zweiter Bruder etwas früher gestorben ist, und Einige starben; unter diesen Dr. Fr. Meier, der an diesem Tage in Zaritzyn vollendete, von Allen betrauert. Wider Willen von seinem Posten abkommandirt stieg dieser dienstfertige Arzt blass auf den Reisewagen; und die Abschiedsworte an seine bange und ahnende Mutter waren: »Wenn man genug gelebt hat, so legt man sich hin und stirbt.«

24. Aug. (5. Sept.) Heute wieder einige Beerdigungen, aber keiner meiner Lieben und keine Neuerkrankte. Gottlob! der Todesengel scheint im Abzuge zu sein; Alles erholt sich und athmet freier. Heute hielt ich auf Verlangen wieder öffentliches Abendmahl, es gingen über 70 Personen, aber ach, wie viele in Trauerkleider gehüllt, beweinten ihre, vom Todesengel dahin gerafften Lieben!

Vom 25. bis 31. Aug. (6. bis 12. Sept.) sind zwar noch Einige gestorben und Einige erkrankt, aber nicht mehr so mächtig, und die Meisten erholen sich wieder. Ein Knabe von 16 Jahren, der seit 14 Tagen krank war, starb den 30. Aug. (11. Sept.) Auch starb ein früher erkranktes Mädchen von 8 Jahren den  $\frac{1}{13}$ . Sept., und noch ein Kind von 2 Jahren den  $\frac{4}{16}$ . Sept. Und so hätte ich in's Ganze 35 Leichen beerdigt. Noch 15 liegen krank, doch alle in der Besserung. Am Sonntag den 30. Aug. (11. Sept.) hielt ich ein öffentliches Dankgebet.

Meine Lebensweise in dieser Zeit war folgende: ich kleidete mich wie im kalten Winter ich fuhr sel-



ten, sondern lief zu den Kranken, um mich immer in Schweiss zu erhalten und weniger zu erkälten. Des Morgens oder in der Nacht, wenn ich ausging, wusch ich mich mit Essig, trank ein bitteres Schälchen oder heissen Thee mit Wein, nahm einen Theer- oder Essiglappen vor den Mund und die Nase. Appetit hatte ich gar keinen, ass oder trank nur Fleischsuppen aller Art, trank nur Wasser und Wein. Ich habe in einem Jahre nicht so viel Wein getrunken, als vom 12. bis 25. Aug. Von da an quälte mich der Durst nicht mehr so arg. Gottlob, dass die schreckliche Zeit vorüber, für mich und die Meinigen so glücklich vorüber ist!

4. *Weitere Nachrichten über die Brechruherepidemie zu Moskau im Winter 1830 auf 1831 \*).*

Wir haben bereits im ersten Bande eine Uebersicht der in Moskau an der morgenländischen Brechruhr Erkrankten, Genesenen und Gestorbenen, so weit wir damit bekannt waren, begonnen. Die dort mitgetheilte speciellere Uebersicht reicht vom 1. Nov. bis 6. Dec. 1830 (n. St.). Zur Vervollständigung derselben tragen wir hier aus dem Journal der praktischen Heilkunde von Hufeland und Osann, November 1830. die Uebersicht vom Anfang der Moskauer Epidemie nach.

---

\*) Vergl. Bd. I. S. 121 bis 130.



Vom

28. Sept. bis 11. Okt. sind erkrankt, genesen, gestorben

|             |        |    |       |
|-------------|--------|----|-------|
|             | 216    | 18 | 76.   |
| am 13. Okt. | 39     | 6  | 21.   |
| — 14. —     | 132    | 1  | 53.   |
| — 15. —     | 128 *) | 1  | 58.   |
| — 16. —     | 165    | 1  | 57.   |
| — 17. —     | 154    | 7  | 78.   |
| — 18. —     | 194    | 7  | 90.   |
| — 19. —     | 138    | 5  | 85.   |
| — 20. —     | 145    | 15 | 87.   |
| — 21. —     | †      | †  | † **) |
| — 22. —     | 174    | 35 | 91.   |
| — 23. —     | 196    | 23 | 81.   |
| — 24. —     | 200    | 18 | 92.   |
| — 25. —     | 237    | 39 | 105.  |
| — 26. —     | 244    | 30 | 118.  |
| — 27. —     | 175    | 21 | 104.  |
| — 28. —     | 169    | 36 | 86.   |
| — 29. —     | 195    | 36 | 102.  |
| — 30. —     | 178    | 66 | 94.   |
| — 31. —     | 140    | 19 | 98.   |

Die Zahl der täglich Erkrankten, Genesenen und Gestorbenen vom 1. Nov. bis 6. Dec. 1830 s. im ersten Bande, S. 126 und 127. Die weitere Uebersicht entnehmen wir der Preuss. Staatszeitung (1830. Nr. 357. 358. 1831. Nr. 1. 4. 7. 10. 14. 17. 21. 24. 28. 31. 35. 36. 42. 43. 46. 52. 57. 59. 63. 66. 70.).

\*) Es wird dabei bemerkt, dass unter den 128 Erkrankten nicht alle an Cholera litten. Man begreift nicht, warum auch andere mit aufgeführt wurden.

\*\*) Von diesem Tage fehlen die Angaben über die Zahl der Erkrankten, Genesenen und Gestorbenen, so wie auch vom 12. Okt.



| Am 7. | Dec.    | erkrankten | 23, | genasen | 36, | starben | 9.  |
|-------|---------|------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| —     | 8.      | —          | 15, | —       | 14, | —       | 6.  |
| —     | 9.      | —          | 17, | —       | 46, | —       | 8.  |
| —     | 10.     | —          | 16, | —       | 26, | —       | 13. |
| —     | 11.     | —          | 10, | —       | 15, | —       | 13. |
| —     | 12.     | —          | 10, | —       | 27, | —       | 8.  |
| —     | 13.     | —          | 13, | —       | 17, | —       | 8.  |
| —     | 14.     | —          | 28, | —       | 37, | —       | 15. |
| —     | 15.     | —          | 12, | —       | 12, | —       | 10. |
| —     | 16.     | —          | 18, | —       | 30, | —       | 8.  |
| —     | 17.     | —          | 11, | —       | 17, | —       | 9.  |
| —     | 18.     | —          | 14, | —       | 19, | —       | 9.  |
| —     | 19.     | —          | 15, | —       | 21, | —       | 7.  |
| —     | 20.     | —          | 11, | —       | 6,  | —       | 10. |
| —     | 21.     | —          | 12, | —       | 7,  | —       | 9.  |
| —     | 22.     | —          | 6,  | —       | 18, | —       | 2.  |
| —     | 23.     | —          | 21, | —       | 9,  | —       | 13. |
| —     | 24.     | —          | 13, | —       | 6,  | —       | 9.  |
| —     | 25.     | —          | 10, | —       | 13, | —       | 8.  |
| —     | 26.     | —          | 13, | —       | 6,  | —       | 8.  |
| —     | 27.     | —          | 13, | —       | 0,  | —       | 8.  |
| —     | 28.     | —          | 12, | —       | 7,  | —       | 3.  |
| —     | 29.     | —          | 14, | —       | 2,  | —       | 10. |
| —     | 30.     | —          | 8,  | —       | 12, | —       | 3.  |
| —     | 31.     | —          | 11, | —       | †,  | —       | 16. |
| am    | 1. Jan. | —          | 8,  | —       | 7,  | —       | 4.  |
| —     | 2.      | —          | 18, | —       | 1,  | —       | 10. |
| —     | 3.      | —          | 30, | —       | 6,  | —       | 19. |
| —     | 4.      | —          | 20, | —       | 8,  | —       | 20. |
| —     | 5.      | —          | 9,  | —       | 5,  | —       | 7.  |
| —     | 6.      | —          | 15, | —       | †,  | —       | 8.  |
| —     | 7.      | —          | 13, | —       | †,  | —       | 12. |



|    |         |            |     |         |     |         |    |
|----|---------|------------|-----|---------|-----|---------|----|
| am | 8. Dec. | erkrankten | 14, | genasen | 5,  | starben | 6. |
| —  | 9.      | —          | 13, | —       | 7,  | —       | 6. |
| —  | 10.     | —          | 5,  | —       | 1,  | —       | 4. |
| —  | 11.     | —          | 5,  | —       | 24, | —       | 4. |
| —  | 12.     | —          | 10, | —       | 1,  | —       | 4. |
| —  | 13.     | —          | 6,  | —       | 2,  | —       | 5. |
| —  | 14.     | —          | 4,  | —       | 2,  | —       | 2. |
| —  | 15.     | —          | 1,  | —       | 1,  | —       | 3. |
| —  | 16.     | —          | 5,  | —       | 1,  | —       | 3. |
| —  | 17.     | —          | 4,  | —       | 1,  | —       | 3. |
| —  | 18.     | —          | 2,  | —       | 10, | —       | 1. |
| —  | 19.     | —          | 3,  | —       | 11, | —       | 0. |

Bis dahin erkrankten im Ganzen 8371 Personen, wovon 3723 wiedergenasen und 4543 gestorben waren. In Privathäusern wurden behandelt 1490 Brechruhrkranke, 814 männlichen, 676 weiblichen Geschlechts. Von diesen wurden hergestellt 493 Personen, 260 männlichen und 233 weiblichen Geschlechts; gestorben sind 988 Personen, 551 männlichen, 437 weiblichen Geschlechts. Am 20. Jan. Morgens waren in Privathäusern noch krank 9 Personen, 3 männlichen und 6 weiblichen Geschlechts. In den 23 temporären Krankenhäusern wurden bis zum 20. Januar behandelt 5004 Brechruhrkranke, wovon 2702 männlichen Geschlechts und 2302 weiblichen Geschlechts waren. Von jenen 5004 Erkrankten waren wiedergenesen 2285, 1256 männlichen und 1036 weiblichen Geschlechts, gestorben 2670, 1428 männlichen und 1242 weiblichen Geschlechts. 49 Kranke blieben noch übrig. Von den gedachten temporären Krankenhäusern waren bereits 18 geschlossen. Vom Militär erkrankten 970 Personen, 831 männlichen, 139 weiblichen.



chen Geschlechts; davon waren wiedergenesen 483, gestorben 462. In Kron- und Privathospitälern wurden behandelt 907 Brechruhrkranke, 474 männlichen und 433 weiblichen Geschlechts; davon waren genesen 462, 241 männlichen und 221 weiblichen Geschlechts, gestorben 423, 224 männlichen und 199 weiblichen Geschlechts. 22 Kranke waren noch übrig.

Am 20. Jan. erkrankten 4, genasen 5, starben 7.

|            |   |   |    |   |     |   |    |
|------------|---|---|----|---|-----|---|----|
| — 21.      | — | — | 0, | — | 14, | — | 1. |
| — 22.      | — | — | 2, | — | 6,  | — | 1. |
| — 23.      | — | — | 2, | — | †,  | — | 3. |
| — 24.      | — | — | 1, | — | 10, | — | 1. |
| — 25.      | — | — | 1, | — | 3,  | — | 1. |
| — 26.      | — | — | †, | — | †,  | — | †. |
| — 27.      | — | — | 1, | — | †,  | — | †. |
| — 28.      | — | — | 2, | — | †,  | — | †. |
| — 29.      | — | — | †, | — | 2,  | — | †. |
| — 30.      | — | — | 2, | — | 1,  | — | 3. |
| — 31.      | — | — | 3, | — | 8,  | — | 1. |
| — 1. Febr. | — | — | 3, | — | 1,  | — | †. |
| — 2.       | — | — | 1, | — | †,  | — | 4. |
| — 3.       | — | — | 2, | — | †,  | — | 3. |
| — 4.       | — | — | 4, | — | †,  | — | 1. |
| — 5.       | — | — | 5, | — | 2,  | — | 3. |
| — 6.       | — | — | 4, | — | †,  | — | 3. |
| — 7.       | — | — | 2, | — | †,  | — | 2. |
| — 8.       | — | — | 3, | — | †,  | — | 2. |
| — 9.       | — | — | 3, | — | †,  | — | 1. |
| — 10.      | — | — | 3, | — | 0,  | — | 0. |
| — 11.      | — | — | 2, | — | 0,  | — | 0. |
| — 12.      | — | — | 2, | — | †,  | — | 2. |
| — 13.      | — | — | 0, | — | 1,  | — | 0. |



| am | 14. Febr. | erkrankten | 1, | genasen | †, | starben | †. |
|----|-----------|------------|----|---------|----|---------|----|
| —  | 15.       | —          | 2, | —       | †, | —       | 2. |
| —  | 16.       | —          | 1, | —       | †, | —       | †. |
| —  | 17.       | —          | 1, | —       | †, | —       | 1. |
| —  | 18.       | —          | †, | —       | 1, | —       | †. |
| —  | 19.       | —          | 5, | —       | 1, | —       | 3. |
| —  | 20.       | —          | 4, | —       | 2, | —       | 1. |
| —  | 21.       | —          | 1, | —       | †, | —       | †. |
| —  | 22.       | —          | 1, | —       | †, | —       | 4. |
| —  | 23.       | —          | 2, | —       | †, | —       | †. |

Am 24. Morgens waren noch 18 Kranke übrig.

Die Krankheit ist somit nach beinahe fünfmonatlicher Dauer in Moskau noch nicht ganz erloschen und hat während dieser Zeit nahezu neunthaltausend Menschen befallen. Anfangs griff sie nur langsam um sich, so dass in den ersten sechs Tagen nicht mehr als vierzehn Personen befallen wurden, verbreitete sich aber schon gegen die Mitte Oktobers sehr rasch, so dass sie bereits gegen das Ende dieses Monats ihre höchste Höhe erreichte, während welcher des Tages mehr als 200 Personen erkrankten, am 26. Okt. sogar 244. Von diesem Tage an nahm die Seuche allmählich ab, so dass nach dem 15. Nov. nie an einem Tage mehr als hundert Personen erkrankten. Vom 24. desselben Monats an erkrankten an einem Tage nie mehr als 50. Vom 15. Dec. an erkrankten an einem Tage nie mehr als 30, seit dem 15. Jan. nie mehr als 5, so dass man einer baldigen Beendigung der Epidemie zuversichtlich entgegensehen kann.

Wie die Krankheit nach Moskau kam, ist nicht ausgemittelt; mehreren Berichten zufolge ist sie aus Makariew an der Wolga (bei Nischnei-Nowgo-



rod) eingebracht worden, von wo viele Kaufleute, welche die dortige grosse Messe besucht hatten, zurückkehrten. Noch ehe die Seuche in der alten Hauptstadt der Zaaren ausgebrochen war, herrschte Furcht und Schrecken unter den Einwohnern. Die Behörden und die Aerzte liessen es an Beruhigungsgründen nicht fehlen und behaupteten, die Krankheit könne der getroffenen Vorsichtsmaassregeln halber gar nicht nach Moskau dringen, überdiess dürfe man von der vorgerückten Jahreszeit und der Nähe des Winters erwarten, dass sie der Ausbreitung der Krankheit einen mächtigen Damm entgegensetzen. Allein der Trost wurde wenig zu Herzen genommen; und manches falsche Gerücht, dass Leute plötzlich auf der Strasse umgefallen und gestorben seien, dass bereits ganze Strassen erkrankt seien u. dergl., steigerte die Furcht schon vor dem wirklichen Ausbruche der Krankheit auf das Höchste.

Das erste Opfer der Seuche war ein Student; wesshalb sogleich die Universität und alle Lehranstalten geschlossen wurden. Dagegen blieben die Kirchen offen; es wurden Prozessionen gehalten und in allen Kirchen die Hülfe Gottes angefleht; in der evangelischen Kirche wurde alle Sonntage das heilige Abendmahl gereicht. Viele jedoch besuchten die Kirchen aus Furcht vor Ansteckung nicht. Auch die Theater wurden nicht geschlossen; allein es hatte Niemand Lust sie zu besuchen. Als von Sperrung der Stadt die Rede war, flüchtete sich, wer konnte. Fast der ganze Adel verliess die Stadt und begab sich theils auf seine Güter, theils ins Ausland, theils nach St. Petersburg. Die Twerische Strasse war unaufhörlich



mit schwerbepackten Wagen bedeckt. Während die Vornehmen und Reichen auf diese Art freiwillig die Stadt verliessen, thaten es Tausende von Fabrikarbeitern gezwungen. Das gemeine oder, wie es der Russe nennt, schwarze Volk zog in Truppen zu fünfzig und drüber aus den Mauern; und aus mannichfachen Gründen war man froh, dasselbe losgeworden zu sein. Auf die Unruhe dieses Auszuges folgte in der sonst so bewegten Stadt die tiefste Grabesstille. Nur die Droschken der Aerzte und Polizeioffiziere sah man auf den Strassen, wo früher das Gerassel der vier-spännigen Wagen vom Morgen bis in die späte Nacht kein Ende nahm. Die Ruhe der Nacht unterbrach nur das beängstigende Geräusch der Leichenwagen. Handel und Wandel stockte; wer vom täglichen Erwerb lebte, gerieth in Noth und Bedrängniss, bis endlich Sammlungen für die Armen veranstaltet wurden, wodurch man in kurzer Zeit eine halbe Million Rubel zusammenbrachte, ohne die Viktualien, Kleidungsstücke u. dergl. Die Kaufleute schlossen ihre Läden, weil Niemand Etwas kaufen wollte; das Obst, das vorher zum Genusse eingeladen hatte, verschwand von den Märkten und wurde zum Theil vernichtet, weil es für gefährlich gehalten wurde. Die besten Geschäfte wurden in Knoblauch gemacht, den man für ein ganz besonderes Präservativ gegen die Brechruhr hielt und der sehr schnell und hoch im Preise stieg. Die Zwiebel kosteten bis fünfzehn Ropcken das Stück, und auch dafür war kaum welcher zu haben. Da wurde den Gemüsekrämern diese Betrügerei auf eine nachdrückliche und handgreifliche Weise verwiesen, und seitdem war Knoblauch die Hülle und Fülle



in Moskau und so wohlfeil als früher. Fremde und Bekannte sahen sich selten und Manche schlossen sich ganz ein. In den Zimmern, die früher von den feinsten Wohlgerüchen erfüllt waren, verbreitete nun der Chlorkalk in Wasser aufgelöst und ehrlicher Theer seine heilsame Atmosphäre; die Stellen, welche früher die niedlichsten Krystallfläschchen mit Rosenöl und dergleichen schönen Sachen einnahmen, behaupteten jetzt Säckchen mit Chlorkalk und Knoblauch gefüllt oder Läppchen mit Theer getränkt. Statt Liqueurs trank man Theerwasser, statt Thee Sbiten (ein warmes Getränk aus Honig und Wasser); alle erhitzenden Getränke wurden verbannt, die Soupers förmlich abgeschafft, ja verboten; Mässigkeit und Reinlichkeit, von der Polizei besonders empfohlen, war an der Tagesordnung. Wer Vermögen besass, machte sein Testament. Nicht genug, dass das wirkliche Unglück die Gemüther mit Schrecken erfüllte, verbreiteten auch noch falsche Gerüchte, die in der Angst keiner besonnenen Prüfung unterworfen wurden, neue Besorgnisse. Bald hörte man von diesem, bald von jenem Bekannten, er sei schnell ein Opfer der Seuche geworden, und traf ihn vielleicht den Tag darauf gesund und wohl. Einmal hiess es, es seien Diebsbanden in der Stadt, die sich diese Schreckenszeit zu Nutze machen, ein ander Mal, man habe versucht, bei einigen Bäckern den Brodtaig zu vergiften, u. dergl. mehr. Mit bangen Sorgen erfüllte die Sage, die Polizei hole jeden Kranken aus seinem Hause, bringe ihn mit oder ohne seinen Willen in's Hospital, von dort führe man die Leichname hinaus und werfe sie in zu diesem Zweck gegrabene Gruben. Wirklich hatte man an-



fangs den Plan, alle Kranken in die Hospitäler zu bringen; nachher wurde es aber dahin abgeändert, dass nur diejenigen, welche nicht zu Hause geduldet und gepflegt wurden, wie Dienstleute, von der Polizei nach den Hospitälern gebracht wurden. Anfänglich wurden auch von der Polizei alle Verstorbenen beerdigt, und zuweilen mehrere in ein Grab gelegt; nachher aber wurde verfügt, dass jeder Leichnam in einen besondern Sarg und in ein eigenes Grab, aber nicht auf dem gewöhnlichen Begräbnissplatz, gelegt werde. Die grosse Furcht scheint Vielen Unheil gebracht zu haben. In einem Privatschreiben, das wir vor uns liegen haben, heisst es: »Furcht hat hier Manchen getödtet, indem er entweder an ihren Folgen starb, oder weil sie ihn der Ansteckung mehr preisgab. So nur zwei Beispiele. Ein Gensd'armerieobrist, ein Mann wie ein Goliath, mit tüchtigem Knebelbart, bildete sich so fest ein, die Cholera zu haben, dass er anscheinende Zufälle davon bekam, sich zu Bette legte und Jedermann warnte, ihm zu nahen, bis seine Freunde ihn aus dem Irrthume rissen, indem sie ihn umarmten, küssten, nicht angesteckt wurden und so ihm zeigten, dass er die Cholera nicht habe. Ein Anderer schloss sich ein, umstellte sich ringsum mit Chlorkalkauflösung und hielt auf seinem Tische die Lanzette bereit, um sich bei dem ersten Krankheits-symptome gleich zur Ader zu lassen. Als er dann wirklich einen Anfall zu spüren glaubte, öffnete er sich schnell die Ader und starb plötzlich, wahrscheinlich nicht an der Cholera, sondern an seinem Schrecken, der einen Schlagfluss herbeiführte.»

Aus der oben mitgetheilten Uebersicht ersieht



man, dass beinahe fünf Sechstel der Brechruhrkranken in Krankenhäusern verpflegt wurden. Es wird dadurch bestätigt, was mehrere Nachrichten meldeten, dass von den höheren Ständen verhältnissmässig nur wenige erkrankten. Auch starben nur wenige Aerzte, obgleich sie viele Leichen öffneten und das Blut, das Erbrochene und die Exkremente chemisch untersuchten. Die Kinder wurden grösstentheils von der Krankheit verschont; das weibliche Geschlecht weniger befallen, als das männliche. Säufer waren derselben am meisten ausgesetzt, und, wenn sie befallen wurden, in der Regel unrettbar verloren.

Ueber die Kontagiosität der Brechruhr wurde in Moskau zwischen Aerzten und Nichtärzten, Gelehrten und Ungelehrten viel gestritten; jeder führte Beweise für seine Behauptung an. Leute, die sich ganz und gar einschlossen, mit Niemand zusammenkamen und alle mögliche Präservative brauchten, sollen doch von der Krankheit befallen worden sein, dagegen Viele, die immer um Kranke waren, als Aerzte, Chirurgen, Krankenwärter u. s. w. nicht befallen wurden. Nach Einigen soll die Krankheit durch die Ausgewanderten nirgends hingebracht worden sein, andern Nachrichten zufolge wurden mehrere Orte des Moskowischen Gouvènements, wohin Ausgewanderte gekommen waren, von der Seuche heimgesucht. Nach einem an die Pariser Akademie der Wissenschaften gerichteten Briefe von Marin Darbal \*) war die Zahl der Kranken in der Nähe der Hospitäler nicht bedeutender, als in andern Gegenden der Stadt. Es gibt Leute, die mit Cholera-

---

\*) Gazette littéraire. Paris. 1831. p. 184 u. ff.



kranken dasselbe Bett theilten, ohne befallen zu werden. Bei allen Kranken, wo man den Ursprung der Krankheit nachforschen konnte, kam man nach Darbal auf keine Ansteckung, wohl aber fast immer auf andere äussere Ursachen, als Erkältung, übermässigen Genuss geistiger Getränke; daher auch in Moskau die allgemeine Ansicht sei, dass die Krankheit nicht ansteckend sei, wiewohl die Moskauer Aerzte die Ansteckung nicht vollkommen läugnen. Nach Darbal wäre auch die Aufhebung des um die Stadt gezogenen Kordons eine Folge der gewonnenen Ueberzeugung, dass die Cholera nicht ansteckend sei. Diess ist aber unrichtig; die Sperrung der Stadt wurde in der Nacht vom  $5/17$ . auf den  $6/18$ . Dec. aufgehoben, um die Zufuhr von Lebensmitteln zu erleichtern und den Handel und die Industrie, die sehr bedeutend gelitten hatten, wieder zu beleben; wesshalb diese Anordnung von den Einwohnern mit der lebhaftesten Freude aufgenommen wurde. Die Zahl der täglich Erkrankenden hatte um diese Zeit schon bedeutend abgenommen; und dass nicht die Ueberzeugung von der Nichtansteckungsfähigkeit der Cholera die Ursache jener Verfügung war, geht daraus hervor, dass zugleich mit der Aufhebung des um die Stadt gezogenen Kordons eine Sperrung der einzelnen Häuser, in denen sich Brechruhrkranke befanden, angeordnet wurde. Viele der ausgewanderten Einwohner kehrten nun in die Stadt zurück; Manche befürchteten, die Seuche werde desshalb wieder heftiger um sich greifen, was aber nicht geschah, wie man aus der obigen Uebersicht der täglich Erkrankten ersieht.

Ueber die Witterungsverhältnisse während der



Moskauer Epidemie ist nur sehr wenig bekannt geworden. Bei Thauwetter soll die Krankheit immer etwas zugenommen haben.

Aus der oben mitgetheilten Uebersicht geht hervor, dass man mit der Behandlung keineswegs glücklich war, indem mehr als die Hälfte der Erkrankten starb; und doch stimmen mehrere Nachrichten darin überein, dass die Krankheit durchaus nicht so furchtbar sei, als man sie gewöhnlich halte, dass sie vielmehr leicht zu heilen sei, wenn man sie gleich von Anfang an behandle. Als das Hauptmittel erprobte sich die Wärme, die auf die verschiedenste Weise in Anwendung gebracht wurde. Bei Manchen leistete eine Mischung von gleichen Theilen Laudanum liq. Sydenh., Hoffmännischen Tropfen und Pfeffermünzöl, zu 30 Tropfen pro dosi, sehr gute Dienste. Für die Hauptsache hielt man es, so bald als möglich einen Schweiss zu bewirken zu suchen.

Schliesslich bemerken wir noch, dass der berühmte Staatsrath v. Loder seine bei der Epidemie in Moskau gemachten Erfahrungen und Beobachtungen bekannt machen wird, denen gewiss jeder Arzt mit Sehnsucht entgegenseht.

---



## II.

Von den Symptomen und dem Verlaufe der morgenländischen Brechrühr, nebst Andeutungen über ihr Verhältniss zur gewöhnlichen Brechrühr und über das Wesen der Krankheit.

---

Das erste Glied bei der Erforschung jeder Krankheit und die Grundlage aller weiteren Untersuchungen bildet immer die Erforschung ihrer Symptome und ihres Verlaufs; daher bei den meisten Krankheiten dieser Punkt am gründlichsten erörtert ist. So finden wir denn auch bei der morgenländischen Brechrühr darüber befriedigendere Aufschlüsse, als über die andern Gegenstände der Untersuchung; jedoch muss man gestehen, dass selbst hier noch nicht die Klarheit herrscht, die man bei der ausgedehnten Gelegenheit zu Beobachtungen, wie man sie bei dieser Krankheit hatte, erwarten sollte, und die genauere Forschungen



und eine kritische Sichtung, wozu übrigens eigene Anschauung unerlässlich ist, überflüssig machen könnte.

Die vielen Schilderungen der Krankheit, die von den verschiedenen Beobachtern geliefert worden sind, in ein einziges Bild zu verschmelzen, schien uns nicht passend; wir hielten es für besser, einige der bessern Schilderungen von Aerzten, welche die Krankheit selbst beobachteten, an einander zu reihen und denselben aus andern Beschreibungen, die wir nicht vollständig aufnehmen können, das beizufügen, was zur Vervollständigung oder Berichtigung dienen kann. Nicht selten hört man die Vermuthung, die Brechruhr werde im Laufe der Zeit und in den verschiedenen Klimaten wesentliche Veränderungen erlitten haben; was davon zu halten sei, wird aus der folgenden Zusammenstellung hervorgehen, indem wir absichtlich die Krankheitsbeschreibungen von Aerzten wählten, die zu verschiedener Zeit und an verschiedenen Orten die Krankheit beobachteten, nämlich die von James Jameson und Vos, die in Bengalen, der Geburtsstätte der Krankheit, in den ersten Jahren ihrer Herrschaft sie kennen lernten, dann die Schilderung der Krankheit, wie sie 1823 in Astrachan herrschte, von Dr. Seidlitz \*), und endlich die von Dr. Pupurew, der die Brechruhr im Winter 1829 auf 1830 im Orenburg-

---

\*) Seidlitz hat zwar die Krankheit nicht selbst beobachtet, jedoch geht aus seinem Aufsatze über die Brechruhr hervor, dass er sich an Ort und Stelle aufs Genaueste unterrichtete, indem er sowohl von Laien, die die Krankheit überstanden hatten, als von Aerzten Erkundigungen einzog; wir glaubten desshalb seiner Schilderung der Krankheit wohl eine Stelle einräumen zu dürfen.



schen Gouvernement beobachtete. Der letztern haben wir aus den Berichten mehrerer anderen Orenburger Aerzte einiges Ergänzende beigelegt, so wie den beiden ersten Krankheitsbeschreibungen das, was uns in den Schilderungen anderer Aerzte, welche die Krankheit in südlichen Ländern beobachteten, Erwähnung zu verdienen schien.

1. *Schilderung der Symptome und des Verlaufes der morgenländischen Brechruhr im amtlichen Berichte des Bengalischen Gesundheitsraths \*).*

Die Hauptzufälle der Krankheit sind Erbrechen und Durchfall einer wässrigen und weisslichen Flüssigkeit, welche entweder zusammen oder wechselsweise erfolgen.

Im Anfange \*\*) empfindet der Kranke eine Schwere und Drücken im Magen; der Leib ist aufgetrieben, es zeigt sich Stuhlzwang; bald darauf erscheinen Erbrechen und Durchfall, grosse Unruhe \*\*\*), zusammenziehender Schmerz in der Herzgrube, innere Hitze und Durst. Zu diesen Symptomen gesellen sich heftige Krämpfe, welche zuerst in den Händen und Zehen anfangen, nach und nach sich weiter verbreiten und zuletzt den ganzen Unterleib und den untern

---

\*) Hufeland's und Osann's Journal der praktischen Heilkunde. 1824. September. S. 14 u. f.

\*\*) Nach den übereinstimmenden Angaben der meisten Beobachter fängt die Krankheit in der Regel früh Morgens oder in der Nacht an.

\*\*\*) Nach William Scot zeigte sich die Unruhe häufiger bei europäischen als bei eingebornen Kranken; er bemerkt, dass vielleicht das Gemüth einigen Einfluss haben möge.



Theil der Brust einnehmen. Zu gleicher Zeit verändert sich der Schlag des Herzens und der Arterien; der Puls an den Schläfen und Händen wird plötzlich schwach, zitternd oder völlig unfühlbar, das Athemholen schwer, abgebrochen, mit verlängertem Einathmen \*). Das Gesicht und die ganze Oberfläche des Körpers wird blass und kalt, es tritt ein klebriger, kalter Schweiss hervor, die Haut ist bläulich, die Augen sind trübe und mit Blut unterlaufen \*\*); hippo-

---

\*) Conwell, der die Symptome der Brechruhr sehr genau analysirt, (s. Magazin der ausländ. Litterat. der ges. Heilkunde. Bd. XV. S. 430 u. f.) bemerkt in Beziehung auf die Respiration: Im Anfange der Krankheit ist das Athmen beschleunigt und verstärkt; wenn jedoch die Krankheit weiter vorwärts schreitet, wird es langsam; diese Langsamkeit nimmt zu, und das Athemholen scheint unvollkommen zu werden, da nur ein Drittel der gewöhnlichen Menge von Luft dem Anscheine nach jedes Mal eingeathmet wird. Dr. Davy, der die Krankheit in Ceylon beobachtete, behauptet, dass die ausgeathmete Luft nur ein Drittel der bei Gesunden gewöhnlichen Menge von Kohlensäure enthalte. (Wir dürfen hierbei nicht übersehen, dass in den heissen Erdstrichen überhaupt, auch bei Gesunden, weniger Kohlenstoff aus dem Blute durch das Ausathmen ausgeschieden wird, was Annesley in seinem geschätzten Werke: *Researches into the causes, nature and treatment of the more prevalent diseases of India and of warm climates generally. London. 1828.* nachgewiesen hat.) Nach ungefähr 6 oder 8 kurzen Einathmungen macht der Kranke eine Anstrengung, um seine Lungen vollkommen mit Luft anzufüllen; seine Anstrengungen sind oft ohne oder von geringem Erfolg. In dem Maasse, wie die Krankheit fortschreitet, wird das Athemholen unvollkommener, bis es ganz aufhört, so stufenweise, dass der eigentliche Augenblick des Todes oft unmerklich ist. — Nach Scot wurde in einem Falle das Athemholen so langsam, dass nur sieben Athemzüge in einer Minute stattfanden. Wenn die Respirationsmuskeln von Krämpfen befallen werden, so treten oft asthmatische Zufälle ein.

\*\*) Die Bindehaut scheint nach Conwell mit rothem Blute eingespritzt zu sein; in dem weiter vorgerückten Grade der



kratisches Antlitz, Trockenheit der Mundhöhle, weisse oder bläuliche Zunge, unverständliche Sprache; die Stimme wird schwach, heiser; Zittern der Hände mit plötzlicher Entkräftung; der Kranke kann sich nicht aufrecht erhalten und gleicht einem Betrunknen. Bei schwachen Subjekten und in der Höhe der Epidemie werden diese Zufälle in kurzer Zeit äusserst gefährlich; der Blutumlauf hört auf, die thierische Wärme kehrt nicht wieder; Zuckungen, Erbrechen und Durchfall erfolgen weit öfter, ein unlöschbarer Durst martert den Kranken, er empfindet eine innere brennende Hitze, eine Angst, und wirft sich von einer Seite zur andern. Nach einer völligen Entkräftung folgt endlich kalter Schweiss, und das Leben erlischt, entweder unmerklich oder endlich unter den quaalvollsten Zuckungen. Nicht selten sterben die Kranken im Verlauf einer Stunde, am häufigsten aber in 4, 6 oder 12 Stunden; zuweilen erscheint der Tod später, dann verfallen sie in eine Entkräftung, bleiben lange ohne alle Bewegung und werden von einem unmässigen Durste gemartert \*).

---

Krankheit sind die Augenlieder halb geschlossen, die Augensterne erweitert, und nur die grossen Gefässe der Bindehaut deutlich angeschwollen. Das Auge nimmt eine eigenthümliche blaue Farbe an, wie man sie bei Wassersüchtigen bemerkt. Es erscheinen auf dessen Fläche Unebenheiten von einer gelben schmutzigen Farbe, die öfters so dunkel sind, dass man sie für auf die Fläche des Auges geworfenen Unrath halten könnte. Die Thränen sind so reichlich, dass sie über das Gesicht herabfliessen, ebenso nimmt auch die Absonderung der Nasenschleimhaut zu.

\*) Merkwürdig ist es, wie manche Kranken noch eine geraume Zeit fortleben, nachdem bereits ein Stillstand des Kreislaufs eingetreten ist. Dr. Kellet erzählt einen Fall, wo der Puls in der dritten Stunde nach dem Anfalle der Krank-



Indessen hat man einen grossen Unterschied im Verlaufe und der Reihenfolge der genannten Zufälle bemerkt; das Erbrechen ist z. B. die erste und gewöhnlichste Erscheinung, dann folgt Durchfall, endlich Krämpfe und Zuckungen. Oft verändert sich diese Ordnung dergestalt, dass Durchfall und Zuckungen dem Erbrechen vorangehen; zuweilen sind Zuckungen das erste Symptom, bisweilen fehlen dieselben oder das Erbrechen oder auch der Durchfall ganz \*); auch finden sich manchmal alle diese Zufälle zu gleicher Zeit ein. In einigen seltenen Fällen hemmt sich der Blutumlauf plötzlich, der Kranke fällt nieder und stirbt wie vom Blitze getroffen \*\*). Andere hin-

---

heit verschwand und der Mann noch 3 Tage in diesem Zustande lebte. Mehrere englische Aerzte wollten daher auch die morgenländische Brechruhr mit dem Namen Cholera asphyxia belegt wissen.

\*) William Scot bemerkt, dass man in solchen Fällen, wo weder Erbrechen, noch Durchfall sich gezeigt hatten, nach dem Tode die Gedärme mit Flüssigkeit angefüllt gefunden habe.

\*\*) Im schlimmsten Zustande der Brechruhr, sagt Conwell, fehlen die Krämpfe ganz, und der Nerveneinfluss scheint plötzlich aufgehoben zu sein, so dass die Befallenen in 20 Minuten, einer halben Stunde oder höchstens 2 Stunden schlafsuchtig werden und sterben. Diese Gestalt ist die gefährlichste, welche die Brechruhr annehmen kann; alle gewöhnlichen Zeichen fehlen, ausgenommen der Mangel der Nervenkraft, die kalte Haut und das Aufhören der Gefäßthätigkeit. Der Kranke klagt über Nichts und fordert Nichts als Getränk und Ruhe. Weder Erbrechen, noch Stuhlausscheidung, noch Krampf, keine Unruhe, kein brennender Durst sind zugegen; die geistigen Kräfte trüben sich schnell; die Schlafsucht und der Tod folgen rasch auf einander. Dieser Zustand nähert sich übrigens in allen möglichen Abschattungen den häufigern und gewöhnlichern Formen der Krankheit. — Solche Fälle, wo die Krankheit einen so schnell tödtlichen Verlauf nahm, dass sich die gewöhnlichen Symptome gar nicht entwickeln konnten, wurden an vielen Or-



gegen nahen sich ihrem Ende unter der quaalvollsten Angst nach fruchtlosem Drange zum Erbrechen.

Das Erbrochene pflegt gewöhnlich wässrig, weisslich, durchsichtig, aschgrau, selten grün und dunkel (dem Theeaufguss ähnlich), geruchlos oder klebrig und sauerriechend zu sein. In einigen seltenen Fällen wurde reine Galle erbrochen; grösstentheils bleibt das Genossene im Magen und wird nach dem Tode in demselben gefunden \*). Ausser dem Erbrechen ist

---

ten, wo die Brechruhr grassirte, beobachtet. Es mögen allerdings manche andere schnelle Todesfälle (durch Schlagfluss, Sonnenstich u. dergl.) auf Rechnung der Cholera geschrieben worden sein, ohne ihr wirklich anzugehören; allein der Umstand, dass an manchen Orten während der Brechruhrepidemie Todesfälle der Art häufig vorkamen, berechtigt zu der Annahme dass das Krankheitsgift (sei es nun Miasma oder Contagium) wirklich im Stande ist, besonders bei schwächlichen Personen die Lebenskraft plötzlich zu lähmen; man hat ja auch bei andern (kontagiösen) Krankheiten, namentlich der Pest, dasselbe beobachtet. In Indien kamen solche Todesfälle am meisten bei Eingebornen vor, deren schwächere Konstitution überhaupt gegen das aufgenommene Krankheitsgift weniger zu reagiren vermochte, als die kräftigere der Europäer. An mehreren Orten in Indien sah man Eingeborne plötzlich niederstürzen und sich ausstrecken; sie klagten über Schwindel, Trübheit und Blindheit und starben in wenigen Minuten. Zu Bellary wurde ein Schneider befallen und starb im Augenblick, mit seiner Arbeit in der Hand und in der nämlichen Stellung, in der er vorher gesessen war. Nicht immer fehlt in solchen schnell verlaufenden Cholerafällen das Erbrechen. Als die Brechruhr in Mascate herrschte, wurde an Bord eines brittischen Schiffes ein Kaufmann, als er gerade mit einem Juden einen Handel abschliessen wollte, plötzlich von der Krankheit befallen, erbrach sich zweimal und gab seinen Geist auf.

\*) Man begreift nicht wohl, wie die Speisen und Getränke, welche der Kranke zu sich genommen hat, bei dem heftigen Erbrechen im Magen zurückbehalten werden sollen. Die meisten Beobachter sagen, das Erbrechen sei anfangs mit den Speisen vermischt, die der Kranke vor Beginn der



der Durst ein Hauptzufall, an welchem der Kranke am meisten leidet; denn er kann sich durchaus nicht enthalten, kaltes Wasser zu trinken, welches er sogleich mit Schleim vermischt wieder ausbricht. Der Stuhlgang ist ebenfalls wässerig, weisslich oder trübe, zuweilen aber röthlich, mit Blut vermengt, selten breiartig. Diese Ausleerungen sind so stark, dass sie die ganze Masse der im Körper enthaltenen Flüssigkeiten zu überwiegen scheinen. Im Anfang der Krankheit enthalten sie niemals Galle oder Exkremente \*).

Krämpfe entstehen am häufigsten in den Extremitäten und verbreiten sich allmählich bis zum Rumpf, zuweilen in beiden zugleich, zuweilen fangen sie eher im Leibe als in den Gliedmaassen an. Die Zuckungen sind selten allgemein, und scheinen nur in einzelnen Muskeln oder Muskelfasern mit Krämpfen, Zerrungen und Zusammenziehen zu entstehen. Sie verursachen in starken Subjekten heftige Quaaen; Greise und schwache Leute haben sie in einem leichtern Grade.

Die Kranken klagen immer über einen unerträglichen Schmerz um den Nabel, der keine Berührung zulässt; diese Stelle ist von der Herzgrube bis zu den Schaamknochen aufgetrieben und gespannt \*\*). Hitze

---

Krankheit zu sich genommen hat; und dass das während der Krankheit in den Magen Aufgenommene gewöhnlich schnell wieder ausgebrochen wird, geht aus allen Schilderungen derselben hervor.

\*) Auch diese Angabe ist im Widerspruch mit manchen andern Beobachtungen. Conwell sagt: Die ersten Ausleerungen bestehen aus dem Inhalte des Magens und Darmkanales, so dass, wenn der eine Speisen, der andere Koth enthält, diese Stoffe ausgeleert werden.

\*\*) Dagegen findet nach W. Scott bisweilen eine anhaltende Zusammenziehung der Unterleibsmuskeln statt, wodurch der



im Magen und in den Gedärmen pflegt immer stattzufinden und verbreitet sich oft längs dem Speisekanal bis zur Mundhöhle. Magenkrämpfe werden von den heftigsten Schmerzen begleitet, erstrecken sich auch auf das Zwerchfell, wobei Schlucksen mit starken Erschütterungen des ganzen Körpers und oft Kinnbackenkrampf entstehen.

Die Unregelmässigkeit des Pulsschlages ist gleichfalls ein beständiges Hauptsymptom in der Cholera; denn in dem Momente, da der Magen leidet, strömt das Blut von der Oberfläche des Körpers zum Herzen und den grossen Gefässen, was durch die Blässe und Kälte der äussern Theile des Körpers, die innere Hitze in der Herzgrube und die Leichenöffnungen hinlänglich erwiesen wird. Schweres Athmen, Husten \*) und Angst sind unmittelbare Begleiter dieser Krankheit, welche wahrscheinlich vom Zuflusse des Blutes zur Brusthöhle herrühren. Der Puls scheint (?), so lange er noch fühlbar ist, schwach und zitternd zu sein, bald darauf wird er unregelmässig und fieberhaft und macht in einer Minute 80 bis 100 — 140 und 150 Schläge. Die Störung der Regelmässigkeit des Pulses führt eine Störung der Thätigkeit der absondernden Gefässe mit sich; denn die Speichelabsonde-

---

Unterleib ganz nach dem Rückgrat eingezogen wird. Ebenso werden die Schmerzen im Unterleibe auch nicht immer durch Berührung erhöht; im Gegentheil werden sie nach Annesley durch Druck und Friktion erleichtert.

\*) Des Hustens erwähnt kein anderer Beobachter, es scheint hier ein Uebersetzungsfehler stattzufinden. Conwell sagt ausdrücklich: Husten oder Brustschmerz sind nie vorhanden.



runge wird gehemmt; der Mund ist trocken, und es erfolgt eine völlige Urinverhaltung \*).

Der Kopf leidet weniger, obgleich man zuweilen Schwindel, Röthe der Augen, Verdunkelung des Gesichts, Verengerung der Pupille, Ohrenklingen und dgl. Erscheinungen, welche ein Gehirnleiden andeuten, bemerkt hat. Aber diese Zufälle sind nicht allgemein, und der Kranke behält die Besinnung; nicht bloß bei den ersten Anfällen der Krankheit, sogar in den grössten Quaaen und in der Angst bleibt oft sein Geist ruhig bis zur letzten Periode \*\*).

---

\*) Nach dem Bericht des Bombay'schen Gesundheitsrathes war der Harn zu Anfang der Krankheit meistens klar und floss ungehindert, zuweilen sparsam mit solcher Schwierigkeit, dass es fast bis zur Harnstränge stieg, und oft in so geringer Menge, als ob die Nieren aufgehört hätten, ihr Absonderungsgeschäft zu verrichten. — Die Absonderung des Harns, sagt Scott, ist fast ganz unterdrückt, und auf das Einbringen des Katheters erfolgt gar kein Harnausfluss, oder es fliesst nur sehr weniger blasser aus. Einige dieser letzten Fälle waren ebenso gefährlich, als bei gänzlicher Unterdrückung der Harnabsonderung. Fand die Unterdrückung zu Anfang der Krankheit statt und die Absonderung kehrte wieder, so konnte man zuversichtlich Genesung erwarten. Es werden Fälle erzählt, in denen 50 Stunden lang kein Harn abgesondert wurde.

\*\*) Die geistigen Kräfte, sagt Conwell, sind leicht verdunkelt und alle Sinne geschwächt; der Zustand des Kranken nähert sich oder gleicht der durch Trunkenheit erzeugten Schwäche. Der Kopf wird schwer, schmerzhaft oder von Schwindel ergriffen. Der Schmerz und die Schwere werden von den verschiedenen Kranken an verschiedenen Stellen des Kopfes angegeben, aber sie klagen über keinen Theil mehr, als über den andern. Mit der Zunahme der Krankheit nimmt die Schwere des Kopfes zu, die Begriffe werden verwirrt, die Pupillen sind erweitert und unempfindlich gegen das Licht, die Augenlieder ganz oder zum Theil geschlossen. — Nach Scott scheinen die Geisteskräfte niemals, oder nur sehr selten in Unordnung zu sein. Schlummerschlaf, sagt derselbe, hat man oft für ein Kennzeichen



Bei grosser Schwäche oder Abzehrung des Körpers mit Kraftlosigkeit der Muskeln erfolgt der Tod ohne alle Reaktion des Organismus. In andern Fällen erscheint er unter den heftigsten Qualen, obgleich die Natur oft, aber fruchtlos die schwachen Kräfte zur Wiederherstellung der Gesundheit sammelt. Daher scheint es zuweilen, dass die thierische Wärme im ganzen Körper oder doch in einigen Theilen desselben zurückgekehrt ist, der Puls erhebt sich und wird sogar voll, Krämpfe und Erbrechen hören auf, die Uebelkeit vermindert sich, die Stuhlausleerungen werden dicker und schwärzer; aber alle diese Zwischenräume der Erleichterung dauern nicht lange. Bald darauf kehrt Angst, Irrereden, Erbrechen, Beklemmung der Brust und Gefühllosigkeit wieder, und der Ausgang der Krankheit wird sehr schlecht. Zuweilen stirbt der Kranke in Angst und Gefühllosigkeit, zuweilen ganz unerwartet dann, wenn das von Neuem belebte Athmen die grösste Hoffnung zur Genesung gab. In diesem Zustande bekam der Kranke oft Krämpfe am ganzen Körper, welche in einer Minute tödteten.

Diese Zufälle scheinen nicht zu jeder Zeit und in

---

der Brechrühr ausgegeben, aber mit Unrecht; zwar fühlt der Kranke grosse Schwierigkeit, jene Zurückgezogenheit in sich zu überwinden, welche ein so merkwürdiges Zeichen der Krankheit abgibt; bringt man ihn aber zum Sprechen, so sind seine Antworten deutlich und bestimmt. — Nach dem Berichte des Bombay'schen Gesundheitsrathes war der Geist immer getrübt und die freiwillige Bewegungsfähigkeit vermindert; der Kranke stolperte wie ein Betrunkener oder fiel wie ein hülfloses Kind zu Boden. Zuweilen, aber selten, fand Kopfschmerz über einem oder beiden Augen statt.



allen Fällen gleich zu sein. In den verschiedenen Perioden der Epidemie, nach der unendlichen Verschiedenheit der Subjekte sind die Leiden mehr oder minder heftig, von dem gewöhnlichen Erbrechen und Durchfall mit leichten oder gar keinen Krämpfen steigen sie bis zu allgemeinen Zuckungen und völliger Unterdrückung der Lebenskräfte.

Zeichen der Genesung sind ruhiger und tiefer Schlaf mit warmem, über den ganzen Körper verbreitetem Scheweisse. Geringe Schwäche und unregelmässige Thätigkeit des Darmkanals sind Folgen eines leichtern Grades der Krankheit. Freiwillige oder durch Abführungsmittel hervorgebrachte gallige oder kopiöse Ausleerungen beenden die Kur. In einem höheren Grade aber ist die Genesung langsam, und die Leiden sind heftiger. Die Kranken klagen eine lange Zeit über Durst, Schmerzen in der Magengegend, Schlaflosigkeit, bekommen einen einfachen oder blutigen Durchfall; zuweilen entsteht Wassersucht; selten schwaches Gesicht (Amblyopia), Taubheit oder Lähmung der Extremitäten. Je eher die Ausleerungen dick, schwarz und scharf werden, desto mehr Hoffnung zur Genesung; im widrigen Falle erscheinen Aufstossen und Blähungen, welche eine verdorbene Verdauung anzeigen. Sehr oft nimmt die Cholera in der Folge die Form eines remittirenden oder intermittirenden Fiebers an.

Die erste Periode der Krankheit endigt sich in 24 bis 48 Stunden, selten dauert sie 3 Tage. Nach Verlauf derselben bestehen die Zeichen des wiederkehrenden Lebens in Folgendem: die animalische Wärme und der Blutumlauf stellen sich wieder ein, Kräm-



pfe, Erbrechen und Durchfall vermindern sich, der Stuhlgang wird überhaupt zwischen dem dritten und sechsten Tage dunkel, zuletzt schwärzlich, harzig, gallig, mit Brennen, Schärfe und Tenesmus verbunden. Zuweilen wird Galle in grosser Menge ausgeleert. Man hat bemerkt, dass der Kranke selten gerettet wurde, wenn die Exkremente chokoladenfarbig mit auf der Oberfläche schwimmenden Flocken waren.

Das Fieber, welches sich in der zweiten Periode offenbart, muss eher für einen Kraftaufwand der Natur, den krankhaften Reizen entgegenzuwirken, als für eine unumgängliche Basis der Krankheit selbst betrachtet werden. Daher pflegt es von galligem Charakter und von einer brennenden Hitze der Haut, zuweilen von Irrereden, Gefühllosigkeit und anderen Gehirnleiden begleitet zu sein.

Wenn die Epidemie ihre grösste Höhe erreicht hat, befällt sie die Menschen in volkreichen Städten plötzlich und ohne alle offenbare Ursache. Da, wo sie in einem leichten Grade herrscht, gehen ihr Zufälle einer gestörten Verdauung, verlorener Appetit, Drang zum Erbrechen, Verstopfung oder Durchfall voraus. Bei einigen Subjekten ist eine allgemeine Schwäche der Vorbote \*).

---

\*) Auf die Vorboten der Krankheit legen die meisten Beobachter wenig Werth; dieselben scheinen häufig von den Kranken selbst nicht beachtet zu werden, öfters auch gar nicht statt zu finden; überdiess haben sie den meisten Beobachtern zufolge nichts Charakteristisches. Conwell sagt: Die Kranken fühlen anfangs eine Beschwerde im Magen oder in den Gedärmen mit Schlaflosigkeit, Brustbeklemmung, Unruhe, eine Art von Schwere und Betäubung des Kopfes, Gemüthsbewegung, mit leichten Schmerzen in den Muskeln oder mit Frösteln; diese Zeichen fol-



## 2. *Schilderung der Symptome und des Verlaufes der morgenländischen Brechruhr von Dr. J. R. Vos zu Chinsurah in Bengalen* \*).

Zuerst begann der Anfall gewöhnlich mit dem Gefühle einer Vollheit des Magens und Spannung des

---

gen nicht regelmässig auf einander; eines kann dem andern vorhergehen oder auf dasselbe folgen; zuweilen fühlt man mehrere zu gleicher Zeit. Diese Gefühle sind aber nicht nur sehr gering, sondern auch vorübergehend, und lassen den davon Befallenen eine oder zwei Minuten ohne irgend eine Unpässlichkeit. Sie werden gewöhnlich nicht geachtet und gehen öfters vorüber, ohne bemerkt worden zu sein, eben so eine geringe Erhöhung des Pulses, die man eben so wenig bemerkt, da sie nicht bedeutend genug ist, um Beschwerden zu erregen oder die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die Zeit dieser Vorboten dauert 20 Minuten bis zu  $\frac{3}{4}$  Stunden. — Nach dem Berichte des Bombay'schen Gesundheitsrathes waren zuweilen der Magen und die Gedärme einige Tage vor dem Anfalle in Unordnung, versahen in einem Augenblicke ihre Verrichtungen wieder übermässig und versetzten dadurch die Kranken schnell in die äusserste Gefahr. Gravier berichtet, in mehreren Fällen habe sich eine unbeschreibliche Unruhe als Vorläufer der Krankheit gezeigt. Er habe öfters die Kranken gefragt, warum sie nicht früher seine Hülfe nachgesucht hätten, und sie haben geantwortet: wir haben nicht daran gedacht, wir waren wie unsinnig. — James Annesley bestrebte sich, charakteristische Zeichen des Stadiums der Vorboten aufzufinden; wir werden auf seine, in dieser Beziehung gemachten Beobachtungen zurückkommen.

\*) Vom Ursprunge, dem Verlaufe, den Symptomen und der Heilung der Cholera morbus, wie sie sich seit dem Jahre 1817 in Bengalen gezeigt hat, von Dr. J. R. Vos zu Chinsurah in Bengalen; a. d. Holländ. übersetzt von Dr. C. H. Ebermeier — in Rust's Magazin für die gesammte Heilkunde. Bd. XXIV. S. 97 — 135. Das Original dieser Abhandlung wurde der in Batavia zur Ergreifung medicinisch-polizeilicher Maassregeln gegen die Cholera für das niederländische Indien ernannten Kommission zur Beurtheilung vorgelegt und von derselben der öffentlichen Bekanntmachung besonders würdig erklärt.



Unterleibes, verbunden mit Uebelkeiten und dem Drange zum Stuhlgange, worauf fast unmittelbar eine Entleerung dünner, wässeriger Feuchtigkeit ohne Geruch und Geschmack sowohl durch Stuhlgang als Erbrechen erfolgte, mit vermehrter Angst und Beklommenheit, so wie dem Gefühle, als liege ein festes Band um die Herzgegend und Mitte des Leibes, dabei ein heftiger Durst und grosse innerliche Hitze. Es dauerte nun selten lange, bis heftige Krämpfe ausbrachen, die in den Fingern und Zehen beginnend, sich von da über Arme, Waden, Bauch und die untere Gegend der Brust erstreckten.

Unter diesen Symptomen von allgemeiner Unterdrückung der Lebenskraft nahm der Schlag der Pulsadern auf entsprechende Weise ab. Der Puls ward sehr bald beinahe ganz unfühlbar, oder liess sich nur bei grosser Aufmerksamkeit entdecken. Die Respiration ward schwer und beschleunigt, abwechselnd mit stöhnenden und abgebrochenen Athemzügen. Da das Blut nun nicht mehr in die entfernten Gefässenden getrieben wurde, sondern sich in den grossen Kavitäten anhäufte, so begann die äussere Körperoberfläche in einen bleichen, kalten und unthätigen Zustand zu gerathen; die Haut bedeckte sich mit kalten Schweissen und war unangenehm anzufühlen, grosse einzelne Tropfen kalter Schweiss traten hervor, ihre Farbe war schmutzig blau, mit unreiner violetter Zumischung \*). Das Gesicht veränderte sich, verfiel, und

---

\*) Nach Conwell fängt die Haut an den Gliedmaassen an, kalt und feucht zu werden, und die Kälte verbreitet sich von da aus nach und nach über den Rumpf und den Kopf. Ein kalter Schweiss, der gleichfalls an den Gliedmaassen



die Miene ward todtenähnlich \*); das Auge, in seine Höhle eingesunken, war gläsern, und die Augenlie-

anfängt, fliesst in reichlicher Menge, so dass er kaum abgetrocknet, von Neuem hervorbricht und schnell grosse Tropfen bildet. Die Haut des ganzen Körpers wird welk, vorzüglich an den Fingerspitzen. Zuweilen hört der Schweiss vor dem Tode auf, aber die Haut bleibt immer feucht anzufühlen. Die dem Herzen gerade entsprechende äussere Fläche der Brust wird ebenfalls wie der übrige Körper vor dem Tode kalt. In den schlimmsten Krankheitsfällen wird die ganze Oberfläche des Körpers plötzlich feucht, und kalter Schweiss fliesst mehr oder minder reichlich bis zum Tode, aber er geht nicht allmählich von den Gliedmaassen zum Rumpf, wie bei dem gewöhnlichen Krankheitsverlaufe. — Zuweilen wird nach W. Scot die Haut vor dem Tode wieder warm, aber dann beschränkt sich die Wärme auf Kopf und Rumpf. Theilweise Wärme ist eine gefährliche Erscheinung. Die Empfindung bei der Berührung eines Kranken ist wie bei der eines Todten. Die Haut wird selbst gegen kochendes Wasser und Mineralsäuren unempfindlich. Trotz der Kälte der Haut klagt nach W. Scot der Kranke doch beständig über Hitze der Oberfläche. Die Wärme der Haut ist nicht bloß für das Gefühl des Berührenden vermindert, sondern die Wärmeabnahme gibt sich auch durch das Thermometer zu erkennen. Der Hülfswundarzt Finlayson brachte bei mehreren Brechruhrkranken den Thermometer in die Achselgrube und fand  $92\frac{1}{2}$  bis  $97^{\circ}$  F., während Dr. Davy, der in Ceylon, auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung und der Morizinsel viele Versuche an gesunden Eingebornen und Europäern anstellte, in der Achselgrube eine Wärme von 98 bis  $100^{\circ}$  F. fand.

\*) Nichts ist nach Dr. Adam der Brechruhr so eigenthümlich als der Ausdruck des Kranken, der sich in der Veränderung seines Gesichtes kund gibt. Diese jedem Beobachter in die Augen fallende Veränderung ist eine der frühesten Anzeigen des Anfalles. Adam hält es für unmöglich, dieses Brechruhrge-*si*cht (*facies choleric*a) zu verkennen. Das Aussehen ist etwas schwarzbläulich, vermischt mit einer bleiartigen Blässe, zuweilen mit noch stärkerer Bläue der Lippen und Nasenspitze. Um die Augen ein schwärzlicher oder blauer Ring, der Augapfel scheinbar in die Höhle eingesunken, Muskeln und Zellgewebe der Wangen geschwunden, und über den Knochen zusammengefallen, wodurch ein geister- oder todtenähnliches Aussehen entsteht, welches nur der Pinsel malen, von dem aber die Sprache keinen Begriff geben kann.



der umzogen sich mit schwarzbraunen Kreisen. Die Lippen waren bleifarbig, die Nägel blau, die Handfläche bleich, wie eingeschrumpft, der Mund trocken \*), die Zunge weiss belegt, unbeweglich oder zitternd \*\*); die Stimme ward schwach und heiser.

Der Leidende fühlte plötzlich den unersetzlichen Verlust seiner Kräfte, die Arme zitterten, er konnte ohne Hülfe weder gehen noch stehen, noch sich sonst bewegen und wurde gleich einem Kinde schwach und taumelnd wie ein Betrunkener.

War bei schwachen Konstitutionen der Anfang des Uebels gleich ein heftiger, so kam es sehr bald bis zum Aeussersten und nahm schnell einen tödtlichen Ausgang; weder Lebensenergie noch Umlauf des Bluts konnten auf irgend eine Weise wieder hergestellt werden, und wenn auch Erbrechen, Stuhlgang

\*) William Scot dagegen sagt: Obgleich der Durst gross ist, findet doch kein Mangel an Feuchtigkeit im Munde statt. Nach Conwell ist die Absonderung des Speichels vermindert; der Speichel ist weniger häufig und zäher als gewöhnlich. Nach dem Berichte des Bombay'schen Gesundheitsraths ist der Mund heiss und trocken.

\*\*) Die Beschaffenheit der Zunge wird von den verschiedenen Beobachtern verschieden angegeben. John Adam fand sie schmutzigweiss oder lehmfarbig. W. Scot feucht, weisslich und kalt, Gravier roth und trocken. Nach dem Berichte des Bombay'schen Gesundheitsrathes ist sie ausgedörzt und tief gefurcht, weiss, gelb, roth oder braun. Conwell sagt: Im Anfange der Krankheit hat die Zunge ihre gewöhnliche Farbe und bleibt, sie mag rein seyn oder nicht, wie sie war; das einzige besondere Zeichen ist eine braune Farbe an den Seiten und am vorderen Ende. In dem Maasse, wie die Krankheit zunimmt, wird die obere Fläche trocken und mit einer gelben, trüben oder braunen Farbe überzogen und plötzlich kalt. In einigen Fällen war sie sehr roth. Das Zahnfleisch ist bleich, aber mit dem Fortschreiten der Krankheit werden Zahnfleisch, Zähne und Lippen mit brauner Farbe überzogen.



und Krämpfe sich einigermaassen verminderten, so kehrten sie doch bald mit verdoppelter Heftigkeit zurück. Der Durst blieb unlöschbar, und wenn er auch für einen Augenblick durch Wasser befriedigt erschien, so ward doch die Flüssigkeit schnell wieder mit grosser Gewalt ausgebrochen; die brennende, innere Hitze, die Beängstigung und Oppression währten bei steter Schlaflosigkeit ununterbrochen fort. Zuletzt von unsäglichen Leiden abgemattet, und nicht mehr im Stande, einen einzigen erneuten Zufall auszuhalten, verfiel der Kranke in das letzte Stadium, ward eiskalt, bekam Zuckungen und starb. Diess geschah oft schon eine Stunde nach dem Anfange der ganzen Krankheit, meistens dauerten aber diese heftigen Zufälle 6 bis 12 Stunden \*).

---

\*) Ueber den tödtlichen Ausgang der Brechruhr bemerkt Dr. Adam: Die Schwäche, Mattigkeit und Unruhe des Kranken nahm zu, während die drohendsten Erscheinungen, Erbrechen, Abführen, Zuckungen durch Opiate oder andere Mittel gelindert oder gänzlich entfernt wurden. Der brennende Durst blieb bis zuletzt, und der arme Kranke rief mit schwacher, kaum unterscheidbarer Stimme, unaufhörlich nach Wasser zu seiner Erleichterung. In einigen Fällen wurde der Körper wärmer, während der Ausdruck der Gesichtszüge gleich ungünstig blieb, und obgleich der Kranke den Umstehenden erklärte, er fühle sich besser, waren diese doch zu augenfällig überzeugt, dass die Krankheit nicht im Geringsten abgenommen habe. Fast Alle behielten ihre Besinnung bis zuletzt, wenn sie gleich merklich weniger sinnenscharf, als bei gesundem Zustande waren, und Alle waren vollkommen gleichgültig über den Ausgang ihres Leidens und vergassen alle vielleicht zu Anfang der Krankheit hierüber gehegte Furcht. Auch nach Scot behält der Kranke bis zum letzten Augenblicke das Bewusstsein. Eben so schrieb ein Geistlicher aus Bombay: Mein Gemüth ist seit einigen Tagen durch die furchtbaren Verwüstungen der Brechruhr auf das Tiefste betrübt; aber Eines hat mich höchlich getröstet; ich habe die Kranken mit



So war im Allgemeinen der Verlauf, wenn der Tod schnell erfolgte. Zuweilen hielt jedoch dieser elende Zustand länger an, ehe er mit dem Tode endigte. Niemals waren sich die Leidenden der hohen Gefahr bewusst; sie verlangten, sich selbst überlassen zu bleiben, und da die Krämpfe um diese Zeit aufhörten, so lagen sie unbeweglich, ausser wenn sie Wasser zu trinken begehrten; es war dann wunderbarlich zu sehen, mit welcher Hastigkeit sie das Gefäss ergriffen und das Getränk verschluckten, zum Beweise, wie heftig das innerliche Feuer brannte.

Es herrschte aber eine merkliche Verschiedenheit in der Art und Weise der Krankheitssymptome, je nachdem das Krankheitsgift mehr oder minder schwache Konstitutionen ergriffen hatte \*). Erbrechen

---

sehr wenigen Ausnahmen bis zum letzten Augenblicke bei Besinnung gefunden, und dies hat mir Gelegenheit verschafft, die augenblicklichen Zwischenräume abwartend, Vielen dieser Unglücklichen die Verheissungen der Gnade durch das kostbare Blut Christi zuzuflüstern.

- \*) Nach dem Berichte des Bombay'schen Gesundheitsrathes hätten die Krankheitssymptome weniger Verschiedenheit und geringere Abweichungen unter einander dargeboten, als sich fast bei jeder andern Krankheit zeigen, welcher der Mensch sonst noch unterworfen ist, und Gesunde und Kränkliche, Starke und Schwache, Europäer und Eingeborne, Muselmänner und Hindus, Alt und Jung von beiden Geschlechtern, von jeder Gemüthsart und von jedem Stande sollen sich gleichmässig unter ihrem Einflusse befunden haben. Wer sich mit andern Nachrichten über die morgenländische Brechruhr bekannt gemacht hat, wird nicht geneigt sein, die Richtigkeit dieser Behauptung zu unterschreiben. Andererseits ist es aber auch gewiss übertrieben, wenn B. L. Sarrham meint, es sei unendlich schwierig, etwas Allgemeines über die Krankheit zu sagen, da sie sich in unendlich vielen Modificationen und Formen äussere, eine Bemerkung, die er in mehreren Theilen Ostindiens gemacht habe.



blieb zwar fast immer das früheste und häufigste, darauf folgte Durchfall und dann Krampf; zuweilen war diess jedoch umgekehrt, und das Brechen erschien später. Manchmal machten auch die Krämpfe den ersten Anfang, oder sie kamen zugleich. Ja in manchen Fällen war die Bösartigkeit des Krankheitsgiftes so gewaltig, dass es fast unmittelbar das Leben des Ergriffenen vernichtete, gleich als wäre der Kreislauf urplötzlich gehemmt und die Nervenkraft auf einmal entzogen; wie vom Blitze erschlagen, fielen die Leute plötzlich und unvermuthet todt nieder.

Die Reizbarkeit des Magens und das davon abhängige Erbrechen machte einen der quälendsten Begleiter der Krankheit aus, sie stand meistens mit Schwindel und einer Geneigtheit zu Ohnmachten, so wie dem Gefühle von Druck oder Spannung in der Herzgrube in Verbindung. Die ausgebrochene Flüssigkeit war wässerichter Natur, meist geschmacklos, klar oder von blasser, indifferenter Farbe; zuweilen auch sauer, grün, dunkel wie Theeaufguss, mit Schleim vermischt. In einigen, aber seltenen Fällen, wenn das Erbrechen mehrere Stunden anhielt, wurde blosse, unvermischte Galle ausgeleert, da im Allgemeinen die Cholera gerade durch Abwesenheit dieser thierischen Absonderungsflüssigkeit charakterisirt blieb. Die Meisten gaben im Beginne grösstentheils die zuletzt genossenen Speisen von sich, ehe sie die wässerige Feuchtigkeit entleerten, doch nicht immer, denn man fand oft nach dem Tode noch unverdaute Speisen im Magen vor, zum hinlänglichen Beweise, dass dieses Organ nicht fähig blieb, seine Funktion



mit Erfolg auszuüben \*). Der heftige, durchaus unlöschbare, niemals fehlende Durst trug viel bei, die

\*) Die ersten Ausleerungen beim Beginnen der Krankheit bestehen aus den vorher im Darmkanal befindlichen Stoffen. Durch das Erbrechen werden die vorher vom Kranken genossenen Speisen (wenigstens zum Theil) entfernt, so wie durch den Stuhlgang Koth. Wenn mehrere Beobachter behaupten, die ersten Ausleerungen bestehen gleich aus den bei der Cholera für charakteristisch gehaltenen Ausleerungsstoffen, so erklärt sich diess daraus, dass den Aerzten selten die Gelegenheit wurde, die Krankheit vom allerersten Anfang an zu beobachten. Die meisten Aerzte, welche ihre Erfahrungen über die morgenländische Brechruhr bekannt gemacht haben, legen auf die Beschaffenheit der durch das Erbrechen und Purgiren ausgeleerten Stoffe grossen Werth, und man glaubte vorzugsweise darauf ihre Unterscheidung von der gewöhnlichen Brechruhr gründen zu können. Darin stimmen fast alle überein, dass das Erbrochene und das durch den Stuhlgang Ausgeleerte im Allgemeinen von gleicher Beschaffenheit sei, und dass in der Regel keine Galle in den Ausleerungen zu finden sei; dagegen weichen sie in der Angabe der Beschaffenheit der ausgeleerten Stoffe von einander ab, ohne die Umstände, von denen diese Verschiedenheiten abhängen, nachzuweisen. Das Ausgeleerte wird verglichen mit Reisswasser, mit dünnem Haferschleim, mit Hühnersuppe, mit Fleischwasser, mit einer wässerigen, gleichsam durch Stärke steifgemachten Flüssigkeit, mit verdünntem Eiweiss, mit Schlammwasser, mit Theeaufguss, mit einem grünlichen Muss wie von halbverdauten Gemüsen; es ist bald klar, bald trüb, bald mit schleimigen Flocken vermischt, bald weisslich, bald schwärzlich, bald aschgrau, bald braun, bald gelblich, bald grün, bald ganz farblos, zuweilen mit kleinen Theilen einer schwarzen Materie vermischt; der Stuhlgang soll zuweilen roth und blutig sein. Fast alle Beobachter sagen, diese Stoffe seien geruch- und geschmacklos; andere sagen, sie seien öfters säuerlich; eines bittern Geschmacks aber erwähnt Keiner, was allerdings für die Abwesenheit der Galle in den Ausleerungen spricht. Auf eine sonderbare Art sich selbst widersprechend sagt Whyte: Der Kranke bricht eine weissliche Flüssigkeit, die jedesmal unvermischt mit Galle ist, von welcher sich jedoch in jedem Quart hinreichend deutliche Spuren vorfinden. Eine konstante Erscheinung ist die Abwesenheit der Galle in den ausgeleerten Stoffen durchaus nicht; die beiden hier mitgetheilten Krankheitschilderungen des Ben-



Reizbarkeit der Magenwände zu vermehren, da es beinahe unmöglich war, den Kranken von einem häufigen und schleunigen Trinken kalten Wassers abzuhalten, und dieses, kaum niedergeschluckt, mit einer

---

galischen Gesundheitsrathes und des Dr. Vos machen darauf aufmerksam, dass auch Fälle vorgekommen seien, wo reine Galle ausgebrochen wurde, ebenso manche andere Berichterstatter, die meisten mit der Bemerkung, dass solche Fälle weniger gefährlich gewesen seien, als diejenigen, wo sich keine Galle in den Ausleerungen zeigte. Orton spricht sogar von Fällen, wo eine übermässige Gallenexcretion statt fand. Dr. Gravier beobachtete in dem Erbrochenen öfters Würmer, in den Stuhlausleerungen dagegen nie. W. Scot aber sagt, es seien häufig nicht bloss durch das Erbrechen sondern auch durch die Stuhlgänge Spulwürmer entfernt worden. Die Menge der Ausleerungen ist meistens sehr beträchtlich, hier und da fehlen sie auch ganz. Nach Einigen hören sie längere Zeit vor dem tödtlichen Ausgang auf, oder lassen wenigstens bedeutend nach; nach Anderen hört nur das Erbrechen auf, dagegen sich die Stuhlausleerungen vermehren mit einem eigenen Gefühl von Zusammenfallen oder Leere im Leibe. Nach Conwell dauern die Darmausleerungen unwillkürlich und ohne Verringerung fort, zuweilen um Vieles stärker; selbst nach dem Tode rinnt die Flüssigkeit oft noch aus dem Mastdarme eine halbe bis dreiviertel Stunden lang fort, während welcher Zeit eine sehr grosse Menge abgeht; nur in seltenen Fällen hört nach ihm die Darmausleerung zugleich mit dem Erbrechen auf. Die Beschwerden, womit die Ausleerungen verknüpft sind, werden ebenfalls sehr verschieden angegeben; Einige sagen, gleich auf die ersten heftigen Entleerungen folge die grösste Niedergeschlagenheit der Kräfte, nach Anderen fühlt sich der Kranke anfangs in Folge der Ausleerungen wohler. Nach Einigen sind die Ausleerungen ohne viele Schmerzen und Stuhlzwang; nach Anderen sind jene bedeutend und dieser fast unerträglich. Conwell bemerkt, die Leibscherzen nehmen einen entschiedenen periodischen Charakter an und kommen in Zwischenräumen von einigen Minuten, indem sie den Kranken zum Stuhle nöthigen; die Ausleerung endige dann den Anfall von Schmerzen in den Gedärmen, und lasse den Kranken eine Zeitlang in Ruhe; nach und nach werden die Stühle reichlicher und häufiger; sobald sich der Kranke nur bewege, kommen die Leibscherzen wieder, und mit ihnen eine Ausleerung, und die Schmerzen im Leibe werden immer häufiger und stärker.



geringen Menge Schleim vermischt, gleich wieder ausgebrochen wurde. Dieses Erbrechen war einer der lästigsten Zufälle, hielt meistens lange an, nachdem bereits Durchfall und Krampf gewichen, und selbst in glücklich endenden Fällen quälte es ungemein und verzögerte die Genesung um mehrere Tage. Die durch den Stuhlgang entleerten Stoffe waren grösstentheils von derselben Beschaffenheit, als die ausgebrochenen, wässerig, weisslich, lehmig, mitunter roth und mit Blut vermischt, oder grau, dick-breiartig, und fast halb verdauten Gemüsen ähnlich.

Wer niemals einen von der Cholera Ergriffenen beobachtet hat, vermag sich nicht leicht von der ausserordentlichen Beschaffenheit dieser Ausleerungen einen Begriff zu machen. Es ist, als ob alle Elüssigkeiten des menschlichen Körpers zusammengenommen nicht hinreichten, solche Massen hervorzubringen; dass sie aber sichtbar die Masse des Bluts verminderten, bemerkte man an seiner Dicke \*), so wie an der Schwierigkeit, womit beim Aderlassen das Blut aus der Vene lief, auch an dem Aufhören aller übrigen Absonderungen. Die Stuhlentleerungen glichen oft einem anhaltenden Strome, als wenn er nach aufgezogener Schleuse fortwährend weiter flösse; mitunter geschah es durch die krampfhaften Bewegungen des Magens und des Darmkanals, dass es aussah, als werde

---

\*) Die Beschaffenheit des Blutes und der Zustand der Circulation sind, wie Scot bemerkt, in der Brechruhr besonders gleichförmig. Der Gesundheitsrath von Madras hatte über diese Punkte an etwa 30 Aerzte, welche die meiste Erfahrung hatten, Fragen gestellt; und es ergab sich aus einer Menge Beobachtungen, dass das Blut in der Cholera von dunkler Farbe und dicker Konsistenz sei, und dass die



aus einer Spritze gegossen. Niemals sah man aber im Anfange wirkliche Faeces oder gallige Stoffe fortgehen.

Der Krampf begann gewöhnlich in den Gliedern und kletterte langsam zum Stamme hinauf, mitunter hatte aber auch das Gegentheil statt, und er nahm in den Bauchmuskeln seinen Anfang. Selten sah man die Krämpfe in wahre Konvulsionen übergehen, jedoch schienen sie einzelne, besondere Muskeln zu ergreifen, und so ein Ziehen und Spannen der Finger oder Zehen hervorzubringen. Bejahrte und schwächliche Leute litten an diesen Symptomen weniger als junge. Bei Europäern und Hindus von starkem Körperbau waren die Krämpfe heftiger, die Gastrocnemii wurden äusserst hart und gespannt, gleich einem dicken Brette, und man hat selbst harte Knoten in den weichen Theilen der Muskularsubstanz gefunden; der durch solche Kontrakturen herbeigeführte Schmerz ward entsetz-

---

Veränderung der Farbe von der bisherigen Dauer der Symptome abhängen. Immer hält es schwer, Blut aus der Ader zu bekommen. Wenn es abgelassen ist, soll es meistens von Serum enblösst sein, nie eine Speckhaut haben, aber schnell gerinnen. In den meisten Berichten findet man bemerkt, dass, nachdem eine Quantität abgelassen worden, das Blut heller und weniger dick wurde, und dass zugleich die Circulation sich wieder belebte. Wenn dieses gleich eine günstige Erscheinung ist, so zeigte sie sich doch nicht nach allen erfolgreichen Aderlässen. Man hat beobachtet, dass das Blut in den Fällen, welche mit Symptomen der Aufreizung anfangen, dem Anscheine nach weniger verändert ist, als da, wo in einer frühen Periode der Krankheit ein Collapsus des Organismus beobachtet wird. Bei Leichenöffnungen hat man das Blut in dem linken Herzen eben so dunkel gefunden als im rechten. Auch aus der Arteria temporalis, wenn man diese öffnete, kam das Blut dunkel und dick.



lich \*). Beständig klagten die Kranken über Schmerzen im Bauche, der zugleich beim Betasten äusserst empfindlich und schmerzhaft, zuweilen geschwollen, oder ungleich hart, oder gegen den Rückgrat eingezogen war. Ebenso wüthete unaufhörlich ein innerer Brand im Magen und in den Gedärmen, der sich auf Speiseröhre, Schlund und Mundöffnung erstrecken konnte. Wurde der Magen selbst von Krampf befallen, so wurden die Schmerzen unerträglich; die Kranken war-

---

\*) Die obern Gliedmaassen werden nach Conwell weit weniger häufig vom Krampfe befallen, als die untern, und nie werden die Beuge- und Streckmuskeln zugleich befallen. Einreibungen und warme Bähungen vertreiben die Krämpfe von einem Theile der Muskeln zum andern; die Leiden des anfangs ergriffenen Theils haben kaum eine Minute lang aufgehört, so kündigt ein neues Geschrei den neuen Anfall und den neuen Schmerz an. Am meisten werden die Wadenmuskeln und die Muskeln des Vorderarmes vom Krampfe befallen. In den schlimmsten Fällen fehlen, vielen Beobachtungen zufolge, die Krämpfe gänzlich. Scot erwähnt eines interessanten Falles, wo die vorher gelähmten und völlig gefühllosen Glieder des Patienten während eines Brechruhranfalles von heftigen Krämpfen befallen und in hohem Grade empfindlich wurden. Merkwürdig sind auch zwei von Marshall berichtete Fälle, in denen nach anscheinend bereits erfolgtem Tode noch Zuckungen eintraten; einer der Patienten war bereits in die Todtenkammer gebracht. In beiden Fällen gerieth der Kopf in eine zitternde Bewegung, die Zehen dehnten sich langsam aus und zogen sich wieder zusammen, die untern Gliedmaassen bewegten sich rotatorisch um das Becken, indem sie sich auf die Fersen setzten; auch die Hände geriethen in Bewegung, indem Pronation und Supination abwechselten, die Finger wurden ausgedehnt und eben so fest wieder einwärts gezogen. In dem einen Falle dauerten die Kontraktionen 20 Minuten, in dem andern  $\frac{3}{4}$  Stunden. Während der Krankheit hatte keiner von beiden Kranken Krämpfe gehabt. Als sich die Zuckungen zeigten, wurden sogleich Einreibungen und andere belebende Mittel lange und sorgfältig angewendet, aber ohne Erfolg. (Zwei Fälle der Art kamen auch in Orenburg vor.)



fen sich gequält und ruhelos von einer Seite auf die andere. In andern Fällen schien hinwiederum gleich der erste Anfall die Nervenwirkung gänzlich zu lähmen, so dass der Darmkanal alles Gefühls beraubt war; die allerschärfsten und reizendsten Flüssigkeiten gingen durch, ohne ein Gefühl zu erwecken. Das Zwerchfell nahm sehr oft an den krampfhaften Bewegungen Theil und gab dadurch zu Schmerzen im Rücken und in den Lenden Veranlassung, so wie zu einem den ganzen Körper erschütternden und furchtbar ängstigenden Schlucksen \*). Krampfhaftes Zucken in den Muskeln des Nackens hat man nicht beobachtet, wohl aber in einzelnen, wenigen Fällen Mundklemme.

Gehemmter und unregelmässiger Kreislauf des Blutes war ein frühes und niemals fehlendes Symptom dieser Krankheit. Beinahe unmittelbar, nachdem der Magen zuerst ergriffen, verliess das Blut die kleinen Gefässe und zog sich zum Herzen und den grossen Stämmen zurück, wie es sich deutlich aus der Todtenfarbe und Eiskälte der Haut in der ganzen Oberfläche ergab, so wie aus der Hitze in der Herzgrube, dem Klopfen des Herzens und der grossen Schlagadern, und endlich aus den Leichenöffnungen. Das Leben der kleinen Adern hörte beinahe ganz auf, selbst das Herz stand seiner Funktion nur unvollkommen und mit grosser Mühe vor. Die heftige Respiration, die Angst, die Oppression, das öftere Seufzen und Stöhnen, welches alles mit einander abwechselte, wurden

---

\*) Nach William Scot ist das Schlucksen keineswegs ein gefahranzeigendes Symptom.



insgesammt durch die Anhäufung des Bluts in der Brust verursacht, gleichwie durch die vergebliche Anstrengung der Natur, dasselbe wieder in die Peripherie des Körpers zu vertheilen und die Gleichförmigkeit der Circulation herzustellen.

Das Herz und die Schlagadern hatten aber nicht jedesmal ursprünglichen Antheil an der Krankheit, zuweilen schienen sie nur wenig zu leiden; der Puls blieb lange noch regelmässig, nachdem schon der Zustand des Magens und die Krämpfe die Heftigkeit des Uebels bewiesen hatten. Im Allgemeinen war er jedoch sehr bald vermindert und nahm in Zeit von 17 Minuten bis zu 2, 3 und 4 Stunden auf solche Weise ab, dass man ihn nirgends mehr fühlen konnte und selbst der Herzschlag schwach und unmerklich wurde. So lange man den Puls noch fühlen konnte, war er schwach, regelmässig und nicht sehr beschleunigt, in der Regel von 80 bis 100 Schlägen, mitunter jedoch sehr kurz vor dem Tode bis 150, doch wurde er in diesem Falle sehr klein und unregelmässig, oft sehr schnell und dann wieder langsamer \*).

---

\*) In Beziehung auf die Verrichtungen des Herzens und der Pulsadern sagt Conwell: Zur Zeit des ersten Anfalles der Krankheit nimmt die Thätigkeit des Herzens und der Schlagadern in Rücksicht auf die Häufigkeit und Stärke der Schläge zu; aber es sind selten mehr als 100 Pulsschläge in der Minute; nach dem kurzen Zwischenraume von einer halben bis zu einer ganzen Stunde ist die Thätigkeit der Schlagadern merklich in allen kleinen Zweigen vermindert; die Kopfschlagadern behalten eine dem Herzen, welches kräftig bleibt, entsprechende Kraft; jedoch ist diese ganz verschieden von der im gesunden Zustande und selbst von der bei einer heftigen Entzündung. Ich würde diese Thätigkeit des Herzens einen beschwerlichen und mühsamen Kampf nennen; ich befürchte, nicht verstanden zu werden, aber ich



Das Leiden des Kopfes stand niemals mit der Hefigkeit der Krankheit im Verhältnisse, zuweilen

kann sie nicht deutlicher als durch diese Benennung bezeichnen, denn sie besitzt eine Kraft, welche die im gesunden Zustande übersteigt. Der Puls am Handgelenke ist in den ersten Graden der Krankheit sehr verschieden; er ist vorzugsweise ausgedehnt und bietet viele Veränderungen dar; er ist leicht zusammenzudrücken. Es gibt Fälle, wo eine Art Härte im Pulse ist, aber diese ist vorübergehend; denn wenn die Krankheit vorwärts schreitet, so wird der Puls weich, schwächer, unregelmässig und fadenförmig, von 50 und 60 auf 100 steigend und bald ist er an den Gliedmaassen nicht mehr fühlbar. Zuweilen liegt die Ursache seines Aufhörens in der Thätigkeit der Schlagadern, die stufenweise langsamer und schwächer wird, so dass nicht mehr als 30 Pulsschläge in einer Minute sind. Dies kommt vorzüglich bei derjenigen Art von Brechruhr vor, welche sich durch die Abwesenheit der gewöhnlichen Zeichen auszeichnet oder wo diese Veränderungen darbieten. Wenn der Puls unmerklich wird, so fliesst in den Adern der Gliedmaassen nicht das geringste Blut; die Schlagadern lassen es nur tropfenweise herausrinnen, die Drosselblutader blutet unvollkommen, jedoch mehr als irgend eine andere, und der Aderlass an den Schläfenschlagadern (obgleich häufig in den äussersten Fällen angewendet) wird wegen der Blutüberfüllung nutzlos. Wenn die Krankheit zunimmt, so ist das Blut des Venen- und Arteriensystems dick, zähe, und weit dunkler als das der Blutadern im gesunden Zustande und bleibt selbst nach dem Tode flüssig. Das während des Lebens gelassene Blut sieht eben so aus, ist ohne Kruste und gerinnt unvollkommen oder gar nicht. Setzt man es der Luft aus, so wird die dunkle Farbe des venösen Blutes nicht in die hellrothe des arteriellen verwandelt. — Dr. Adam, der den Verlauf der Krankheit in 3 Stadien einteilt, nimmt im ersten Stadium eine Aufregung an und sagt, der Puls sei während desselben schnell, klein und hart, ungefähr 120 Schläge in der Minute und die Haut sei dabei warm. Ob eine solche Aufregung des Gefässsystems nicht bloss ausnahmsweise vorkommt, bleibt zweifelhaft; aus Adam's eigenen Aeusserungen scheint hervorzugehen, dass er dieses Stadium nur selten beobachtet hat. — Wie sehr der Blutumlauf bei der Cholera nothleidet, ergibt sich aus einem Falle, wo der Wundarzt, weil aus den geöffneten Venen kein Blut floss, die Brachialarterie öffnete, aber auch aus ihr kein Blut zu erlangen war.



gab jedoch das frühe Erscheinen von Schwindel, Augenschmerzen, Röthung der Bindehaut und Taubheit Veranlassung, den Hauptsitz des Uebels im Gehirn zu suchen. Es waren aber diese Symptome nicht immer gegenwärtig, und der Verlauf gab die vollkommenste Ueberzeugung, dass jene Ansicht ungegründet sei, indem der Leidende bei den grausamsten Schmerzen und Qualen bei vollkommenem Bewusstsein blieb und ungetrührt Alles bemerkte, was um ihn herum vorging.

Ueberall, wo die Krankheit ihren ungestörten Verlauf nahm, hing die Heftigkeit der Zufälle sowohl von der Heftigkeit des Krankheitsgiftes als von der Empfindlichkeit des Organismus ab, und man muss nicht glauben, dass die beschriebenen Symptome überall und zu allen Zeiten gegenwärtig waren; vielmehr waren sie in den verschiedenen Perioden, während welcher die Seuche herrschte, und in besondern Konstitutionen des Körpers, bei demselben Grade der Heftigkeit, von höchst abweichender Beschaffenheit.

Im Ganzen wurden die Eingebornen äusserst heftig von der Seuche ergriffen, und die Lebenskräfte plötzlich in solchem Maasse darniedergeworfen, dass sie sich nicht zu restauriren vermochten, und diejenigen, welche sich auch wieder einigermaassen erholten, nichts desto weniger später ein Opfer der zurückbleibenden Schwäche wurden. In gutartigen Fällen fand der Anfall sowohl in den Lebenskräften selbst einen Widerstand als in geringerem Maasse durch Heilmittel. Wenn sich alsdann die ächten Zufälle früh genug verminderten, so fielen die Kranken in einen tiefen Schlaf, und der Ausbruch eines mässigen, sanften Schweisses zeigte an, dass der Organismus ei-



ner sichern Genesung entgegengehe. In solchen Fällen blieb eine geringe Schwäche und Reizbarkeit der Eingeweide die einzige schlimme Folge des Anfalls, und eine reichliche Entleerung von Galle und andern verdorbenen Stoffen, sei es durch die Natur oder durch ein Abführungsmittel veranlasst, vollendete die Heilung; in bedeutenden Fällen hingegen war die Reconvalescenz schwieriger und dauerte längere Zeit. Wenn auch die vornehmsten und schwersten Zufälle schon vermindert waren, so blieben die Kranken doch noch von anhaltendem Durste, von Schmerzen in der Oberbauchgegend und von einer gewissen Reizbarkeit des Magens gequält, so wie von Schlaflosigkeit und bösen Träumen. In langer Zeit erhielt Magen und Darmkanal die frühere Energie nicht wieder, wodurch dann ein lang anhaltender Bauchfluss zu entstehen pflegte. Die Schwäche blieb dabei so gross und unvermindert, sie erforderte viele Tage hindurch die sorgfältigste Aufmerksamkeit, um zu verhindern, dass der Kranke nicht daran verloren gehe; oft endete sie trotz derselben mit unheilbarer Wassersucht, Andere wieder verloren das Gehör oder das Gesicht. In einem Falle blieb Lähmung der Harnblase und der untern Extremitäten zurück, die auch sehr lange nach völliger Beseitigung aller übrigen Zufälle anhielt.

Man sah überhaupt alle diejenigen sich schneller erholen, bei denen eine Entleerung scharfer und schwarzer Stoffe stattgefunden hatte, so wie auf der andern Seite langsamer, wenn saures Erbrechen, Windsucht, Hartleibigkeit, und andere Zeichen verminderter Thätigkeit der Leber anwesend waren.



Trat das Uebel bei Europäern oder bei Eingebornen von starker Konstitution vollständig ein, so kamen folgende Erscheinungen an den Tag. Die erste Periode, welche man die kalte nennen konnte, dauerte von 24 bis zu 48 Stunden und hielt selten länger als drei volle Tage an. In den ersten 24 Stunden sah man die tödtliche Beängstigung, kalte Schweisse, schwachen Aderschlag, Erbrechen, Durchfall, den Krampf und den Durst beinahe ohne Unterbrechung anhalten; in der Folge zeigten sich die Kennzeichen der Genesung durch beginnende Erneuerung der Lebenskräfte und vergrösserte Hautwärme, bei abnehmendem Krampfe, Erbrechen und Stuhlgang.

Die Lebenswärme des Körpers kehrte langsam zur normalen zurück, der Puls hob sich an Kraft und Energie und wurde zugleich beschleunigt; die Zunge wurde mehr belegt, der Durst hielt an, jedoch weniger mit nachfolgendem Erbrechen; das durch den Stuhlgang Entleerte sah nicht mehr wie Haferschleim aus, sondern wurde zwischen dem dritten und vierten Tage erst braun und wässerig, dann dunkelgrau, schwarz und pechartig; in die Eingeweide ergoss sich während mehrerer Tage eine grosse Menge verdorbener Galle, bis dass endlich, je nachdem die Gesundheit zurückkehrte, die Absonderungen der Leber und des Darmkanals wieder langsam von Statte gingen. Die Stuhlentleerung selbst war in der Regel mit grossem Schmerze verbunden, unter Kneipen und Zwängen. Zuweilen wurde die Farbe der Stoffe hellgelb, und die Anhäufung von Galle so gross, dass sie stromweise sich auch aus dem Magen entleerte. Man bemerkte,



dass diejenigen, deren Stuhlgänge chocoladenfarbig waren, selten wieder aufkamen \*).

---

\*) So wichtig auch die Erforschung der Art, wie der Uebergang von der Krankheit in die Wiedergenesung zu Stande kömmt, unstreitig ist, so geht doch aus allen Berichten über die morgenländische Brechruhr hervor, dass man diesem Punkte keineswegs die erforderliche Aufmerksamkeit geschenkt hat. Aus den meisten Nachrichten von englischen Aerzten geht hervor, dass dieser Uebergang häufig durch ein (galliges) Fieber bewerkstelligt wurde, über dessen Symptome, Prognose und Behandlung sie sich indessen meistens sehr kurz fassen, wie dies auch in den beiden oben mitgetheilten Krankheitsschilderungen von Jameson und Vos der Fall ist. Der Bericht des Bombayschen Gesundheitsrathes sagt in dieser Hinsicht: „Wenn die Lebenskraft wiederzukehren anfieng, zeigten sich auch die verschiedenen Lebensthätigkeiten von Neuem. Blutumlauf und Wärme stellten sich wieder her, und die Zuckungen nebst dem Uebelbefinden nahmen beträchtlich ab. Nach und nach kam die ganze Wärme zurück, der Puls erhob sich zu seiner gewohnten Fülle und Stärke und wurde scharf bezeichnet, ja zuweilen sogar hart. Die Zunge furchte sich noch tiefer, und der Durst dauerte mit vermindertem Eckel fort. Die Stuhlgänge hörten auf, wie Wasser zu sein, wurden erst braun und wässerig, dann dunkel, schwarz und pechig, und die Gedärme sonderten mehrere Tage hinter einander ungeheure Mengen verdorbner Galle aus, bis die Absonderungen der Leber und der übrigen Eingeweide mit wiederkehrendem Wohlsein nach und nach ihr natürliches Ansehen bekamen. Das Fieber, welches ährend dieses zweiten Zeitraumes der Krankheit unabänderlich statt fand, muss mehr als Folge der Anstrengungen der Natur, sich von dem erlittenen heftigen Anfalle zu erholen, betrachtet werden, als wie ein wesentlicher und nothwendiger Bestandtheil der Krankheit selbst. Es hatte viel von der Natur der in diesen Breiten gewöhnlichen galligen Zufälle. Die Haut war heiss und trocken, die Zunge unrein, tief gefurcht, dürr, der Mund ausgedörret, der Magen leidend, die Absonderungen widernatürlich, und der Puls schnell und veränderlich, wobei noch zuweilen Betäubung, Irrereden und andere dem Hirn beizumessende Leiden stattfanden. War aber die Krankheit in diesem Zeitraume tödtlich, so wurde die Zunge, welche rahmsfarbig gewesen war, braun, und zuweilen ganz dunkel, hart und tiefer gefurcht, Zähne und Lippen mit Unreinigkeiten bedeckt, der Zustand der Haut



Der Anfall der Cholera war durchgängig ohne alle vorhergehende Zeichen, und nur selten bemerkte

---

wechselte, Frösteln mit Hitzeanfällen, der Puls ward schwach und zitternd, der Athem ängstlich, grosse Unruhe und dumpfes Winseln folgten, und der Kranke unterlag bald besinnungslos unter abmattendem, häufigem, schwarzem, pechigem Kothabgang." Dr. Adam bemerkt über dieses Stadium der Krankheit: „Dieser Zeitraum der sich in die Länge ziehenden Krankheit gleicht vollkommen dem gewöhnlichen nachlassenden bengalischen Fieber. Es trat gewöhnlich 30 bis 50 Stunden oder zwei Tage nach dem ersten Anfalle ein, und die Umänderung der Darmausleerungen zeigte seinen Eintritt an, dort aber, wo grosser Torpor der Gedärme stattfand, vermehrte Hautwärme und ein natürlicher Puls. Es herrschte noch immer grosse Schwäche und fast in allen Fällen Verdrossenheit, die zuweilen der Unempfindlichkeit nahe kam. Irrreden zeigte sich (in den von Adam beobachteten Fällen) nur einmal, und zwar vorübergehend. Der Blick wurde natürlicher, die Oberfläche trockener und heisser, der wenn gleich noch schwache Puls voller, 96mal in der Minute. Zunge am Rande feucht, in der Mitte dunkel belegt und trocken. Es dauerte oft zwei bis drei Tage, ehe man durch Arzneien Stuhlgang bewirken konnte; in andern war er gleich vom ersten Anfang an reichlich, dunkelgrün, fast schwarz, flüssig, wie verdorbne Galle, und den Ausleerungen beim bengalischen Fieber gleichend. Erbrechen trat selten, und nur auf kurze Zeit ein, bestand aber aus eben solchen Stoffen wie der Stuhlgang. Wo zuletzt Genesung erfolgte, wurde der Puls natürlicher, und niemals so schwach und schnell, als in den schlimmen Fällen. Die Kräfte nahmen dann nicht ab, und nachdem die Verrichtungen allmählig zurückgekehrt waren, wurden die Kranken 10 bis 12 Tage nach ihrer Aufnahme in das Krankenhaus schon wieder entlassen. In den übel endigenden Fällen nahm die Häufigkeit und Schwäche des Pulses mit allgemeiner Kraftlosigkeit zu, aber die Kranken lebten oft zwei, vier, sechs, ja sieben Tage nach Anfang dieses Zeitraums. In diesem letzten Falle trat Schlucksen und kaffee farbiger Stuhlgang und Erbrechen zwei Tage vor dem Tode ein, und am Tage vorher wurde die Oeffnung auf einmal natürlich, und die andern Erscheinungen liessen günstiger. Die Unruhe war zuweilen sehr gross, und der Kranke lag vollkommen gleichgültig gegen alle ihn umgebenden Gegenstände da, oder er warf sich mühevoll, wenn gleich minder heftig, als wie die Krämpfe noch so stark



man einzelne Vorläufer, je nachdem das Ansteckungs-  
gift und der Zustand des Ergriffenen beschaffen wa-

---

waren, von einer Seite zur andern." — Ob der Eintritt dieses Fiebers in Ostindien im Allgemeinen für einen günstigen oder ungünstigen Ausgang der Brechruhr gehalten wurde, darüber sagen die angeführten Berichterstatter Nichts, so wie sie sich auch nicht darauf einlassen, wie die Krankheit sich gestaltet habe, wenn dasselbe sich gar nicht einstellte, so dass man fast glauben sollte, sie halten es für den jedesmaligen Ausgang der Brechruhr, wenn nicht der Tod schon vorher den Verlauf abschneide. Dieser Annahme steht aber der Umstand entgegen, dass andere Beobachter dieses sekundären Fiebers mit keinem Wort erwähnen. Conwell, der die Symptome der Krankheit übrigens sehr genau schildert, spricht nicht davon, Scott auch nicht; dieser sagt, wenn bei der Cholera Besserung eintrete, so sei diese meist sehr rasch; sie gebe sich zu erkennen durch den sich hebenden Puls, Rückkehr der Wärme auf die Oberfläche, Schläfrigkeit, Wiederkehr von Kothabgang und Wiedereintritt der Absonderung von Galle, Harn und Speichel. Mit dieser Besserung entscheide sich die Krankheit; doch sei sie öfters nicht vollständig und dann zeigen sich verschiedene Folgen, besonders Leiden des Hirns, der Leber, der Gedärme und des Magens. Dr. Gravier schildert den Uebergang von der Krankheit in die Wiedergenesung als eben so rasch, wie gewöhnlich der Anfall der Krankheit ist; die Wärme kehre wieder, der Puls hebe sich, es werde wieder Harn gelassen, und auf einen ruhigen Schlaf, wobei die Haut feucht werde, erwache der Kranke mit einem unbeschreiblichen Wohlbehagen, worauf die Kräfte in kurzer Zeit wiederkehren. Ebenso erwähnen auch andere Aerzte bloß der Wiederkehr der natürlichen Ausleerungen, des Schlafes und Schweisses als der Mittelglieder zwischen der Krankheit und Wiedergenesung. Es muss befremden, dass in Ostindien jenes sekundäre Fieber hauptsächlich in den Präsidentschaften von Bombay und Bengalen beobachtet wurde, dagegen der Bericht des Madraser Gesundheitsrathes so wie mehrere Nachrichten von einzelnen Aerzten in dieser Präsidentschaft desselben nicht erwähnen. Dass das Klima hieran nicht Schuld war, sieht man daraus, dass dieses Fieber auch bei der Epidemie in Astrachan im Jahre 1823 beobachtet wurde, dessen klimatische Verhältnisse ebenso verschieden von denen der Bengalischen als der Madraser Präsidentschaft sind. Ueberdiess erwähnt James Ranken, der in der Bombay'schen Präsidentschaft seine



ren. In grössern Städten und in Lagern, wo die Krankheit am grässlichsten wüthete, befiel sie die Menschen urplötzlich, ohne irgend ein erkennbares vorhergehendes Zeichen, jedoch nicht in allen Gegenden auf dieselbe Weise, indem in einigen das Erbrechen vorherrschte, in andern der Krampf und der Durchfall, in noch andern aber die Zufälle überhaupt weit gelinder waren.

3. *Beschreibung der morgenländischen Brechruhr, wie sie sich im Jahre 1823 in Astrachan zeigte, von Dr. Seidlitz \*).*

Ohne lang dauernde Vorboten trat die Krankheit meist plötzlich auf mit Schmerzen, Poltern, Kneifen im Unterleibe, einem Gefühle von Mattigkeit, dass die Kniee zitterten und zusammensanken, mit Wüstheit, Eingenommenheit oder an einer bestimmten Stelle fixirtem Schmerze im Kopfe, wobei die Kranken anfangen zu taumeln, als ob sie betrunken wären. Nachdem sie meist mehrere Stunden vorher einen natür-

---

Erfahrungen über die Brechruhr sammelte, auch des fieberhaften Stadiums nicht. Ranken ist ein Gegner des Quecksilbergebrauchs, der in der Bombay'schen und Bengalischen Präsidentschaft gäng und gebe war, während man in der Madraser auf dasselbe kein besonderes Vertrauen setzte. Auch in Astrachan wurde das Quecksilber in hohen Gaben gereicht. Ich bin sehr geneigt, dieses sekundäre Gallenfieber als einen künstlichen, durch die enormen Gaben Quecksilber herbeigeführten Metaschematismus der Krankheit anzusehen, der nach den zu Astrachan gemachten Erfahrungen keineswegs erfreulich ist.

\*) Vermischte Abhandlungen aus dem Gebiete der Heilkunde von einer Gesellschaft praktischer Aerzte in St. Petersburg. 1825. Dritte Sammlung. S. 67 bis 73.



lichen Stuhlgang mit Ausleerung von Darmkoth gehabt, stellte sich ein wiederholter Drang zum Stuhle ein, der die verwunderten Patienten zuerst alle Viertelstunden, dann in noch kürzeren Zwischenräumen überfiel und Nichts als eine dünne, wässerige Flüssigkeit entleerte, aber die Kranken aufs äusserste und in kurzer Zeit so sehr abmattete, dass, wie Viele meinten, sie dadurch in Krämpfe verfielen. Hierzu gesellte sich früher oder später ein heftiges Erbrechen, durch welches, wenn es früh eintrat, zuerst das etwa Genossene aus dem Magen entfernt wurde. Bei Vielen war aber auch heftige Uebelkeit das zu Anfang hervorstechendste Zeichen; das Erbrechen einer klaren, selten bitteren Flüssigkeit trat dann vor dem Durchfalle ein und quälte als fruchtloses Würgen den Kranken noch mehr, als jener. Es war also nicht bestimmt, dass nur dieses oder jenes Symptom das erste sei. Eine unersättliche Begierde, das verzehrende Feuer im Magen durch vieles und kaltes Trinken zu löschen, hatte aber keinen andern Erfolg, als dass das fruchtlose Würgen in Erbrechen der genossenen Flüssigkeiten sich umwandelte. Der Kopf war wüst, aber das Bewusstsein bis auf einen gewissen Grad ungetrübt; der Athem zuweilen erschwert; die Schmerzen im Magen wurden peinigend, brennend, der Urin mitunter vermindert. Es schwand der Lebensturgor im ganzen Körper, und besonders im Gesichte, schon nach den ersten heftigen Ausleerungen, wodurch das eingefallene Gesicht mit der zusammengepressten Nase, den eingesunkenen Augen, den gegen die Zähne gezogenen Lippen ein eigenthümliches Ansehen erhielt. Die Wärme schwand aus den Gliedern, ohne dass der



Kranke es fühlte; das Gesicht, selbst Zunge und Athem wurden kalt und die Stirne mit einem kalten klebrigen Schweiss bedeckt. Früher oder später, ebenfalls an keine bestimmte Reihenfolge gebunden, ja oft schon mit den ersten Zufällen des Erbrechens zugleich traten die Krämpfe ein: die Zehen wurden bald gekrümmt, bald aus einander gespreizt, die Wadenmuskeln zuckten zusammen, die Beine wurden in die Höhe geworfen, und zuweilen war es nur ein oder der andere Muskel, der sich anspannte und anschwell, so dass die Kranken, von heftigen Schmerzen angetrieben, ihn zu drücken und zu kneten anfangen. Im Liegen war zuweilen dieses Muskelspiel heftiger als im Gehen, so dass die Kranken auf eine lästige Weise im Bette herumgeworfen und gezerzt wurden, dem sie trotz ihrer Mattigkeit durch Aufstehen vorzubeugen suchten \*). An den obern Extremitäten wurden darauf ebenso mannichfach einige Finger gestreckt, andere gekrümmt, die Arme gebogen u. s. w. Immer allgemeiner wurden diese Krämpfe, welche zuletzt auch die Muskeln des Bauches und Rückens, der Brust und des Halses durchzuckten und wie Blitze von einer Stelle zur andern zogen. Nicht immer aber waren es die untern Extremitäten, welche zuerst von Krämpfen befallen wurden, auch Hals und Bauch litten zuweilen früher. Das Athmen wurde unter diesen Krampfungfällen, wenn sie Brust und Bauch betroffen, bald unter-

---

\*) Hierauf machte schon Sydenham aufmerksam: *Universi corporis musculi spasmis tentabantur dirissimis, ita ut aeger e lecto subinde exsiliret, si forte extenso quaquaversum corpore eorum vim posset eludere.* Th. Sydenh. *Opera medica.* Venet. 1762. fol. S. 39.



brochen, bald keuchend, bald beschleunigt und schmerzhaft. Von eben diesen Ursachen mochte der Schmerz im Unterleibe, im Magen, im Schlunde, der oft fürchterlich brennend wurde, herrühren. Eine innere Angst und Unruhe zwang den Patienten, bald diese bald jene Lage zu versuchen. — Meist kamen die Kranken schon in solch einem Zustande dem Arzte zu Gesicht, und keiner erinnert sich, einen Fall der Brechrühr mit wahrer Sthenie gesehen zu haben: der Puls war schon gesunken, schmal, sehr beschleunigt, späterhin kaum mehr fühlbar und zuletzt weder am Handgelenk noch an der Schläfe zu entdecken; der Herzschlag, selbst das Pulsiren der Aorta im Unterleibe soll nach Einigen geschwunden sein; daher auch nie, oder nur in geringer Menge, das Blut aus den geöffneten Venen floss. Brechen, Durchfall und Krämpfe dauerten unaufhaltbar fort; das Gesicht sah leichenhaft aus; die Augen waren eingesunken, gläsern, die Conjunctiva blass, schmutzig, die Lippen blauroth, die Zunge weiss, ohne Beleg, kalt; der Athem kalt und die ganze Oberfläche des Körpers so kalt, dass selbst im warmen Bade die Haut leichenartig anzufühlen war. Dabei zeigte sie sich gegen die stärksten Reize, Reibungen mit der Tinktur von spanischen Fliegen, von türkischem Pfeffer unempfindlich; die Bauchdecken bis an die Wirbelsäule eingezogen. Zuweilen hörten Würgen und Durchfall zuletzt auf, aber die Krämpfe begleiteten das hinscheidende Leben bis zu seinem Ende, ja blieben selbst nach dem Tode für einige Zeit als Vibrationen oder Zuckungen in einzelnen Muskeln nach. War für eine kurze Zeit Geistesabwesenheit da gewesen, so kehrte auch Bewusstsein, aber mit



gänzlicher Unempfindlichkeit für die Leiden des Körpers, gegen das Ende des Lebens zurück. Bei Andern aber nahmen nach scheinbarer Besserung die Zufälle plötzlich zu; es entstanden heftiger brennender Schmerz in den Hypochondrien, besonders rechterseits, Respirationsbeschwerden, Zuckungen in Händen und Füßen, Delirien, der Puls sank, wurde sehr schwach, unterbrochen, die Augen starrten halbgeöffnet vor sich hin; der Kranke warf sich unruhig hin und her, ward kalt und starb schnell.

Die Dauer der Krankheit war verschieden; zuweilen befiel sie urplötzlich ganz Gesunde und tödtete sie binnen drei bis sechs Stunden, Andere wurden innerhalb neun bis zwölf Stunden ein Opfer der Seuche; sonst verzog sich auch der Tod bis zum vierten Tage und tödtete in Rückfällen oder Nachkrankheiten noch viel später. Konnte Natur oder Kunst die Krankheit überwinden, so erwachte zuerst die Thätigkeit des Herzens, wie des Blutsystems und wurde allmählich kräftiger; die Wärme kehrte dann wieder, die Haut wurde für die Reize empfänglich, der wiederkehrende Turgor verwischte die leichenhaften Züge des Gesichts, Krämpfe und Erbrechen nahmen ab oder hörten gänzlich auf, nur der Durchfall blieb nicht selten mit Ausleerung einer wässerigen Unreinigkeit zurück. Die Kranken beruhigten sich mehr oder weniger, klagten nur über geringen Schmerz in der Brust und den Hypochondrien, Lärm in den Ohren und Schmerz im Vorderhaupte. Allmählich ordneten sich die Thätigkeiten des Verdauungskanal, die Mattigkeit nahm ab, Appetit und gehörige Darmausleerung stellten sich ein.



Auch das nachfolgende Fieber, wovon die bengalischen Berichte sprechen und welches Dr. Adam das letzte Stadium der sich in die Länge ziehenden Krankheit nennt, ist hier beobachtet worden, da es sich bei sieben von einunddreissig von der Brechrühr genesenden Matrosen einstellte und vier derselben tödtete. Der Inspektor Uschein äussert sich in einem Berichte an die medicinische Expedition des Seeministeriums darüber also: »Einige Tage nach dem Cholera-Anfall, als Patient sich schon besser fühlte, alle Thätigkeiten ausser der natürlichen Oeffnung in Ordnung waren, er aber noch eine schwache Verdauung, Völle im Magen, Aufstossen, Schwere in den Hypochondrien, wässerige oder schwarzgallige, doch schmerzlose Darmausleerungen hatte, fing er plötzlich an, einen eigenthümlichen unangenehmen Geruch auszustoßen, wurde unruhig, fühlte Schmerzen im Vorderhaupte, Lärm in den Ohren, Schmerzen in dem Hypochondrium rechterseits, wobei der Puls schneller schlug, aber schwach und unterbrochen war, die Respiration schwer, schmerzhaft wurde. Später kam heftiger Durst hinzu, die Zunge wurde trocken, blieb aber rein; der Kranke verlor das Bewusstsein, phantasirte, bekam Sehnenhüpfen, wohl gar Krämpfe in Händen und Füßen (Einer sogar Trismus, so dass er Nichts in den Mund bringen konnte); die Augen waren halbgeöffnet, starr nach oben gekehrt; der Puls sank immer mehr; bei der geringsten Berührung der rechten Seite fuhr der sonst unempfindliche Kranke in die Höhe. Die Darmausleerungen waren entweder unterdrückt oder sehr häufig, aber in geringen Quantitäten, wässerig, dunkelroth. Endlich wurden Hände und Füße kalt,



auf Stirn und Gesicht brachen grosse Schweisstropfen aus; der ganz dünne Puls verschwand völlig unter dem Finger, und Patient stirbt am zweiten Tage dieses Fiebers, welches ganz und gar der Cholera entgegengesetzt zu sein scheint und den Namen Typhus verdient. Die Sektionen der auf eine eckelerregende furchtbare Weise stinkenden Leichname zeigten, dass die Substanz des Gehirns weich, die Kammern aber von wässeriger Flüssigkeit stark, mehr als bei Cholera-Verstorbenen, angefüllt, die Sinus und übrigen Blutbehälter aber nicht ausgedehnt waren. Im Herzen finden sich polypenartige Massen von geronnener Lymphe; die Substanz des Herzens selbst welk, schwach; die Lungen schlaff; die Leber entzündet, ungewöhnlich gross; ihre Substanz an der Oberfläche einen halben Zoll fast knorpelhart, im Innern mit einer speckigen, weissen Lymphe angefüllt; die Gallenblase durch eine grosse Menge dunkelgrüner Galle gar sehr ausgedehnt, ohne Steine, ohne Verhärtung. Die Milz dagegen, so sehr von schwarzem Blute angefüllt, weich und leicht zerreisslich sie nach der Cholera war, so klein, zusammengeschrumpft, hart, durchzogen von sehnigen, schnurähnlichen Fascikeln zeigte sie sich hier; der Magen und die Därme waren leer, unverändert. — Das eigenthümliche Vorzeichen, der Kranke werde, obgleich er selbst noch Nichts merkte, in diesen typhösen Zustand fallen, gab der specifische Geruch ab, welcher schnell das ganze Zimmer erfüllte, wo solch ein Patient lag, dagegen die Krankensäle der übrigen Brechruhrpatienten nie auch den geringsten unangenehmen Geruch hatten.»



4. *Schilderung der Symptome und des Verlaufs der morgenländischen Brechruhr, wie sie sich in Orenburg im Jahre 1829 äusserte, von Dr. Pupurew\*).*

Die Krankheit beginnt mit oder ohne Vorboten; im ersten Falle unterscheidet man drei Stadien.

Das erste Stadium (stadium podromorum) zeigt folgende Erscheinungen: Druck in der Brust, mühevoll Athmen, ein Gefühl, besonders unter den linken Rippen und unter dem Brustbeine, wie von etwas Fremdartigem, ein unbeständiges Klopfen mit Hitze, ein Schmerz in der ganzen Gegend unter dem Nabel, periodisches, gewöhnlicher aber ununterbrochenes Drehen im Kopfe, grössere Heftigkeit und Reizung des Pulses ohne Härte, fast unaufhörliches Brummen im Leibe mit dem Gefühle der Sättigung oder Ueberladung des Magens, unerachtet der Enthaltbarkeit in der Nahrung und der Anwendung verdaulicher Speisen, Mangel an Leibesöffnung\*\*), Verlust des Appetites, abwechselnd leicht herbeikommender Frost und Hitze, kalter Schweiss auf der Stirne und Schlaflosigkeit. Diese Zufälle beschreibe ich in der Art, wie ich sie selbst gefühlt, und andere erkrankte Personen sie erzählt haben\*\*\*). Bei der Anwendung lösender

---

\*) Lichtenstädt, die asiatische Cholera etc. S. 71 bis 75.

\*\*) In einem Gutachten der Orenburgischen Aerzte wird auch mehrtägiger Durchfall als Vorläufer der Krankheit angeführt.

\*\*\*) In dem Aufsatze des Dr. Rang über die Epidemie in Orenburg ist unter den Vorboten der Brechruhr noch aufgeführt Harthörigkeit mit Empfindung einer kühlen elektrischen Aura im Kopfe, zumal in den Schläfen. Ein Kranker fühlte am Abende vor dem Erkranken auf einmal, wäh-



und abführender Mittel erfolgen Ausleerungen von abnormer Art, und, wie ich bemerkt habe, bedeckt mit einem blauschwärzlichen, aber zuweilen mit einem klebrigen, eigelbartigen Schleime; jedoch werden die Kranken in dieser Epidemie dergleichen Zeichen selten gewahr.

Die zweite Periode ist die eigentliche Krankheit. Zu den obigen Erscheinungen, die unbestimmte Zeit (einige Stunden bis zu 3mal 24 Stunden und länger) fort dauern, gesellt sich, wenn der Kranke keine Hülfe bekommt, häufige Stuhlausleerung, welche in wässrigen Durchfall mit Schwächung der Kräfte übergeht. Früher oder später beginnt ein schreckliches wässriges Erbrechen mit Auswurf von Stücken Schleim (Galle habe ich selten bemerkt) \*). Das Gefühl der

---

rend er las, wie sich sein Kopfhaar sträubte, mit dem Gefühl eines anwehenden kühlen Lüftchens; ein anderer empfand etwas Aehnliches einige Stunden vor dem Erkranken. Dr. Granbaum glaubte Nachts, es sei eine Maus über ihn gelaufen, erschrack, bekam Sehnenhüpfen an mehreren Stellen des Körpers und erkrankte den folgenden Nachmittag an der Cholera.

\*) Rang bemerkt in seinem Aufsätze über die Orenburger Epidemie, man habe nur wenig oder gar keine Galle in den Ausleerungen bemerkt. Sie seien wässrig gewesen und haben im After ein Brennen wie von heissem Wasser erregt. Die Menge der durch den Stuhl abgegangenen Flüssigkeit sei unglaublich gross gewesen; Granbaum der die Krankheit selbst überstand, habe ihn versichert, dass von ihm drei bis viermal nach einander, jedesmal beiläufig zwei Pfund abgegangen sein möchten. Aus dem Berichte des Staatsarztes Smirnow sieht man, dass er wenigstens bei seinen beiden ersten Kranken, gleich im Anfang, sobald er sie in das Hospital bekam, galliges Erbrechen beobachtete. Ueber die Beschaffenheit der Ausleerungen bei seinen weitem Kranken sagt er Nichts, wie sich denn überhaupt die Orenburger Aerzte bei der Schilderung der Krankheit im Allgemeinen sehr kurz fassen.



Beengung der Brust geht in eine schreckliche Empfindung von Hitze und Zusammenpressung über, das Athmen durchaus erschwert, bald selten, bald häufig. Zur selbigen Zeit klagen die Kranken über vorübergehende Schmerzen und Hitze im Leibe, mit häufiger Nöthigung zu Erbrechen und Durchfall. Der Durst wird unauslöschlich, und die Kranken verlangen meistens kaltes Wasser. Das Weisse der Augen füllt sich mehr und mehr mit Blut, der Kopfschmerz wird stärker, und das Drehen im Kopfe geht in Ohnmacht über. Die Kräfte des Kranken fallen\*), das Aussehen des Gesichts verändert sich mehr oder minder, oft plötzlich, die Gliedmaassen des Körpers werden kalt, die Fingerspitzen und die Lippen werden blau, die Haut, besonders an Händen und Füßen, runzelt sich, der Puls, bis dahin weich und häufig, wird so klein, dass man ihn kaum fühlen kann, und ist zuweilen ganz unfehlbar. Die Zunge war bei Allen, die ich in Orenburg behandelt habe, ganz rein, zuweilen trocken, zuweilen feucht, aber bei dem grössten Theile der Kranken in dem Dorfe Sarmanaew bedeckt mit schleimig schwärzlichen unreinen Stoffen\*\*), bei Einigen trocken, mit Rissen. Hiezu kamen schreckliche Zu-

---

\*) Dies geschieht nicht immer erst in Folge der Ausleerungen; in einem Gutachten der Orenburgischen Aerzte wird bemerkt, in manchen Fällen beginne die Krankheit mit einem unerwarteten Sinken der Kräfte, wozu sich in der Folge Erbrechen und Durchfall, so wie auch Krämpfe in Händen und Füßen gesellen.

\*\*) Auch Woskobrnikow sagt, bei den Kranken in Orenburg habe er eine mit blassen Unreinigkeiten bedeckte Zunge, und dabei einen unangenehmen, zuweilen bittern Geschmack gefunden. In Sterlitamak dagegen sah Hofrath Reissner die Zunge der Kranken roth und trocken.



sammenziehungen und Krämpfe, besonders in den Gliedmaassen, oft so stark, dass man den Kranken nicht in einer Lage erhalten kann, so dass selbst Frauen hierbei die Schaamhaftigkeit vergassen \*). Bei der Verstärkung der Zufälle phantasirt der Kranke aus Unruhe und Angst unaufhörlich, gibt Klagetöne von sich und verliert jede Hoffnung auf Besserung. Das aus den Adern gelassene Blut ist schwarz und geronnen. Wenn in diesem Zeitraume nicht baldige Hülfe kommt, so verbreitet sich Marmorkälte über den ganzen Körper, der Athem wird von Stunde zu Stunde schwerer und verliert die natürliche Wärme; der Pulsschlag, die Schmerzen und die Krämpfe nehmen zu, das Gesicht fällt ein, die Nase wird spitz, die Augen fallen ein und sind halb geöffnet; der Kranke wird ruhiger und versichert, dass er sich wohl fühle; aber eben dieses ist ein Zeichen des nahen Todes. Bei Einigen entsteht mit der Steigerung obgenannter Zufälle eine heftige, selten mit Arzneien abzuwendende Harnverhaltung, die das Leben des Leidenden verkürzt. — Ich habe auch gesehen, dass diese Krankheit mit einem unerwarteten Sinken der Kräfte begann, mit ausserordentlichem Kopfschmerz und Schwindel, Druck auf der Brust, Anhalten des Athems und Krämpfen; dann folgte starkes wässriges Erbrechen und Durchfall; zuweilen fanden gar keine Krämpfe statt. — Dieser Zeitraum ist sehr

---

\*) Alle Orenburger Aerzte sprechen hauptsächlich von den Krämpfen in den vom Rumpfe entfernten Theilen der Gliedmaassen; allgemeine Krämpfe wurden gewöhnlich erst einige Zeit vor dem Tode beobachtet. Oefters fehlten sie ganz.



kurz und dauert selten über 3 bis 5 Stunden. Kommt keine Hülfe, so erfolgt der Tod in 8 bis 12 Stunden, selten nach 24 Stunden oder später \*). —

Die dritte Periode ist die der Genesung. So schnell die Krankheit eintritt, so schnell erfolgt auch die Genesung, zumal wenn die Hülfe zeitig gewesen ist. Ich weiss einige Fälle, wo die Blutentziehung genügte, um die Kranken binnen einigen Stunden ohne weitere Mittel gesund zu machen. Kam die Hülfe spät, so kehrte auch die Gesundheit langsam zurück. Ungemeine Schwäche und Widerwillen gegen das Essen dauerten noch lange; auch kehrten Durchfall und Erbrechen ohne sichtliche Ursache wieder. (Aehnliches beobachtete ich bei einigen Landbewohnern, welche ohne Heilmittel die Krankheit überstanden.) Bei Abnahme der Epidemie zeigte sich das Uebel bei Vielen nur mit Durchfall und Erbrechen mit allmählichem Sinken der Kräfte und unangenehmer Empfindung unter dem Brustbeine und dauerte gegen 8 Tage und länger. — Die Cholera kann wiederkehren, und dann sind die Zufälle stärker \*\*).

Die Wahrnehmbarkeit und die Hebung des Pulses nach der Blutentziehung, die Wiederkehr der Wärme in den Gliedmaassen und im ganzen Körper

---

\*) Man sieht hieraus, dass die Krankheit in Orenburg nie den raschen Verlauf nahm, den sie öfters in Ostindien zeigte. Auch die andern Orenburger Aerzte geben 8 Stunden als den kürzesten Verlauf an.

\*\*) Ueber Nachkrankheiten findet sich in den Berichten der Orenburger Aerzte Nichts angegeben; ebenso wenig ist von dem an andern Orten beobachteten sekundären galligen Fieber die Rede.



leichte und warme Ausdünstung haben immer einen glücklichen Ausgang der Krankheit und schnelle Genesung verkündet. Heftigkeit der Krämpfe und Uebermaass von Erbrechen und Durchfall haben nicht immer Uebles zur Folge gehabt, sondern hingen sichtbar von einem besondern körperlichen Befinden und starker Wirkung äusserer Ursachen ab. Wenn bei der Blutentziehung der Puls fiel, leerer und unmerkbarer wurde, und die Zufälle sich verschlimmerten, dann war ein baldiger Tod unvermeidlich, wie mich dünkt, wegen Bildung des innern Brandes.

---

Man ersieht aus den voranstehenden Schilderungen deutlich, dass die morgenländische Brechrühr auf ihrem Zuge durch weitentlegene Länder keine wesentlichen Veränderungen erlitten hat, wenn gleich nicht geleugnet werden kann, dass die Krankheit mancherlei Modifikationen einzugehen fähig zu sein scheint, die übrigens noch sehr einer genaueren Bestimmung bedürfen und der Beobachtung noch ein weites Feld eröffnen. Aus den vielen, so häufig abweichenden Beobachtungen stellt sich folgendes Bild der Krankheit heraus:

Der Verlauf der Krankheit lässt sich füglich in drei Stadien eintheilen, das der Vorboten, das der eigentlichen Krankheit und das der Wiedergenesung oder der Nachkrankheiten.

1. Stadium der Vorboten. Die meisten Beobachter haben diesem Zeitraume wenig Aufmerksamkeit geschenkt und geben entweder keine Vor-



boten an, oder nur solche Erscheinungen, die nichts Charakteristisches haben. Diese sind entweder Unterleibssymptome, wie Verstopfung, Durchfall u. dgl., oder Zeichen von Affektion des Nervensystems, wie sie auch bei andern Krankheiten, z. B. bei der Wurmkrankheit, konsensuell vom Unterleibe aus entstehen, wie Schwindel, Ohrensausen u. dgl.

James Annesley allein hat sich bestrebt, charakteristische Zeichen dieses Zeitraums, des Stadium invasionis, wie er es nennt, aufzufinden, was bei einer so rasch verlaufenden und die schleunigste Hülfe erheischenden Krankheit von der höchsten Wichtigkeit ist, und gibt Folgendes als das Resultat seiner Untersuchungen an:

In den Gesichtszügen des Erkrankenden spricht sich ein Zustand aus, der an Angst gränzt, ohne dass derselbe es gerade immer selbst bemerkt oder überhaupt sich unwohl fühlt. Der Kranke ist verstimmt und gibt auf genaues Befragen an, dass er ganz eigene Empfindungen habe, die er nicht deutlich beschreiben könne. Zuweilen zeigt sich ein klebriger Schweiss auf der Haut. Der Puls ist zwar ziemlich voll und hart, aber doch offenbar unterdrückt und mühsam. Diese Beschaffenheit des Pulses erregt zwar keine besondere Aufmerksamkeit, wenn man nicht durch die Krankheit schon alarmirt ist; aber wenn man auf ihr Erscheinen vorbereitet ist, so ist sie nicht zu verkennen. Der Kranke empfindet Ekel, der Stuhlgang ist weniger konsistent, als gewöhnlich. Der Kranke klagt übrigens nicht über wirklichen Schmerz, selbst nicht bei einem Drucke auf den Unterleib. Er fühlt sich erschöpft. Oefters fühlt er Kolikschmerzen, aber sie



vergehen, oder werden wenigstens gemindert durch Druck und durch die freiwilligen Ausleerungen. Urin wird meistens nur in geringer Quantität und selten gelassen. Der Unterleib ist aufgetrieben.

Der Wundarzt H. Colledge bestätigt diese Angaben Annesley's, und es wäre höchst erfreulich, wenn sich ihre Richtigkeit durch die Erfahrungen anderer Aerzte konstatiren würde, da man sich nach Annesley von der Beachtung der Vorboten keinen geringen Vortheil versprechen darf. »Ich bin fest überzeugt,« sagt er, »dass ein erfahrener und aufmerksamer Beobachter aus diesen Symptomen erkennen kann, wenn die Krankheit einen Menschen zu ergreifen droht, und dass er durch Anwendung zweckmässiger Mittel verhindern kann, dass die Krankheit nicht den Grad von Heftigkeit bekömmt, den sie ganz unfehlbar annehmen würde, wenn man sie nur wenige Stunden sich selbst überliesse, und welcher in einer Menge von Fällen den Tod herbeiführen würde, wenn man auch die passendsten und kräftigsten Mittel anwendete.«

Dauer dieses Stadiums?

2. Das Stadium der ausgebildeten Krankheit (das kalte Stadium mehrerer Aerzte). Die ausgezeichnetsten Symptome desselben sind:

a. ein Gefühl von Brennen zwischen der Herzgrube und dem Nabel und von Beängstigung in der Herzgrube. Dies ist eines der ersten Symptome und scheint ganz konstant zu sein.

b. Durchfall.

c. Erbrechen. Durch beiderlei Ausleerungen wird gewöhnlich eine wässerige Flüssigkeit ent-



leert, die anfangs mit den vorher im Magen und Darmkanal enthaltenen Stoffen vermischt ist und öfters in ungeheuren Quantitäten abgeht. Beide Symptome können fehlen in Fällen, die einen sehr schnellen tödtlichen Verlauf nehmen.

*d.* bedeutende Abnahme der Kräfte, die nicht blos Folge der Ausleerungen, sondern unabhängig davon ist, da sie auch öfters vor ihnen eintritt;

*e.* Zurücktreten des Blutes aus den äussern Theilen des Körpers und Kongestionen gegen die innern; daher

*f.* Kälte der oberflächlichen Theile des Körpers, welche an den Enden der Extremitäten beginnt und sich nach und nach über den ganzen Körper verbreitet; später kolliquative Schweisse;

*g.* ausgezeichnete Veränderung der Gesichtszüge (facies cholericus);

*h.* Verschwinden des Pulses an den äussern Theilen;

*i.* stürmische Bewegungen des Herzens;

*k.* Athembeschwerden;

*l.* ausgezeichnete Venosität des Blutes;

*m.* schwache, tonlose Stimme;

*n.* grosser Durst und heftiges Verlangen nach kalten Getränken;

*o.* Störung der natürlichen Absonderungen, besonders der Urinsekretion;

*p.* Krämpfe, sowohl klonische, als tonische, doch mehr erstere; vorzüglich Wadenkrämpfe;



die Krämpfe sind nicht konstant und fehlen sowohl in den leichtesten, als in den heftigsten Fällen.

Dauer des zweiten Stadiums im Durchschnitt vier und zwanzig Stunden bis drei Tage.

Für die Behandlung möchte es von Wichtigkeit sein, nach der geringern oder grössern Intensität der Symptome einen niederen und höhern Grad \*) dieses Stadiums zu unterscheiden, zwischen welchen sich übrigens keine genaue Gränze ziehen lässt.

3. Das Stadium der Wiedergenesung bedarf noch sehr einer genauern Erforschung; so weit aus den bisherigen Erfahrungen hervorgeht, tritt dieselbe ein:

a. indem der Kranke in einen wohlthätigen Schlaf verfällt, während dessen sich ein warmer Schweiss über die Hautoberfläche verbreitet; nach demselben zeigen sich die gewöhnlichen Se- und Exkretionen wieder. Ob die von vielen Beobachtern angegebene Ausscheidung von einer grossen Menge verdorbener Galle eine Folge der Krankheit oder der Behandlung ist, ist nicht ausgemacht. Die Wiedergenesung kommt öfters sehr schnell zu Stande.

b. Die Symptome der Krankheit werden nach und nach weniger intens, bis sie endlich gänzlich auf-

---

\*) Ueber den letztern Grad der Krankheit bemerkt Aretaeus sehr naiv: Wenn aber ein unmässiger (kalter) Schweiss hervorbricht, der Kranke Alles wieder erbricht, erkaltet und livid wird, der Puls fast erloschen, und der Kranke ganz entkräftet ist, so thut der Arzt am Besten, sich unter einem schicklichen Vorwand aus dem Staube zu machen (*ἀγαθὸν ἐν τοῖσι τούτοις εὐπρεπὲς εὐρέσθαι φεγγήν*). Aretaei Cappadocis Opera omnia; edit. curav. C. G. Kühn. Lipsiae, 1828. S. 271.



hören, und die normale Lebensthätigkeit wieder hergestellt wird.

c. Die Brechruhr geht durch Nachkrankheiten in die Gesundheit über.

Die Nachkrankheiten, die gleichfalls noch genauerer Forschungen bedürfen, sind folgende:

1. ein galliges Fieber von remittirendem oder intermittirendem Typus (Folge der Behandlung mit versüßtem Quecksilber?);

2. ein nervöses Fieber. Nach Lesson folgte auf der Insel Amboina zuweilen auf die Brechruhr »ein sehr böses Nervenfieber, welches selten in Genesung überging.« Solomow in seinen Bemerkungen über die Cholera zu Astrachan (Lichtenstädt, die asiatische Cholera etc. S. 180 bis 196) sagt, dass die Brechruhr in Fieber nervöser und fauliger Art übergehe,

3. Wassersucht (Bauchwassersucht?).

4. Unterleibsleiden, einfacher Durchfall, Ruhr, Entzündung der Leber, Darmentzündung.

5. Lähmungen; Amblyopie, Taubheit nach Solomow gewöhnlich mit Lähmung der Zunge verbunden, Lähmungen der Extremitäten.

Der Tod tritt in der Brechruhr ein:

1. ehe die charakteristischen Symptome der Krankheit sich gehörig entwickelt haben, durch schnell lähmenden Eindruck der Krankheitsursache;

2. gewöhnlich in der Höhe des zweiten Stadiums durch Erschöpfung;

3. im Stadium der Wiedergenesung und Nachkrankheiten



a. durch Rückfälle, zu welchen eine grosse Geneigtheit vorhanden ist,

b. durch Nachkrankheiten.

---

Die nächste Ursache oder das Wesen der Brechruhr zu erforschen, ist ebenso die wichtigste als die schwierigste Aufgabe der Wissenschaft. Bei dem Dunkel, in das diese Krankheit noch in mancher Beziehung gehüllt ist, und bei den Widersprüchen, die noch zu lösen sind, lässt sich wohl darüber noch Nichts mit Bestimmtheit aufstellen. Manche der in dieser Beziehung aufgestellten Meinungen stehen auf so schwachen Füßen, dass schon eine oberflächliche Untersuchung dieselben als ungenügend erweist. Unter denjenigen Ansichten, die uns bekannt geworden sind, möchte die von dem Staatsrathe v. Loder in Moskau aufgestellte Ansicht über das Wesen der Krankheit den bisherigen Beobachtungen und Erfahrungen am besten entsprechen, und aus ihr die Erscheinungen der Krankheit am genügendsten abzuleiten sein. Nach einem in mehreren öffentlichen Blättern mitgetheilten Briefe dieses rühmlich bekannten Arztes \*) nimmt er den Sitz der Krankheit im sympathischen Nerven an und verspricht, in einer eigenen Schrift über die Cholera, welche demnächst in Königsberg erscheinen soll, alle Zufälle dieser Ansicht gemäss zu erklären und dieselbe durch Leichenöffnungsberichte zu erweisen.

---

\*) Medicin. Conversationsblatt, herausgeg. von Hohnbaum und Jahn. 1831. Nro. 8.



Setzen wir das Wesen der Cholera in eine lähmungsartige Affektion des sympathischen Nervensystems, so lassen sich daraus die ausgezeichnetsten und charakteristischen Symptome der Krankheit ungezwungen erklären. Das Gangliensystem ist der Sitz des Gemeingefühls, das so auffallend in der Cholera leidet; der Collapsus, die Entkräftung ist ganz konstant, gewöhnlich eines der frühesten Symptome und steigert sich nicht selten auf den höchsten Grad; die Gefahr der Krankheit geht parallel mit dieser Erschöpfung der Kräfte. Sie tritt hier und da plötzlich in so hohem Grade ein, dass die übrigen Symptome der Krankheit sich gar nicht mehr gehörig entwickeln; solche Fälle sind eigentlich als eine Apoplexie des Gangliensystems zu betrachten. Das Gefässsystem erhält seine Nerven vorzugsweise vom sympathischen Nerven, und seine Thätigkeit ist daher von der des letzteren in hohem Grade abhängig; desshalb muss das Gefässsystem nothwendig in der Brechruhr auffallende Symptome darbieten. Die peripherischen Gefässe, als vom Centraltheile der Nerven am entferntesten gelegen, leiden vorzüglich; das Blut fliesst durch die Venen, welche dem Einflusse des Nervensystems weniger unterworfen sind, gegen die Centralorgane des Gefässsystems hin, während die Schlagadern nicht mehr gehörige Kraft haben, das Blut, welches das Herz ausstösst, gegen die äussern Theile fortzuleiten; daraus entsteht eine Anhäufung des Blutes im Herzen und in den grossen Gefässen; daher denn die Blutleerheit der äusseren Theile des Körpers, der Mangel alles Lebensturgors, die Kälte, die Missfärbung derselben, die Entstellung der Gesichtszüge, die



heftigen Bewegungen des Herzens, das Gefühl innerer Hitze und der quälende Durst. Die mit Blut überfüllten grösseren Gefässstämme entleeren dasselbe in die Gefässzweige der Unterleibsorgane, besonders der Gedärme, die nun auch mit Blut überladen werden, so dass die geschwächten Gefässwandungen bei dem beständigen neuen Blutandrang die wässerigen Theile des Blutes durchschwitzen lassen, daher die kolliquativen Ausleerungen durch Erbrechen und Stuhlgang, die eine so ausgezeichnete Erscheinung dieser mörderischen Krankheit sind und die Entkräftung der Kranken nothwendig steigern müssen, keineswegs aber dieselbe ursprünglich hervorrufen; denn es gibt Fälle, wo die Entkräftung schon vor dem Eintritt des Erbrechens und des Durchfalls sehr ausgezeichnet ist, und gerade in solchen Fällen, wo weder Erbrechen noch Durchfall eintritt, erreicht sie sehr schnell den höchsten Grad. Die Muskelhaut des ganzen Nahrungskanals kommt in eine krampfhafte Thätigkeit, so dass selbst, wenn keine Stoffe zum Ausleeren mehr vorhanden sind, ein leeres Würgen und vergeblicher Drang zur Oeffnung stattfindet, und öfters wird dieselbe so heftig, dass selbst Intussusceptionen der Gedärme sich entwickeln. Die Krämpfe in den äussern Theilen sind eine nothwendige Folge des Blutmangels in denselben; man kann sich bei jedem Thiere, das geschlachtet wird, davon überzeugen, dass durch Entziehung des Blutes die Muskeln in krampfhafte Kontraktionen verfallen. Die Krämpfe fangen in der Regel in den äussersten Theilen, in den Zehen und Fingern an, in denen auch die Blutarmuth zuerst eintritt. Die Krämpfe fehlen öfters bei schwächlichen



Personen, bei denen durch das Zurücktreten des Blutes in die innern Theile keine so beträchtliche Abweichung von der im gesunden Zustande stattfindenden Blutmenge in den äussern Theilen eintritt, wie bei kräftigern; ebenso fehlen sie in gelinden Fällen der Cholera, wo die äussern Theile des Körpers nicht so blutleer sind, wie es in der Regel der Fall ist. Die heftigeren Formen von Krämpfen (Konvulsionen, Trismus) entstehen durch konsensuelles Leiden des Gehirns und des Rückenmarks, welche beide mit dem Gangliensystem in mancherlei Verbindungen stehen. Von den Gehirnnerven steht das zehnte Nervenpaar, der Nervus vagus in der genauesten Verbindung mit dem Gangliensystem, wesshalb die unter seinem Einflusse stehenden Funktionen bei der Brechrühr auffallende Störungen erleiden. Der ausgezeichnete Einfluss des Nervus vagus auf die Respiration ist durch Versuche erwiesen; die Respiration ist in der Cholera bedeutend gestört, was allerdings einestheils schon die Folge des Zurückziehens des Blutes aus den äussern Theilen sein muss, anderntheils aber ohne Zweifel auch Folge eines konsensuellen Leidens des zehnten Nervenpaares ist. Die abnorme Beschaffenheit der Blutmasse entsteht theils durch die mangelhafte Respiration, theils durch die kopiösen Ausleerungen durch Erbrechen und Durchfall, wodurch das Blut eines grossen Theils seiner wässrigen Bestandtheile beraubt wird; daher auch das Blut eine ausgezeichnet venöse und dicke Beschaffenheit annimmt. Unter dem Einfluss des Nervus vagus steht auch die Stimme, welche in der Cholera schwach und tonlos ist. Da das sympathische Nervensystem überhaupt dem vegetativen



Leben vorsteht, so sind auch die Sekretionsorgane von dem Einfluss desselben abhängig; auch finden sich überall, wo Absonderungen von irgend einiger Wichtigkeit vorgehen, Knoten oder Zweige des sympathischen Nerven. Setzt man nun das Wesen der Brechruhr in einen an Lähmung gränzenden Zustand des sympathischen Nerven, so erklärt sich daraus sehr einfach die Unthätigkeit der verschiedenen Sekretionsorgane. Am auffallendsten leidet die Absonderung des Urins, indem oft lange Zeit in der Krankheit kein Wasser gelassen wird, auch durch den Katheter keines entleert werden kann und nach dem Tode die Blase fast oder ganz leer getroffen wird, also offenbar nicht bloß die Exkretion, sondern auch die Sekretion des Harns stockt. Ebenso ist nach der gewöhnlichen Ansicht auch die Absonderung der Galle unterdrückt, und viele Aerzte haben hierauf bei der Behandlung ihre ganze Aufmerksamkeit gerichtet und das Antreiben der Gallensekretion dabei für die Hauptsache gehalten, wornach also die unterdrückte Gallensekretion die nächste Ursache der Krankheit wäre. Dieses ist auch geradezu behauptet worden, und man hat desshalb den Vorschlag gemacht, die morgenländische Brechruhr mit dem Namen *Acholia* zu belegen \*) im Gegensatz gegen die gewöhnliche *Cholera*, die in übermässiger Gallensekretion ihren Grund haben soll; somit hätte man zwei in ihren Symptomen grosse Aehnlichkeit darbietende, in ihrem Wesen aber direkt entgegengesetzte Krankheiten. Ausgemacht ist

---

\*) Magazin der ausländ. Litteratur der gesammten Heilkunde, von Gerson und Julius. Bd. XXI. S. 57.



es, dass bei der morgenländischen Brechruhr in der Regel keine Galle in den Ausleerungen vorhanden ist; diess ist jedoch noch kein Beweis, dass auch ihre Sekretion nothleidet. Im Gegentheile lässt der Umstand, dass man bei Leichenöffnungen die Gallenblase gewöhnlich gefüllt findet, darauf schliessen, dass es mehr an der Exkretion, als an der Sekretion der Galle fehlt; man findet selbst nach dem Tode noch den Gallengang krampfhaft zusammengezogen, ein deutlicher Beweis, dass der Austritt der Galle gehindert ist. Wäre auch wirklich die nächste Ursache der Krankheit eine Unterdrückung der Gallensekretion, so könnte doch Galle in den Ausleerungen zum Vorschein kommen, nämlich solche, die schon vor Beginn der Krankheit abgesondert war. Ob nun die Galle, welche man in der Gallenblase findet, vor oder während der Krankheit abgesondert ist, lässt sich durchaus nicht bestimmt entscheiden; wahrscheinlich ist es, dass wenigstens ein Theil derselben erst während der Krankheit abgesondert ist; denn ihre abnorme Beschaffenheit lässt vermuthen, dass zu ihrer Bereitung ein krankhaft beschaffenes Blut verwendet wurde. Man findet nämlich die Gallenblase fast immer von einer zähen, dicken, schwarzen oder sehr dunkelgrünen Galle angeschwollen. Wenn wir es wahrscheinlich finden, dass auch während der Krankheit die Gallensekretion fortdauert, so könnte diess auch als ein Einwurf gegen die oben aufgestellte Ansicht von dem Wesen der Krankheit erscheinen; dieser Einwurf ist aber nur scheinbar. Allerdings stehen die Sekretionsorgane überhaupt, und gewiss auch die Leber, unter dem Einfluss des Gangliensystems, und eine Schwächung



des letztern sollte also auch eine Schwächung der Gallensekretion zur Folge haben. Diese Schwächung muss aber keineswegs eine völlige Unterdrückung sein; ferner kommt aber auch der Einfluss des Blutes in Betracht. Wenn einerseits die Gallensekretion durch den Schwächezustand des Gangliensystems leidet, so treibt andererseits der Kongestionszustand, in welchem sich die Leber befindet, die Thätigkeit der letztern an; eben so dient die mangelhafte Respiration und die mangelhafte Oxydation des Blutes zur Erhöhung der Funktionen der Leber, da diese Verrichtungen stets in einem antagonistischen Verhältnisse zu einander sind. Daher steht die muthmaassliche Fortdauer der Gallensekretion während der Krankheit keineswegs im Widerspruch mit der Ansicht, dass die Cholera begründet sei in einem Leiden des sympathischen Nervensystems.

---

Ist die morgenländische Brechruhr eine eigenthümliche Krankheit (*morbus sui generis*) oder gehört sie zu der gewöhnlichen Brechruhr? Diese Frage ist von Vielen aufgeworfen und beantwortet, von Wenigen aber einer genauern Untersuchung unterworfen worden, so sehr sie auch dieselbe verdient. Die meisten Aerzte, welche die morgenländische Brechruhr beobachtet haben, halten dieselbe für eine von der gewöhnlichen specifisch verschiedene Krankheit; ob mit Recht, soll in den folgenden Blättern untersucht werden. Wir müssen übrigens zum Voraus bemerken, dass bei dieser



Parallele nur auf die ächte Brechruhr Rücksicht genommen ist, die von der unächten sorgfältig getrennt werden muss \*). Als diagnostische Momente zwischen der gewöhnlichen und morgenländischen Brechruhr sind hervorgehoben worden:

1) ganz vorzüglich die verschiedene Beschaffenheit der Ausleerungen; in der morgenländischen Brechruhr bestehen dieselben in wässrigen Flüssigkeiten, in der gewöhnlichen dagegen, wie man behauptet, stets in galligen Stoffen. Es scheint, dass diejenigen, welche diese Unterscheidung aufstellten, keine oder wenig Gelegenheit hatten, die gewöhnliche Brechruhr zu beobachten; aus den Beschreibungen der ausgezeichnetsten Aerzte geht hervor, dass die Beschaffenheit der ausgeleerten Stoffe in der letztern sehr variirt. Schon von Andern ist darauf aufmerksam gemacht worden, wie sehr besonders die Schilderungen alter Aerzte auf die morgenländische Brechruhr passen. So sagt Celsus: *Simul et dejectio et vomitus est, praeterque haec inflatio est, intestina torquentur, bilis supra infraque erumpit, primum aquae similis, deinde ut in ea recens caro lota esse videatur, interdum alba, nonnunquam nigra, vel varia \*\*).* Obgleich Celsus hier das Wort *bilis* gebraucht, so sieht man doch aus der nähern Angabe über die Be-

---

\*) s. J. P. Frank, de curandis hominum morbis epitome, juxta ejus praelectiones a nonnullis suorum auditorum edita. Lib. V. pars II. Viennae, 1824. S. 223. und S. G. Vogel's Handb. der prakt. Arzneiwissenschaft, Vierte Ausg. Wien 1828. Thl. VI. S. 77.

\*\*) Celsi de re medica lib. VI. cap. II.



schaffenheit der ausgeleerten Stoffe, dass diese nach seinen Beobachtungen nichts weniger als von galliger Beschaffenheit waren.

Aretaeus, dessen Krankheitsschilderungen als vortrefflich anerkannt sind, nennt die Cholera einen *recursus materiae ex universo corpore in stomachum et intestina*; die Ausleerungen sind nach ihm anfangs wässrig, im spätern Verlauf der Krankheit gallig \*).

Sydenham beobachtete die Cholera in London häufig in den Jahren 1669 und 1676. Die Brechruhr vom Jahre 1669 schildert er folgendermaassen: *Morbus hic, qui anno 1669 se latius diffuderat, quam alio quovis anno, quantum ego observaveram, eam anni partem, quae aestatem fugientem atque autumnum imminentem complectitur, unice ac eadem prorsus fide, qua veris primordia hirudines aut insequentis tempestatis fervorem cucullus, amare consuevit. — Malum ipsum facile cognoscitur; adsunt enim vomitus enormes ac pravorum humorum cum maxima difficultate et angustia per alvum dejectio; ventris ac intestinorum dolor vehemens, inflatio et distentio; cardialgia, sitis. Pulsus celer ac frequens, cum aestu et anxietate, non raro etiam parvus et inaequalis, insuper et nausea molestissima, sudor interdum diaphoreticus, crurum et brachiorum contractura, animi deliquium, partium extremarum frigiditas, cum aliis consimilis notae symptomatibus, quae adstantes mag-*

---

\*) De causis et signis acutorum morborum lib. II. cap. 5. — Aretaei Cappadocis Opera omnia. Edit. cur. C. G. Kühn. Lipsiae 1828. S. 43.



nopere perterrefaciant atque etiam angusto viginti quatuor horarum spatio aegrum interimant. — An eim andern Orte sagt er: Exeunte aestate (1676) Cholera Morbus epidemice jam saeviebat, et insueto tempestatis calore evector, atrociora convulsionum symptomata, eaque diuturniora secum trahebat, quam mihi prius unquam videre contigerat. Neque enim solum abdomen, uti alias in hoc malo, sed universi corporis muscoli, brachiorum crurumque prae reliquis, spasmis tentabantur dirissimis, ita ut aeger e lecto subinde exiliret, si forte extenso quaquaversum corpore eorum vim posset eludere \*). Auf die Aehnlichkeit dieser Schilderungen der Brechruhr mit der morgenländischen Cholera ist selbst von Aerzten, welche die letztere zu beobachten Gelegenheit hatten, aufmerksam gemacht worden. Man bemerkt, dass Sydenham über die Beschaffenheit der ausgeleerten Stoffe Nichts sagt, und darf daraus wohl schliessen, dass dieselben keine ausgezeichneten Merkmale darboten oder dass ihre Beschaffenheit nicht konstant war.

J. Quarin, der die Brechruhr nicht selten beobachtete, sah öfters fleischwasserähnliche Ausleerungen. Er sagt: Quo magis excrementa a statu naturali recedentia, ut livida, nigra aut loturae carnis similia excernuntur, eo periculosior morbus \*\*). Ebenso sagt S. G. Vogel, die Ausleerungen sehen oft wie Fleischwasser aus und seien anfangs mit den

---

\*) Th. Sydenh. Opera medica. Venetiis, 1762. S. 21 und 39.

\*\*) J. Quarin, animadversiones practicae in diversos morbos. Viennae, 1786. S. 205.



Ueberresten von Speisen und Exkrementen vermischt; dann werden sie grün, gelb u. s. w. \*). Der berühmte P. Frank sagt über die Ausleerungen: *Mox uno impetu et tempore, vel saltem ~~per~~ alternatim, et vomitus et fluxus alvi effrenes sequuntur. Primum aquae similia, dein, acsi recens caro lota esset, nonnunquam alba, et nigra, in aliis, quod rarum est, lympham modo limpida, et ad frigus coitura, in multis primum ciborum reliquiae, postea humores biliosi, plus minus mucos permixti, mox flavi, mox aeruginosi, mox fusci, nigri, plerumque acidissimi, ac fere corrosivi una cum copiosis ructibus et flatibus, nec non ipso cum sanguine, repetitis frequentissime vicibus et sub tam subitanea virium prostratione redundantur, ut assumti veneni haud raro subintret suspicio \*\*).* Man sieht hieraus, dass P. Frank die galligen Ausleerungen nicht für konstant in der Brechruhr hielt und dass er auch eben solche Ausleerungen, wie sie bei der morgenländischen Brechruhr vorkommen, beobachtete. Auch eifert er sehr gegen die gewöhnliche Ansicht, dass die Cholera die Folge von krankhafter Gallensekretion sei. Mit ihm stimmt auch Berends überein; dieser macht besonders aufmerksam darauf, dass nicht blos gallige Feuchtigkeiten ausgeleert werden, dass besonders durch den After oft eine ungemein grosse Quantität wässriger Feuchtigkeit abgehe, so dass es den Anschein habe, als ob der ganze Körper in Wasser zerfliessen

\*) S. G. Vogels Handb. der prakt. Arzneiwiss. Vierte Ausg. Wien, 1828. Thl. VI. S. 76.

\*\*) J. P. Frank, a. a. O. S. 232.



wolle. Er sucht das Wesen der Cholera in einem heftigen Krampfe des ganzen Nahrungskanals und nennt die Krankheit eine Epilepsie des Nahrungskanals, » wie sie sich denn auch mit heftigen Krämpfen der Extremitäten und selbst mit allgemeinen epileptischen Bewegungen oft genug verbindet. » Dabei macht er auf die Wichtigkeit dieser Ansicht für die Behandlung aufmerksam, in sofern daraus hervorgehe, dass es dabei nicht auf Hinwegschaftung materieller Reize, sondern auf Stillung des Krampfes ankomme \*).

Man sieht aus diesen Angaben, dass die ausgezeichnetsten Aerzte weit entfernt waren, gallige Ausleerungen für ein pathognomonisches Zeichen der gewöhnlichen Brechruhr zu halten. Andererseits aber ist die Abwesenheit der Galle in den Ausleerungen bei der morgenländischen Brechruhr nicht konstant, wovon schon früher die Rede war. Spricht doch Orton sogar von Fällen, in denen ein Uebermaass von Galle stattgefunden habe \*\*)! Ob Galle in den Ausleerungen erscheint oder nicht, hängt davon ab, ob der Gallengang krampfhaft verschlossen ist oder nicht. In der gewöhnlichen Brechruhr, die in der Regel nicht so heftig ist, als die morgenländische, bleibt derselbe meistens permeabel, daher gewöhnlich in den Ausleerungen Galle erscheint; in der heftigern morgenländischen Brechruhr aber findet in der Regel das Gegentheil statt. Sollte nun die An- oder Abwesen-

---

\*) C. A. W. Berends Vorlesungen über prakt. Arzneiwissenschaft, Bd. IV. Berlin, 1828. S. 328 u. f.

\*\*\*) Die ostindische Cholera, a. d. Engl. des J. M. Good übersetzt und mit einigen Zusätzen versehen von Prof. F. G. Gmelin. Tübingen, 1831. S. 23.



heit der Galle in den Ausleerungen einen wesentlichen Unterschied begründen, so würde dieser auf dem geringern oder höhern Grade des Krampfes, der den Gallengang befällt, beruhen. Wirklich meint denn auch Dr. Pupurew, das Wesen der morgenländischen Brechrühr sei eine krampfhaft verschliessung der Gallengänge, wodurch die Galle verhindert werde, sich in den Zwölffingerdarm zu ergiessen \*). Wie er aber hieraus die übrigen Erscheinungen der Krankheit ableiten will, ist nicht einzusehen.

2) sollen die allgemeinen Krämpfe der morgenländischen Brechrühr eigenthümlich sein und ein Unterscheidungsmerkmal von der gewöhnlichen abgeben. Die Krämpfe variiren, wie wir gesehen haben, in der morgenländischen Brechrühr sehr, so dass sie ganz fehlen, aber auch in ihren heftigsten Formen sich zeigen können. Die meisten Beobachter machen vorzüglich auf die Wadenkrämpfe aufmerksam, die auch in der gewöhnlichen Brechrühr nur selten fehlen, so dass Tode sie für ein ganz charakteristisches Symptom derselben ausgibt \*\*). Uebrigens kommen auch allgemeine Krämpfe in heftigern Fällen der gewöhnlichen Brechrühr vor, wie man schon aus den obigen Citationen aus Sydenham und Berends sieht. Schon Aretaeus spricht von Konvulsionen: *Mors doloribus plenissima ac miserrima, quae convulsionibus et strangulatione et inani vomitu infertur.* Ebenso bemerkt Fr. Hoffmann über die

---

\*) Lichtenstädt, die asiatische Cholera in Russland in den Jahren 1829 und 1830. Berlin 1831. S. 78.

\*\*\*) Tode, medic. chirurg. Bibl. Bd. IX. S. 566.



Höhe der Krankheit: *Malo ingravescente sitis accedit magna, externa refrigescunt, cor palpitare incipit, septum transversum singultuosis agitur succussionibus, urinae fluxus cohibetur, corpus gelidis perfunditur sudoribus et non raro graves animi defectiones, saepius syncopticae, quin horrendae totius corporis conjunguntur convulsiones* \*). Auch Vogel erwähnt, dass nicht selten Zuckungen eintreten. Also auch hieran kann sich die Diagnose nicht halten.

3) J. Annesley sieht die eigene Beschaffenheit des Blutes als ein charakteristisches Zeichen der morgenländischen Brechruhr an. Die ausgezeichnete Venosität des Blutes scheint allerdings in der letztern konstant zu sein; sie ist offenbar die Folge des gestörten Kreislaufs und der mangelhaften Respiration; denn wenn diese Funktionen durch einen Aderlass erleichtert werden, so ändert sich oft schon während des Blutlassens die Beschaffenheit des Blutes. Ueber die Beschaffenheit des Blutes in der gewöhnlichen Brechruhr finden wir keine Angaben; bekanntlich wird in derselben selten Blut gelassen, und zu Sektionen bietet sie auch keine so häufige Gelegenheit dar, als die morgenländische Cholera. Es lässt sich also in der Erfahrung nicht nachweisen, dass das Blut eine der letzteren analoge Veränderung eingehe; indessen ist es nicht unwahrscheinlich, dass dieses wirklich der Fall ist, wenn gleich in geringerem Grade, da auch in der gewöhnlichen Brechruhr die Circulation und die Respiration Störungen erleiden, und eine Menge wässriger Stoffe entleert wird.

---

\*) Fr. Hoffmanni Opera omnia physicomedita. Genevae 1740. fol. Tom. III. p. 165.



4) setzt man die ausserordentliche Bösartigkeit der morgenländischen Brechruhr der Gutartigkeit der gewöhnlichen entgegen. Diejenigen, welche die letztern für so sehr gefahrlos halten, verwechseln sie offenbar mit der unächten; viele ausgezeichnete Aerzte sprechen von der Cholera, als von einer sehr bedeutenden Krankheit, die mit schnellen Schritten dem Tod entgegen gehe. Quarin sagt: Robustissimos quosque, cum vix per aliquot horas cholera correpti essent, pulsu debilissimo, oculis caligantibus ac fere exanimis reperiri. Hinc recte Aurelianus acutissimam dicit et celerrimam passionem, quae nunquam in alteram transeat diem \*). Nach Berends erfolgt der Tod oft schon nach wenigen Stunden \*\*). Ebenso sagt Vogel, die Brechruhr entwickle sich so schnell, dass schon in wenigen Stunden der blühendste Kranke einer Leiche ähnlich sehen, und der Tod erfolgen könne \*\*\*). Auch P. Frank bemerkt: Vehementiore in cholera aegroti ob immensam adeo ac celerem humorum ex ventriculo intestinisque simul jacturam, ob crudelia et corporis et animi tormenta, post quinque sexve jam horas faciem vel maxime mutatam, collapsam et sibi dissimillimam ostendunt, atque nisi promptum feratur auxilium, nunc adeo angusto unius nycthemeri spatio, nunc secundo, tertio quartove die, raro tardius efflant animam †). Man ersieht hier-

---

\*) J. Quarin a. a. O. S. 204.

\*\*) Berends a. a. O. S. 327.

\*\*\*) S. G. Vogel a. a. O. S. 74.

†) J. P. Frank a. a. O. S. 223.



aus, dass die morgenländische und die gewöhnliche Brechruhr in Hinsicht ihrer Gefährlichkeit nicht so sehr entfernt sind; jedoch würde diess, selbst wenn es wirklich der Fall wäre, dennoch keinen specifischen Unterschied begründen.

Es würde uns zu weit führen, wollten wir diese Parallele zwischen der gewöhnlichen und der morgenländischen Brechruhr noch weiterausführen. Man hat die Diagnose vorzüglich auf die bisher angeführten Punkte zu stützen gesucht, und kann sich aus dem Obigen überzeugen, dass dieselben keineswegs haltbar sind; ebenso lassen sich auch die übrigen Erscheinungen der morgenländischen Brechruhr in der gewöhnlichen nachweisen, wenn sie gleich allerdings in der letztern nicht so heftig ausgebildet sind. Wenn nun in den Symptomen der Krankheit kein wesentlicher Unterschied sich nachweisen lässt, so können wir auch einen weiteren Punkt, der zum Behufe der Diagnose geltend gemacht worden ist, nicht gelten lassen; man hat nämlich

5) als Unterschied aufgestellt, die gewöhnliche Brechruhr sei nicht contagiös, die morgenländische dagegen ansteckend. Letztere Eigenschaft ist bekanntlich vielen Aerzten noch sehr zweifelhaft; allein wenn die Ansteckungsfähigkeit auch wirklich statt findet, so kann sie doch keineswegs als diagnostisches Moment anerkannt werden. Die meisten Aerzte nehmen an, dass sich öfters bei Ruhrseuchen ein Ansteckungsstoff entwickle, so dass sich dann die Krankheit durch Ansteckung weiter ausbreiten könne; aber noch keinem ist es deshalb eingefallen, die Ruhr in eine ansteckende und nichtansteckende trennen zu wollen.



Wir sind demnach der Meinung, dass die gewöhnliche und die morgenländische Brechruhr eine und dieselbe Krankheit sind, oder dass diess wenigstens nach den bisherigen Erfahrungen und Beobachtungen anzunehmen sei, — eine Ansicht, die wir so eben auch in den göttingischen gelehrten Anzeigen ausgesprochen finden. »Die Symptomatologie, wie der Verlauf,« sagt der Recensent des amtlichen Berichtes des Gesundheitsrathes zu Madras \*), »stimmen, so auffallend diese Behauptung auch Manchem erscheinen mag, in den wesentlichsten Erscheinungen mit der früher bekannten, unzählige Mal beobachteten und beschriebenen Cholera überein. Das Eigenthümliche dieser unter Einwirkung ungewöhnlicher Umstände als ansteckend aufgetretenen neuen Form kommt besonders mit auf Rechnung der grossen Höhe der Krankheit, ihrer Verbreitung über die entgegengesetztesten Klimate und Völkerschaften, so wie auch der angewendeten Behandlungsart. Die gleichen Gründe sind auch Schuld, dass die Angaben und Schilderungen der Beobachter so verschiedenartig, ja oft so widersprechend erfunden werden. Manche Aerzte sahen nur neue und ganz ungewöhnliche Erscheinungen, für welche ihrer Ansicht nach die gewöhnliche Beurtheilungsweise der allgemeinen Pathologie nicht ausreiche, gegen welche die gewöhnlichen Anzeigen der allgemeinen Therapie Nichts leisteten, und die Hülfsmittel der Materia medica nicht stark genug angewandt werden könnten. Ihr Erstaunen, das bei den Nichtärzten

---

\*) Göttingische gelehrte Anzeigen. Jahrg. 1831. S. 442.



zum Schreck wurde, liess selten eine ruhige, von Vorurtheilen freie Betrachtung zu. Die wesentlichen Erscheinungen wurden mit zufälligen verwechselt, hypothetische Voraussetzungen, durch Lieblingsmeinungen und befangenes Wesen zu Glaubensartikeln ausgebildet, wurden wie Thatsachen angenommen und Andern als solche hingestellt. Mit Bedauern vermisst man unter den vielen aufgezeichneten Krankheitsfällen einfache Erzählungen des Geschehenen, so wie von Schulansichten freie Erklärungen. Es ist mehr ein instinktartiges Streben, ein Wunder von Krankheit zu zeigen, an deren Abenteuerlichkeit man glauben, deren Macht man sich unterordnen müsse, als ein Eifer, zur klaren wissenschaftlichen Einsicht zu verhelfen, so wie zu der Angabe der Mittel, um zur Ehre der Heilkunst dieses Uebel zu bewältigen.»



### III.

#### Von den Ergebnissen der Leichenöffnungen.

---

Wir theilen über diesen Gegenstand die zwei vollständigsten Berichte, die uns bekannt geworden sind, mit, nämlich den von Dr. W. C. C. Conwell, Oberwundarzt zu Madras und den von James Annesley, denen wir dann das Erwähnenswerthe aus andern Nachrichten beifügen.

1. *Schilderung des Sektionserfinds von W. C. C. Conwell* \*).

**Der Kopf.** Wenn man den Hirnschädel wegnimmt, so ist das aus den Gefäßen, welche ihn mit der harten Hirnhaut verbinden, herausfliessende Blut von brauner Farbe und klebriger Beschaffenheit. Die Haut erschien schwarz oder purpurfarben, als ob sie ei-

---

\*) Magazin der ausländ. Litter. der ges. Heilk., herausgeg. von Gerson und Julius. Bd. XV. S. 441 u. ff.



nen Körper von dieser Farbe bedeckt hätte. Eine ausserordentliche Menge Bluts sickerte aus ihren Adern. Die Hirnmasse schien zu gross für den einen Augenblick vorher sie einschliessenden Hirnschädel; wenn man die harte Hirnhaut wegnahm, so waren die über die Fläche des Gehirns laufenden Adern ganz angeschwollen, als ob man sie mit einer dunkeln, purpurfarbenen Flüssigkeit eingespritzt hätte. Wenn man die Häute wieder über die Hirnmasse legte, so sah man deutlich, dass die braune Farbe von den Adern herrühre. Die Hirnmasse war von natürlicher Farbe und Festigkeit, und jeder Blutaderzweig, wie klein er auch war, erweitert und mit einem dunkeln, klebrigen, flüssigen Blute angefüllt. Das waren die allgemeinen Erscheinungen. In einigen Fällen fanden wir eine Ergiessung von einigen Unzen Wasser im Grunde und an der obern Fläche des Gehirns, und in andern eine Austretung des schon bezeichneten klebrigen und dunkeln Blutes. Der lange Blutbehälter war beständig mit Blut angefüllt, ebenso die Seitenblutbehälter. Wenn man einen wagrechten Schnitt durch eine Halbkugel machte, so schien das Gehirn seine natürliche Farbe und Beschaffenheit zu haben; aber anstatt der Punkte rothen Blutes, als Zeichen, dass die Schlagadern durchschnitten seien, fand sich eine unmittelbare Ergiessung des klebrigen und dunkeln Blutes aus den Enden der Adern, die überall in der ganzen Hirnmasse angefüllt waren.

Im Allgemeinen war eine grössere oder geringere Ergiessung in den Seitenhöhlen. Das Adergeflecht war gewöhnlich mit Blut angefüllt. Das kleine Gehirn war von gewöhnlicher Beschaffen-



heit bis auf diese venöse Ueberfüllung. Wenn man die Hirnmasse wegnahm und den Grund untersuchte, so zeigte sich hier dieselbe venöse Ueberfüllung. Zuweilen fand man eine Blutergiessung im Grunde. Wenn die Krankheit ihre Zeiträume schnell durchlief, ohne die gewöhnlichen Zeichen von Schmerz, Krampf u. s. w., so fand man gewöhnlich ausgetretenes Blut, entweder auf der Oberfläche, oder im Grunde des Gehirns, oder die Blutüberfüllung war an diesen beiden Theilen deutlich zu sehen. In unsern Leichenöffnungen zu Madras liess sich diese venöse Anhäufung stets nachweisen.

*Die Brusthöhle.* Wenn man die Brusthöhle öffnete, so waren die Lungen mehr oder weniger welk und zeigten mehr Widerstand beim Drucke, als im natürlichen Zustande. Das Rippenfell hatte seine natürliche Farbe. Ein oberflächlicher Einschnitt in das Lungengewebe zeigte nichts Ausserordentliches, ausgenommen eine geringe venöse Ueberfüllung; einem tiefern Einschnitte folgte eine reichliche Ergiessung eines klebrigen und schwarzen Blutes. Wenn man die Lungen herausnahm, so fand man die hintere Fläche schwarzblau und schwarz, und beim Anfühlen war es, als ob man eine Fleischmasse drücke; Einschnitte in dieselbe zeigten Massen geronnenen Blutaderblutes, und es floss eine grosse Menge hervor. Untersuchte man sorgfältig, so fand man, dass dieses Blut in den Blutaderzweigen enthalten war, in welchen die Blutanhäufung bis zu einem Grade stattgefunden hatte, der zwei Drittel der Lungen der Luft unzugänglich machte. Die am wenigsten befallenen Theile waren die Spitze und vordere Oberfläche. Die Leichenöff-



nungen, die an andern Orten angestellt worden, zeigten verschiedene Abänderungen in Rücksicht der Blutanhäufung in den Lungen; in diesen Fällen war der Hauptsitz der Ueberfüllung in den Eingeweiden des Unterleibs.

Die Feuchtigkeit des Herzbeutels wurde von Einigen in einem krankhaften Zustande gefunden. Ich erinnere mich selbst nicht, sie so gesehen zu haben; es ist möglich, dass ich sie nicht sorgfältig untersucht habe.

Das Herz war durchgängig in einem sehr schlaffen Zustande und von einer dunklern Farbe als gewöhnlich. Die rechte Herzkammer enthielt gewöhnlich eine Menge klebrigen Blutes, aber die linke war beinahe oder ganz leer.

Die *Bauchhöhle*. Wenn man den Unterleib öffnete und das Netz bei Seite schob, so fehlte das glänzende Aeussere, welches diese Höhle im gesunden Zustande darbietet; sie erschien beinahe trocken. Der Magen war gewöhnlich schlaff und im Allgemeinen von natürlicher Farbe. Die dünnen Gedärme waren immer mit Gas angefüllt, die dicken und der Blinddarm äusserlich von gesunder Farbe, im Allgemeinen zusammengezogen. Das untere Drittel des Krummdarmes war rücksichtlich der Farbe immer mehr oder weniger verändert; zuweilen erschienen kleine Flecken von blassrother Farbe in einiger Entfernung von einander. Diese Flecken waren an ihren Rändern blass, aber in ihrem Mittelpunkte dunkler; wenn man einen von den Därmen losgetrennten Theil aufblies und die Venenäste in Acht nahm, so schien es, dass der Mittelpunkt des schwarzen Flecks durch eine ve-



nöse Anhäufung und zuweilen durch Austretung von Blut erzeugt werde und dass der weit hellere Rand, der die Gränzen bildete, aus kleinen Gefässen zusammengesetzt war, die mit dem angefüllten Theile, der dadurch offenbar etwas Blut erhalten hatte, verbunden waren. Der Durchmesser dieser Flecken betrug gewöhnlich ungefähr einen Drittelszoll; zuweilen waren sie so zahlreich und so gedrängt, dass sie einen Theil der Därme roth färbten; jedoch entdeckte selbst hier eine sorgfältige Untersuchung noch die ursprünglichen Punkte der Anhäufung. Das äussere Aussehen wechselte rücksichtlich der Farbe; in einigen Fällen war es sehr dunkel, und zuweilen fand man es gleichmässig schwarz, wie in einem brandigen Zustande, mit dem es leicht verwechselt werden konnte. Jedoch war offenbar kein Brand zugegen. Die Aeste der Schlagadern waren leer; der Blinddarm nahm nur sehr theilweise oder gar nicht an diesen Erscheinungen Theil; die dicken Därme zeigten nichts Aehnliches, die beiden obern Drittel waren blass. Man kann hier bemerken, dass, wenn dieser Grad von Blutanhäufung in den Gefässen der Därme statt fand, diess eine sehr lange Dauer der Krankheit anzeigte, und es war weniger Blutanhäufung im Gehirne, als wenn der Tod rasch eingetreten war. In diesem letzten Falle fand man viel weniger, zuweilen eine geringe oder gar keine venöse Blutanhäufung in den Hüllen der Därme. Die Blutadern des Netzes und Gekröses waren mit schwarzem, zähem Blute angefüllt. Wenn man den Darmkanal und den Magen öffnete, so fand man gewöhnlich in Letzterem ungefähr vier bis sechs Unzen einer Flüssigkeit, die genau dem vor dem Tode Aus-



gebrochenen oder durch die Stühle Abgegangenen gleich, und eine sehr geringe Menge derselben Flüssigkeit fand sich gewöhnlich in dem untern Theile des Krummdarmes. Es war durchaus keine Spur von Galle im Magen oder im Darmkanal zugegen, ausgenommen in wenigen Fällen, wo der Kranke drei Tage gelitten hatte; die zähe Galle hatte da zu fließen angefangen. Diese Fälle waren sehr selten.

Wenn der zähe Schleim von der Schleimhaut des Magens weggenommen war, an der er ausserordentlich fest sass, so kamen rothe Flecken an verschiedenen Theilen der Oberfläche des Magens zum Vorschein, die genau den schon beschriebenen, an dem unterm Drittel des Krummdarms vorkommenden gleichen.

Die innere Fläche der Speiseröhre zeigte zuweilen ähnliche, aber weniger zahlreiche Flecken. Der Zwölffingerdarm, der leere Darm und die beiden obern Drittel des Krummdarms hatten an ihrer innern Fläche nichts anderes Krankhaftes, als eine Fortsetzung der dicken Lage zähen Schleimes, den man im Magen gefunden. In den Fällen, wo einfache Flecken oder Röthen da waren, nahm man diese leicht weg, indem man die Schleimhaut mit einem Messer abkratzte; wenn aber die Krankheit bis zu dem Punkte gekommen war, wo diese Flecken sich vereinigt und den Därmen eine allgemeine schwarze Farbe gegeben hatten, machte man sie durch das Abkratzen nur blässer.

Die innere Fläche des Blinddarms und der ganze Grimmdarm waren blässer als im gesunden Zustande; der obere Theil des Mastdarmes war



ebenfalls blass; sein unteres Ende in einem etwas gereizten Zustand. Die Harnblase war runzelig und leer; ihre innere Fläche, unten an der Vorsteherdrüse, zeigte oft Spuren eines gereizten Zustandes.

Die Nieren hatten an Dicke abgenommen und waren schlaff.

Das in der Milz enthaltene Blut hatte das in dieser Krankheit gewöhnliche Aussehen dieser Flüssigkeit. Ich habe dieses Organ nie sehr angefüllt gesehen und finde diese Veränderung auch nicht in irgend einem von den Tausenden der den drei Statthalterschaften Indiens abgestatteten Berichte besonders bezeichnet. Diese Sache scheint um so merkwürdiger, da der Bau der Milz sie für Blutanhäufung ausserordentlich empfänglich macht \*).

In der Bauchspeicheldrüse konnten wir keine Veränderung bemerken.

Die Beschaffenheit der Leber wechselte von der gewöhnlichen Blutanhäufung bis zu der stärksten, als ob sie mit Gewalt mit dickem, zähem Blute eingespritzt worden wäre, welches ihre Dicke, Dichtigkeit und Farbe veränderte. Zuweilen waren ihre Gefässe zerrissen, und man fand eine beträchtliche Menge ausgetretenen Blutes auf ihrer auswärts gebogenen Fläche; ein in ihre Masse gemachter Einschnitt zeigte dem Gesichte und dem Gefühle eine muskulöse, braune oder schwärzliche Masse.

Die Gallenblase ist fast in allen Fällen von einer zähen, dicken, schwarzen oder sehr dunkelgrü-

---

\*) Vergl. die Schilderung des Sektionserfunds von James Annesley.



nen Galle angeschwollen. Wenn man eine Sonde in den Gallenblasen- oder in den Lebergang bringt und sie gegen den Zwölffingerdarm hinführt, so stellt sich beim weiteren Fortrücken, nahe beim Eintreten des gemeinschaftlichen Gallenganges in den Darm ein Hinderniss ein, und es erheischt mehr oder weniger Kraft, es zu entfernen; wenn man hingegen auf die Gallenblase drückte, bedurfte es oft einer sehr beträchtlichen Kraft, um die Galle in den Zwölffingerdarm zu treiben; war aber nur ein Tropfen durchgegangen, so fuhr sie fort zu fließen.

Ich bedaure sehr, dass ich das Rückenmark und seine Häute nicht untersucht habe; eine Kenntniss seines Zustandes und des Verhaltens der Nerven, die, nach den Krämpfen zu urtheilen, vorzüglich angegriffen sind, würde unsere Pathologie bereichern haben.

Dr. Davy beobachtete zu Ceylon, dass, obgleich die Körper vor dem Tode steif waren, sie doch nachher ganz biegsam wurden, und dass die Muskeln, wie die eines auf der Jagd oder durch den Blitz getödteten Thieres, gespannt erschienen, welche Erscheinungen ich ebenfalls beständig beobachtet habe.

---

## 2. Schilderung des Sektionserfinds von James Annesley \*).

*Aeussere Beschaffenheit.* Die Extremitäten waren zusammengeschrumpft und gerunzelt und hatten eine

---

\*) Ueber die ostindische Cholera, nach vielen eigenen Beobachtungen und Leichenöffnungen, von James Annesley. Nach



blauliche Farbe; die Lippen und andere nicht von der Cutis überzogene Theile sahen dunkel purpurfarbig aus. Die weichen Theile waren zusammengeschrumpft, die Augen eingesunken, die Gesichtszüge erstaunlich zusammengefallen und im Verhältniss zu der kurzen Dauer der Krankheit ganz auffallend leichenartig; die oberflächlichen Gefässe waren zusammengezogen und blutleer.

*Kopfhöhle.* Die Sinus und die Venen des Gehirnes und seiner Häute waren immer mit schwarzem, dickem und klebrigen Blute sehr stark angefüllt. Die Arachnoidea war oft undurchsichtig, etwas verdickt und an die anliegenden Häute adhärirend. In den Ventrikeln und zwischen den Häuten fand sich oft etwas seroser oder gelatinoser Erguss. Die Gehirnssubstanz war zuweilen weich und breiartig, aber nur selten fanden sich sehr deutliche Spuren von vermehrter Thätigkeit der Gefässe darin.

Die Kongestion von schwarzem Blute und der so oft angetroffene Erguss scheinen die Stumpfheit, die Schwerhörigkeit, den Schwindel und das Brausen vor den Ohren veranlasst zu haben, welches gewöhnlich während der Krankheit beobachtet wurde; auch waren jene Erscheinungen gewöhnlich in den Fällen in höherem Grade vorhanden, in welchen diese Symptome am heftigsten sich geäußert hatten.

*Brusthöhle.* Das Herz und die grossen Venenstämme fand man meistens von dickem, schwarzem Blute stark ausgedehnt, welches in einigen Fällen

---

der zweiten Ausgabe von 1829 a. d. Engl. übers. von Dr. G. Himly. Hannover, 1831. S. 104 u. ff.



flüssig, in anderen nur halbflüssig und in noch anderen koagulirt war, wo es denn wie schwarze, krümelige Gallerte aussah. Die Substanz des Herzens schien zuweilen weicher und leichter zerreissbar zu sein, als im gesunden Zustande. Die Lungen waren gewöhnlich verkleinert, zusammengefallen, mit schwarzem Blute angefüllt, schwerer als im natürlichen Zustande, und sahen fleischig, hepatisirt und wie gequetscht aus. Die Pleura war gewöhnlich blass und gesund. Das Pericardium war wie im natürlichen Zustande und enthielt zuweilen eine geringe Menge von Serum.

Dass diese krankhaften Erscheinungen mit der Störung der Respiration und des Kreislaufes, welche während der Krankheit beobachtet wurde, in Verbindung stehen, wird Jedem einleuchtend sein. Auch fand man, dass der Grad dieser krankhaften Umänderungen genau im Verhältnisse stand zu dem Grade der Störung jener Funktionen. Obgleich ich übrigens gern zugeben will, dass ein grosser Theil dieser krankhaften Erscheinungen erst nach dem Tode entstand, so glaube ich doch auch behaupten zu dürfen, dass viele schon vorher entstanden waren, und dass die Unterdrückung der vitalen Thätigkeit in den Organen zu der Zeit, wo die Krankheit eintrat, allmählich diese nach dem Tode gefundenen Umänderungen veranlasste und auch gleichzeitig mit ihnen bestand.

*Bauchhöhle.* Bei Eröffnung der Bauchhöhle war zuweilen, wie auch Jameson angegeben hat, ein eigenthümlicher unangenehmer Geruch zu bemerken, zumal bei denen, welche schnell gestorben waren. Der Magen enthielt gewöhnlich eine grössere oder



geringere Menge einer wässrigen, trüben, zuweilen auch klümperigen Flüssigkeit. Diese Flüssigkeit hatte ein verschiedenes Ansehen; zuweilen war sie farblos, zuweilen grünlich, oder mehr ins Gelbe spielend, in andern Fällen braun, fast schwarz. An dem Peritonealüberzuge des Magens war meistens Nichts weiter zu bemerken, als eine grössere Kongestion in den Venen, als man gewöhnlich zu finden pflegt. Die Schleimhaut war zuweilen mit einem dunkel gefärbten, zähen Schleime bedeckt, und wenn man denselben entfernte, so bemerkte man, dass in den Haargefässen eine bedeutende venöse Kongestion stattfand. Diese Kongestion schien vorzüglich in dem unter der Schleimhaut liegenden Zellgewebe ihren Sitz zu haben, und zuweilen war sie an einzelnen Stellen so bedeutend, dass es aussah, als wären Ekchymosen in dieser Haut. Zuweilen war die innere Haut sehr gerunzelt, dem Anscheine nach verdickt, und fühlte sich teigig an, besonders wenn der Magen nicht durch Flüssigkeit oder Luft sehr ausgedehnt war. Oft war der Magen welk und erschlaft, und man konnte die Häute desselben leichter als gewöhnlich mit einem harten Körper durchbohren. In den Fällen, wo von Seiten der vitalen Kräfte einige Reaktion statt gefunden hatte, war die innere Oberfläche des Magens, vorzüglich in der Gegend des Pylorus, lebhafter gefärbt, fast roth und schien verdickt und zusammengezogen zu sein.

Das Omentum war zuweilen zusammengefaltet, oder nach einer Seite des Leibes hingeschoben.

Die dünnen Gedärme waren zuweilen an einigen Stellen mehr als gewöhnlich zusammengezogen,



oft waren sie durch Flatus ausgedehnt, und die Venen derselben waren meistens sehr stark mit schwarzem Blute angefüllt; äusserlich erschienen sie verdickt, teigig, und ihre Farbe variirte von blassem Roth durch alle tieferen Schattirungen bis zu dunklem Purpur; die erstere Farbe wurde besonders an dem Peritonealüberzuge des Duodenum und Jejunum bemerkt, die letztere am Ileum, ungefähr wo es sich mit dem Coecum verbindet. Diese Schattirung der Farbe schien von dem verschiedenen Grade der Kongestion abzuhängen, in welchem sich die Kapillargefässe und Venen der verschiedenen Theile des Darmkanals befanden, so wie von der Anfüllung der arteriellen Kapillargefässe, und endlich auch von der Farbe des in den Gefässen enthaltenen Blutes.

Wenn die dünnen Gedärme aufgeschlitzt wurden, so fand man die Häute derselben verdickt, zumal wenn der Darm nicht aufgetrieben, und noch mehr, wenn er zusammengezogen war; häufig waren sie schlaff, und leichter als gewöhnlich zu zerreißen. Die innere Oberfläche fand man meistens mit einer zähen, klebrigen, lehmfarbigen Masse bedeckt, die zuweilen auch rahmartig oder gelblich aussah. Diess war vorzüglich bei Solchen der Fall, wo die Krankheit plötzlich eingetreten war und nicht lange gedauert hatte. Wenn man diese Masse entfernte, so fand man gewöhnlich die Schleimhaut in dem obern Theile der dünnen Gedärme blass, in den unteren hingegen dunkel und in einem Zustande von Kongestion, vorzüglich da, wo das Ileum blau oder purpurfarbig aussah. Wenn die Krankheit länger gedauert, und vorzüglich, wenn die Konstitution zu reagiren angefan-



gen hatte, so löste sich der klebrige Ueberzug in grösserem oder kleinerem Umfange los und schwamm in dem flüssigen Inhalte der dünnen und dicken Gedärme; die Schleimhaut erschien dann gefässreicher, und die arteriellen Kapillargefässe erschienen mehr inficirt als in der frühern Klasse von Fällen.

Die dicken Gedärme waren häufig zusammengezogen, zuweilen waren sie ausgedehnt, und in einzelnen Fällen fand an einigen Stellen Zusammenziehung, an anderen Ausdehnung statt. Kongestionen in den Venen und venösen Kapillargefässen war meistens sehr deutlich zu sehen, vorzüglich in dem Zellgewebe, welches die Häute mit einander verbindet. Die äussere Haut hatte gewöhnlich eine dunkle Farbe, welche von dem in den Gefässen angehäuften schwarzen Blute herrührte. Die Schleimhaut war oft sehr gefässreich; zuweilen sah sie dunkelroth aus, vorzüglich wenn die Krankheit ziemlich lange gedauert hatte, und wenn starke Stimulantia gegeben waren. Niemals fanden sich Faeces in diesen Gedärmen, und die Flüssigkeit, welche man darin traf, war meistens der im Magen und in den Gedärmen befindlichen ähnlich.

Dass die Kongestion in den Gefässen der dünnen Gedärme mit den Symptomen in Verbindung steht, welche in der Nabelgegend beobachtet wurden, wird Niemand bezweifeln. Aus dem frühen Eintreten der Kolikschmerzen lässt sich schliessen, dass die unregelmässigen Zusammenziehungen und Erweiterungen im Darmkanale, so wie die Menge der darin angehäuften Flatus sehr bald nach dem Einwirken der Krankheitsursachen entstehen; diese Schmerzen kön-



nen folglich als ein Zeichen des ersten Stadiums der Umänderungen in der Struktur dieser Theile betrachtet werden, und obgleich diese Umänderungen aus dem Mangel an vitaler Energie entstehen, so mögen sie doch wohl durch die krankhafte Beschaffenheit des Blutes, welches in den Gefäßen circulirt, noch verschlimmert werden.

Die Leber war meistens ungewöhnlich dunkel und mit schwarzem, dickem Blute sehr stark angefüllt. Zuweilen hatte sie eine purpurrothe oder dunkelbraune Farbe; in andern Fällen war sie scheckig, vergrößert, schlaff oder teigig und leicht zu zerreißen.

Die Gallenblase war immer mit dicker, klebriger Galle stark angefüllt. Die Galle sah gewöhnlich bei denen, welche gestorben waren, ehe die Galle in den Exkretionen zum Vorschein kam, dunkelgrün oder schwarz aus. Obgleich der Ductus hepaticus weit und wegsam war, so pflegte doch die Mündung des Ductus choledochus zusammengeschnürt zu sein, so dass meistens die Galle nur nach einem starken Drucke auf die Gallenblase in das Duodenum überfloss. Bei denen, welche erst nach längerer Dauer der Krankheit gestorben waren, und bei welchen eine Reaktion der vitalen Kräfte und ein Ueberfließen der Galle in die Gedärme stattgefunden hatte, fand man die Gallenblase meistens leer, oder sie enthielt nur eine geringe Menge von gesunder Galle; der Ductus choledochus war dann zwar nicht immer ganz frei von Zusammenschnürung, doch war er gewöhnlich wegsamer als in der vorigen Klasse von Fällen. In wenigen Fällen war die Gallenblase völlig leer, erschlafft und welk. Fast in allen Fällen, wo Galle in den Exkretionen enthalten



gewesen war, und man bei den Sektionen die Gallenblase leer fand, wo man folglich mit Recht annehmen konnte, dass die Galle während des Lebens in die Gedärme übergegangen war, hatte sich die klebrige Masse, mit welcher, wie früher beschrieben wurde, die innere Oberfläche der dünnen Gedärme ausgekleidet war, mehr oder weniger abgelöst und schwamm entweder in dem flüssigen Inhalte der dicken Gedärme, oder sie war mit den Stuhlausleerungen gänzlich fortgeschafft.

Die Milz war meistens vergrößert, mit schwarzem Blute sehr stark angefüllt, und ihre Textur war weich. In einigen Fällen zerfiel sie in Stücke, während man sie nebst den benachbarten Theilen untersuchte, was aber sowohl dem ungewöhnlichen Grade von Ausdehnung als der Erschlaffung und Erweichung ihrer Textur zuzuschreiben war. Die Farbe der Milz war immer ungewöhnlich dunkel.

Die Nieren hatten meistens eine gesunde Struktur, und es fand sich keine organische Umänderung daran, aus welcher man die völlige Unterbrechung ihrer Funktionen während der Krankheit hätte erklären können.

Die Harnblase war meistens leer, und hatte sich unter die Ossa pubis zurückgezogen; die Schleimhaut derselben war häufig mit einer beträchtlichen Menge klebrigen Schleimes überzogen. Die Zusammenziehung der Harnblase war offenbar Folge des Mangels an Urin.

Das Blut. — Die eigenthümliche Beschaffenheit des Blutes erregte vorzüglich in dem ersten Falle, welchen ich zu behandeln hatte, meine Aufmerksamkeit.



keit. Bei jeder Sektion, die ich veranstaltete, fand ich die Venae cavae, die Venae mesaraicae, die Venen in der Nähe des Herzens, die Vena portarum, die Venae iliacae und subclaviae, so wie die Sinus der Gehirnhäute mit dickem, zähem und schwarzem Blute stark angefüllt. Die rechte Hälfte des Herzens war gewöhnlich von eben solchem Blute ausgedehnt; und wenn die linke Hälfte desselben ebenfalls Blut enthielt, so hatte auch dieses dieselbe Beschaffenheit. Die Lungen waren mit pechschwarzem Blute ausnehmend stark angefüllt, und in allen inneren Organen fand mehr oder weniger eine Kongestion von Blut statt, welches sich auf die angegebene Art verhielt. Die Gefäße an der äusseren Oberfläche des Körpers und in den Extremitäten waren meistens zusammengezogen und leer, oder doch beinahe leer.

Dass das Blut nicht erst nach dem Tode diese Beschaffenheit annahm, wird durch das Verhalten des, selbst in den früheren Stadien der Krankheit, durch Aderlässe entzogenen Blutes bewiesen; freilich mag aber auch diese eigenthümliche Beschaffenheit des Blutes nach dem Tode noch zugenommen haben. In den spätern Stadien und vorzüglich wenn die Krankheit sich dem tödtlichen Ausgange näherte, war diese eigenthümliche Beschaffenheit des Blutes am auffallendsten. Ich will nicht behaupten, dass diese Beschaffenheit des Blutes die erste materielle Störung sei, welche nach dem Einwirken der Krankheitsursache erfolgt; ich glaube aber gewiss, dass sie eines der ersten Glieder in der Kette krankhafter Erscheinungen ist, welche mit dem Einwirken der Ursache beginnen, und dass sie natürlich die krankhafte Disposition, aus



welcher sie entstand, erhöht und unterhält. Man mag behaupten, dass das Nervensystem auf irgend eine Art den ersten Eindruck der Krankheitsursache empfangt, und nachher diese Beschaffenheit des Blutes verursacht; aber man muss dann auch annehmen, dass eine verminderte Thätigkeit der Lungen, der Leber und der andern excernirenden Organe gleichzeitig, oder doch beinahe gleichzeitig mit diesem ersten Eindruck bestand, und dass folglich die verbrauchten und schädlichen Bestandtheile des Blutes nicht in dem Grade ausgeschieden wurden, als es für die Fortdauer der organischen Funktionen und die Unterhaltung des Lebens nöthig ist.

Die Erscheinungen, welche bei den Sektionen, sowohl an den festen als an den flüssigen Theilen, beobachtet wurden, verhielten sich bei den Eingebornen ganz so wie bei den Europäern. Der einzige Unterschied, welcher aber in der allgemeinen Beurtheilung der Krankheit Nichts ändert, besteht darin, dass bei den Ersteren die Krankheit gewöhnlich sehr schnell endigte, da ihre Lebenskräfte bald unterliegen, und dass bei ihnen nach dem Tode gewöhnlich Kon-  
gestion beobachtet wurde; bei den Europäern hingegen fand häufiger eine Reaktion statt, und folglich fand man bei den Sektionen eher Spuren von vermehrter Thätigkeit in den Kapillargefäßen.

---

Der Bericht des Bombay'schen Gesundheitsrathes bemerkt, man habe, vielleicht irrthümlich, geglaubt,



dass die Leichname der an der morgenländischen Brechruhr Verstorbenen schneller in Fäulniss übergehen als andere; W. Scot läugnet dieses geradezu.

In solchen Fällen, wo die Krankheit einen schnellen tödtlichen Verlauf genommen hatte, fand man dem Bombay'schen Berichte zufolge fast gar keine krankhaften Veränderungen. Nach Dr. Vos war diess besonders bei Europäern von schwacher und kränklicher Konstitution und bei den geringern Klassen der Eingebornen der Fall. Jedoch gab die Unterleibshöhle bei der Sektion immer einen ausserordentlich unangenehmen Geruch von sich, der von dem gewöhnlichen Leichengeruch sehr verschieden war. Es war dabei aber nicht das mindeste Merkmal, dass die Gefässpartie des Darmkanals in irgend einem Theile gelitten hatte; er war eher bleich und schlaffer als gewöhnlich, angefüllt von einer grossen Menge weisser verdorbener Flüssigkeit, oder leer und von Luft aufgetrieben. Die Erklärung solcher Fälle möchte für diejenigen, welche die morgenländische Brechruhr als eine Magen- und Darmentzündung angesehen wissen wollen, eine schwere Aufgabe sein; bis jetzt haben sie sich derselben noch nicht unterzogen. Sehr oft blieben die Brust und der Bauch ungewöhnlich lange, selbst mehrere Stunden nach dem Tode warm, wenn die Gliedmaassen bereits kalt, bleich und steif geworden waren.

Bei Eröffnung der Schädelhöhle traf man nicht durchgängig die in den voranstehenden Schilderungen angegebenen pathologischen Veränderungen. Dr. Kinis machte auf der Morizinsel dreizehn Leichenöffnungen, wobei nur einmal die Eröffnung der Schädel-



höhle unterlassen wurde. In einem Falle, wo die Krankheit über 12 Stunden gedauert hatte, zeigte dieselbe nichts Abnormes; in den übrigen Fällen fand sich unter der harten Hirnhaut, öfters auch zwischen der weichen und der Spinnwebenhaut wässrige Flüssigkeit, ebenso meistens in den Hirnventrikeln und am Boden des Schädels. Einigemal war die Substanz des Gehirns ziemlich weich, öfters die Blutbehälter und die Gefässe der weichen Hirnhaut von Blut strotzend. — Nach dem Berichte des Bombay'schen Gesundheitsrathes sah das Hirn gewöhnlich ganz natürlich aus; in einigen Fällen war in der Nähe der Kranznaht Lymphe zwischen dessen Häuten ergossen, in andern Fällen waren die Hirnhöhlen und die zu denselben führenden Blutadern mit sehr dunkelm Blute angefüllt. — W. Scot sagt, das Hirn solle in einigen Fällen Kongestion gezeigt haben, doch sei diess nicht völlig entschieden. Nach Gravier zeigte das Hirn keine krankhaften Veränderungen. Solche scheinen mithin wenigstens nicht konstant zu sein.

Die beiden Schilderungen des Sektionserfunds von Conwell und Annesley geben über die Rückgratshöhle Nichts an, die überhaupt selten untersucht worden zu sein scheint. Die krankhaften Veränderungen, welche die in ihr enthaltenen Organe eingehen, entsprechen denen der Schädelhöhle. W. Scot sagt, in einem Falle, wo man das Rückenmark untersucht habe, sei dessen Scheide sehr entzündet gefunden worden; jedoch sei diess kein reiner Brechruhrfall gewesen. Dr. Kinnis untersuchte die Rückgratshöhle in zwölf Fällen; nur einmal fand er keine Abnormi-



täten. In den andern Fällen zeigten sich gewöhnlich wässrige Exsudationen unter der harten Haut des Rückenmarks, und die Blutadern der weichen Haut waren von Blut ausgedehnt, in einem Falle aber waren sie fast leer.

Die von Conwell und Annesley angegebenen Veränderungen der Lungen scheinen nicht konstant zu sein. Dr. Labrousse auf der Insel Bourbon und Guillemeau auf der Morizinsel wollen die Lungen ganz normal gefunden haben; ebenso waren die Brusteingeweide nach dem Bombay'schen Berichte gewöhnlich gesund; damit stimmt auch Gravier überein. Dr. Kinnis scheint an den Lungen keine in die Augen fallenden Veränderungen beobachtet zu haben, wenigstens spricht er gar nicht von ihrer Beschaffenheit.

Dass die linke Herzkammer in der Regel kein oder nur wenig Blut enthielt, wie Conwell angibt, findet sich bei andern Beobachtern nicht bestätigt. Im Gegentheil sagt W. Scot, beide Herzkammern werden voll dunklen Blutes gefunden; ebenso giebt es der Bericht des Bengalischen Gesundheitsrathes an. Die Schlaffheit der Herzsubstanz, deren Conwell und Annesley erwähnen, findet sich gleichfalls nicht immer. In einem Falle war das Herz vielmehr ungemein fest anzufühlen, und sein Gewebe widernatürlich trocken und fest, so dass es nur mit Mühe durchschnitten werden konnte; dabei hatte der Herzbeutel ein unnatürlich rothes Ansehen \*).

---

\*) Medic. chirurg. Zeitung. Jahrg. 1825. Bd. IV. S. 36.



Ueber die Ergebnisse der Eröffnung des Unterleibs haben wir den genauen Angaben Conwell's und Annesley's aus sonstigen Beobachtungen nur wenig beizufügen. Mehrere Aerzte fanden Intussusceptionen des Krummdarmes, namentlich Dr. Kinnis; der Wundarzt Telfair auf der Morizinsel fand sogar in einem Falle zwei Ineinanderschiebungen, die eine in der Mitte, die andere am untern Ende des Krummdarmes. Der Wundarzt Gillespie zu Port-Louis auf der Morizinsel fand fast immer Würmer in den Gedärmen, auch Dr. Kinnis fand häufig welche. Ob vielleicht Würmer für die Krankheit geneigter machen? —

Wenn wir hier von den Angaben der russischen Aerzte in Betreff des Sektionserfunds Nichts erwähnen, so hat diess seinen Grund darin, dass dieselben, soweit sie uns bekannt geworden sind, sich durch Nichts als durch ausnehmende Kürze auszeichnen. —

Ueber den Leichenerfund bei den am nachfolgenden galligen Fieber Gestorbenen berichtet Dr. John Adam: »Fünf Oeffnungen wurden, damit die Fäulniss keine Veränderungen hervorbringe, möglichst schnell nach dem Tode gemacht, und nur bei einer der Kopf geöffnet. Die Hirnhäute waren im natürlichen Zustande, die weiche Haut blos an mehreren Stellen getrübt, was bei genauerer Untersuchung von einer grösseren Menge Blutwasser in den Gefässen und einem Mangel rothfärbender Blutkügelchen herzurühren schien. Es waren keine Zeichen von Ueberfüllung oder vorgängig vermehrter Thätigkeit der Haargefässe sichtbar, und eine grössere Menge von



Blutwasser als sonst. Im Bauche war das Netz immer nach dem Magen in die Höhe gezogen, äusserlich leicht geröthet und allenthalben zusammengezogen. Bei Durchschneidung des Magens fand man dessen ganze innere Fläche geröthet, in einigen Fällen sogar hellroth, in andern hingegen dem Eisenroste gleichend, nicht sternförmig, wie in Brechruhrfällen, wo der Kranke bald nach dem Anfalle gestorben war. Nach dem Pförtner zu war die Farbe immer sehr dunkel und breitete sich von dort nach dem Zwölffingerdarme hin aus. Diese Entzündungsröthe war blos auf die Schleimhaut des Magens beschränkt, und konnte daher durch Schaben der Oberfläche mit dem Zergliederungsmesser entfernt werden, worauf die dann blosliegende Muskelhaut keine ungewöhnliche Farbe zeigte. Der Magen enthielt meistens eine schmutzige wässerige Flüssigkeit mit kleinen grünlichen oder schwärzlichen, in derselben schwimmenden Flocken, welche an dem dessen innere Fläche überziehenden Schleime anhängen. Die dünnen Gedärme schienen auswendig nicht sehr von ihrem gewöhnlichen Ansehen abzuweichen, ausgenommen in einem Falle, wo sie purpurfarbig und hier und dort hellroth waren. Inwendig war die Röthung wie im Magen, und wenn der Schleim weggeschafft und der Darm losgetrennt, zwischen Auge und Licht gehalten wurde, sahen die erweiterten und zahlreichen Gefässe wie ein dichtes Netzwerk aus. In einem Falle bemerkte man an mehreren Punkten eine Annäherung zur Vereiterung. Der Darm enthielt in diesem einen gelblichen dünnen, galligten Roth, der wie die schwarze Flockenmasse im Magen fest an dem Schleimüberzuge seiner innern



Fläche hieng. Zuweilen schien die schleimige Absonderung der Gedärme in einen eiterartigen Ausfluss wie beim Tripper verwandelt zu sein. Doch zeigten sich alle diese Erscheinungen, ausser in einem Falle, bloß in den dünnen Gedärmen, und der Grimmdarm nahm an dieser krankhaften Beschaffenheit keinen Theil. Einmal war der Blinddarm ungewöhnlich gross und lag über der Blase am untern Theil des Bauchs, auch seine innere Fläche war geröthet, wie die der dünnen Gedärme, und in einem andern, mit langwieriger Ruhr verbundenen Falle war der Darm in seiner ganzen Länge in Hinsicht der Beschaffenheit so wie seiner Absonderungen krankhaft. Im untern Theile des Krummdarms war der Schleim roth gefärbt, wie von dünnem, geronnenem Blute, und dieses Ansehen ging bis zum After ununterbrochen fort. Auch die Häute des Darms waren verdickt, und auch sonst noch in ihrem Baue verändert, wie man gewöhnlich bei veralteten Ruhrfällen findet. Die Leber schien nur mehr Blut als gewöhnlich zu enthalten und war in einem Falle härter, so wie auch ihre Oberfläche mehr gerunzelt und wie alte Narben aussehende Stellen enthaltend. Vergrössert war sie indessen niemals. Die Gallenblase war gewöhnlich von dünner, grüner Galle ausgedehnt, in einem Falle halbgefüllt, in einem andern war die Galle mehr zäh und klebrig, in einem dritten die Blase an Grösse verdoppelt, und ganz voll von einer hellen, farblosen Flüssigkeit, wie Wasser, worin etwas Weniges von reinem Schleim aufgelöst ist. Hier schienen auch die Gefässe der innern Haut der Blase erweitert, und ihr Inhalt dunkler als gewöhnlich zu sein. Auch war der Blasengang



ganz verstopft und sehr verdickt. Die Milz war in einem Falle kleiner als gewöhnlich, aber in einem andern vollkommen gesund, und in jeder Hinsicht naturgemäss, so wie auch die noch unerwähnt gebliebenen Baucheingeweide.»



# IV.

## Von der Behandlung der morgenländischen Brechrühr.

Dass die folgende Darstellung der gegen die morgenländische Brechrühr in Anwendung gebrachten Behandlungsmethoden unsere Leser ganz wird befriedigen und beruhigen können, müssen wir bezweifeln. In der That ist es unbegreiflich, dass jetzt, nachdem diese Krankheit innerhalb vierzehnen Jahren ausgebreitete Landstriche durchzogen und durch das Befallen von Millionen Menschen den Aerzten so ausgedehnte Gelegenheit zum Beobachten dargeboten hat, die vielfältigen Erfahrungen noch nicht zu einem sicherern und beruhigendern Resultate geführt haben. Vergleicht man die Erfahrungen so vieler Aerzte, so sieht man sich in ein Labyrinth versetzt, wo man ängstlich nach dem Faden der Ariadne sucht, um sich aus demselben wieder herauszufinden. Ein Arzt empfiehlt ein Mittel als fast unfehlbar, das ein Anderer geradezu als todtbringend betrachtet. Manche Aerzte stimmen in der



Bestimmung der anzuwendenden Mittel überein, aber geben diese in ganz entgegengesetzter Absicht. Die grösste Schwierigkeit aber macht die bunte Mischung, in welcher die verschiedensten Mittel zugleich gereicht wurden, so dass es fast unmöglich ist, auszumitteln, welchem der angewendeten Mittel vorzugsweise die Herstellung der Kranken zu verdanken sei. Aus allen Klassen des überreichen Arzneischatzes hat man gegen das fürchterliche Uebel die wirksamsten Mittel hervorgesucht; Kälte und Wärme, antiphlogistische Mittel und die kräftigsten und flüchtigsten Reizmittel, Brechmittel und Laxanzen, selbst Drastica, Eis und Brantwein und feurige Weine, Narcotica und Excitantia, säuretilgende Mittel und Säuren u. s. w., Alles wurde versucht, Alles gerühmt, Alles wieder heruntergesetzt.

Die Menge der zur Bekämpfung der morgenländischen Brechruhr gerühmten Mittel ist ein trauriger Beweis, dass die Behandlung dieser Krankheit noch auf sehr schwachen Füßen steht. Man ist gewohnt, die Wirkung der gegen eine Krankheit empfohlenen Mittel für um so unsicherer zu halten, und die Krankheit selbst als um so schwerer zugänglich anzusehen, je grösser die Zahl jener Mittel ist. Beurtheilt man die Gefahr der morgenländischen Brechruhr nach diesem Maasstabe, gegen den sich freilich Manches einwenden lässt, so steht es allerdings schlimm mit der Hoffnung, dass es der Arzneikunst gelingen werde, bedeutende Vortheile über diesen neuen Feind zu erringen. Wirklich haben auch schon Mehrere die Ansicht ausgesprochen, dass die Kunst der Aerzte so viel wie Nichts gegen die Cho-



lera vermöge, und sie den Krankheiten beigezählt, von denen Aretaeus sagt: τὰ μείζονα πάντα ἰώνται μοῦ-  
 νοι θεοί! So meinten schon in Indien in den ersten  
 Jahren, als die Brechruhr wüthete, einige Aerzte, und  
 auch in Deutschland halte diese Ansicht wieder, als  
 im vorigen Jahre dieser Schrecken der Völker immer  
 näher gegen unser Vaterland sich heranwälzte. Ein in  
 der allgemeinen Zeitung mitgetheilter nicht uninteres-  
 santer Aufsatz, der ohne Zweifel von einem Arzte  
 herrührt\*), schliesst mit der beunruhigenden Anweisung,  
 diejenigen, welche von der Krankheit befallen werden,  
 mögen sich, statt auf menschliche Hülfe zu bauen, ei-  
 nem höhern Retter empfehlen. Unpassend erscheint  
 es auf jeden Fall, die furchtsamen Gemüther auf diese  
 Art auf ein Uebel vorzubereiten, das auch uns seine  
 Macht fühlen lassen kann; gewiss aber ist es auch  
 höchst unrichtig, die Wirksamkeit aller bis jetzt an-  
 gewendeten Heilmittel in Zweifel zu ziehen, wenn es  
 gleich nicht leicht ist, diejenigen, welche entschieden  
 nützlich sind, zu bestimmen. In Ostindien glaubte man  
 sogar, dass kein von der Brechruhr Befallener genesen,  
 der nicht behandelt werde. William Scot, Mar-  
 shall und mehrere andere Aerzte sprechen diese  
 Ueberzeugung aus. Indessen ist es ausgemacht, dass  
 auch die Heilkraft der Natur ohne Unterstützung der  
 ärztlichen Kunst den Kampf mit der Krankheit beste-  
 hen kann, dass aber dieses viel seltener der Fall ist,  
 als wenn Arzneimittel in Gebrauch gezogen werden.  
 Bei der Epidemie im Orenburgischen Gouvernement

---

\*) Allgemeine Zeitung 1830. Nro. 332, Beil.



im Herbst und Winter 18<sup>30</sup>/<sub>31</sub>, in welchen übrigens die Krankheit nicht in ihrer gewöhnlichen Bösartigkeit auftrat, kamen mehrere bestimmte Fälle vor, dass Brechruhrkranke, ohne dass Arzneien angewendet wurden, genasen; alle Nachrichten aber stimmen darin überein, dass solche Fälle höchst selten sind, und dass die Meisten, denen keine ärztliche Hülfe zu Theil wurde, starben. Dagegen behaupten mehrere Aerzte, welche die genannte Epidemie zu beobachten Gelegenheit hatten, namentlich der Operateur Woskobrinikow und der Staabsarzt Pupurew, die Cholera werde immer geheilt, wenn zu gehöriger Zeit die zweckmässige Hülfe geleistet werde.

Wenn die Bemühungen der Heilkunst gegen die Verheerungen der Brechruhr in Asien und im Osten Europa's bis jezt im Allgemeinen kein tröstliches Resultat hatten, so ist doch nicht zu bezweifeln, dass im Falle die Krankheit auch den Westen unsers Welttheils noch überziehen sollte, sowohl die allgemeinen polizeilichen Maassregeln als die Behandlung der Kranken einen ungleich besseren Erfolg haben würden, indem in unsern höher kultivirten Ländern manche Umstände, welche den Bemühungen der Regierungen und der Aerzte hemmend entgegentraten, wegfallen würden, und die Krankheit uns auch besser vorbereitet treffen würde, als diess augenscheinlich in Russland der Fall war. Man braucht desshalb die übertriebenen Besorgnisse so Vieler nicht zu theilen, die schon wähnen, dieser Würgengel des neunzehnten Jahrhunderts werde mit der Bevölkerung Europa's nicht glimpflicher verfahren, als der schwarze Tod im dreizehnten Jahrhundert. Es wäre höchst traurig,



wenn die Heilkunde hier nicht einen Beweis ihrer Fortschritte zu liefern im Stande wäre.

In der folgenden Aufzählung der gegen die morgenländische Brechruhr empfohlenen und in Anwendung gebrachten Mittel könnte man eine strenge systematische Ordnung vermissen; man wird hier und da Mittel aus den verschiedensten Klassen zusammengestellt finden, und es könnte passender scheinen, die Mittel durchaus nach der Aehnlichkeit ihrer Wirkungen an einander zu reihen. Eine solche Anordnung lässt sich aber nicht streng durchführen, da sehr häufig die verschiedensten Mittel zugleich in Anwendung gebracht worden sind, und sich deshalb nur über die gemeinschaftliche Wirkung dieser Mittel Erfahrungen nachweisen lassen, ohne dass man dabei immer bestimmen kann, welchem einzelnen Mittel der glückliche oder unglückliche Erfolg der Behandlung vorzugsweise beizumessen ist. In diesem Umstande aber liegt auch ein Grund, warum die Therapie dieser Krankheit noch nicht fester basirt ist. Es fragt sich, ob man nicht weiter vorgeschritten wäre, wenn man bei der Behandlung der morgenländischen Brechruhr von den bei der gewöhnlichen Cholera gemachten Erfahrungen ausgegangen wäre. Dass man bei der Heftigkeit und dem raschen Verlauf auf Abweichungen von jener Behandlungsweise gekommen wäre, ist nicht zu bezweifeln, aber die Heilanzeigen möchten doch dieselben geblieben sein. Denn jedenfalls stehen die gewöhnliche und die morgenländische Brechruhr, wenn sich auch eine sichere Diagnose beider aufstellen liesse, was bis jetzt noch nicht geschehen ist, einander näher, als die morgenländische Brechruhr mit



der Ruhr verwandt ist, von welcher letzterer die englischen Aerzte die Behandlung für jene entlehnten. Nach der Parallele, die wir oben zwischen der morgenländischen und der gewöhnlichen Brechrühr gezogen haben, glauben wir gerechtfertigt zu sein, wenn wir in der nachfolgenden Darstellung der Therapie der morgenländischen Brechrühr auch auf die bei der gewöhnlichen gemachten Erfahrungen Rücksicht nehmen.

Die Hauptmittel, welche die brittischen Aerzte in Ostindien gegen die morgenländische Brechrühr anwandten, waren versüßtes Quecksilber und Mohnsaft; in der Regel wurden beide zusammen gegeben und zwar in beträchtlichen Dosen. Man soll auf diese Verbindung durch Zufall gekommen sein, indem ein an dieser Krankheit Leidender einen Skrupel versüßtes Quecksilber und gleich darauf 60 Tropfen von einer Opiumtinktur aus Versehen einnahm und wider Vermuthen genas; indessen scheint diese Geschichte zur Empfehlung dieser Kurmethode erfunden zu sein, denn es ist viel wahrscheinlicher, dass der gute Erfolg derselben bei andern tropischen Krankheiten dazu Veranlassung gab, sie auch in der morgenländischen Brechrühr zu versuchen. Die Verbindung von versüßtem Quecksilber in Skrupeldosen mit Opium war schon längere Zeit vor dem Wüthen der Brechrühr bei den in Ostindien so häufigen Leberentzündungen und Ruhren nach Johnson's Empfehlung gewöhnlich in Anwendung gebracht worden, und die Verwandtschaft der letztern Krankheit mit der Brechrühr führte zu dem Versuche, ihre Wirksamkeit auch in dieser zu erproben. Diese Methode erwies sich denn auch in Ostindien nach den Zeugnissen von einer



Menge englischer Aerzte als recht gut; auf ihre Empfehlung wurde sie später in andern Ländern, wo die Cholera hindrang, und wo europäische Aerzte sie zu behandeln bekamen, meistens angenommen. So empfahl sie auch im Jahre 1823, als die Seuche in die südlichen Provinzen des russischen Reiches eindrang, der Medicinalrath in Petersburg in der von ihm verfassten und noch jetzt überall in Russland verbreiteten Anweisung. Obgleich die meisten Aerzte in Ostindien in die Verbindung von Calomel und Opium das grösste Vertrauen setzten, so war übrigens doch der Erfolg dieser Mittel keineswegs so, dass man sich auf sie allein verlassen hätte, und man wandte daher meistens zugleich noch andere Mittel an, die auf den Erfolg der Behandlung durchaus nicht ohne Einfluss sein konnten, wenn sie auch von den meisten Aerzten nur als Unterstützungsmittel der Kur angesehen wurden. Dass die Erwartungen, die man von der Behandlung mit versüßtem Quecksilber und Opium hegte, in der Erfahrung sich nicht so recht verwirklichten, geht übrigens auch aus den mancherlei Modifikationen der Anwendung dieser Mittel hervor.

Schon Dr. Tytler, der, wie wir im ersten Bande bemerkt haben, der erste Arzt war, welcher die Choleraepidemie beobachtete, wandte eine Verbindung von Calomel und Opium an. Ihm diente das erstere als ein die schädlichen im Magen und in den Gedärmen befindlichen Reisüberreste, die seiner Ansicht nach die Ursache der Krankheit waren, kräftig abführendes und nebenher auch die übermässige Absonderung verdorbener Galle hebendes Mittel; der Mohnsaft aber sollte die übermässige Reizbarkeit



und Neigung zum Erbrechen im Magen dann mässigen, wenn es gefährlich wäre, gleich wieder Quecksilber zu reichen, und den Krämpfen und deren schwächenden Folgen zuvorkommen. Es wurden daher beim ersten Besuche acht Gran versüßtes Quecksilber, und darauf Mohnsaft in fester Gestalt granweise gegeben. Sobald sich aber eine Abnahme des Pulses zeigte, und die Haut kalt anzufühlen wurde, ward eine krampfstillende und reizende Arznei aus zwei Unzen Schwefelnaphtha, eben so viel Salmiakgeist und einem Quart gewöhnlichen Wassers gereicht. Zugleich ward mit dem versüßten Quecksilber in Gaben von vier Gran fortgefahren, bis die Heftigkeit der Erscheinungen nachliess. In einigen Fällen waren zehn Gran versüßtes Quecksilber und vier Gran Mohnsaft nebst acht Unzen der Mixtur in 24 Stunden hinreichend, um der Krankheit Meister zu werden. Gewöhnlich hörte nach Tytler das Erbrechen schon bei der ersten Gabe Quecksilber auf, und die Kranken wurden unter Beobachtung der von ihm öffentlich bekannt gemachten Anweisung hergestellt. Mit dieser Anweisung wurden zweierlei Pillen ausgetheilt, weisse, wovon jede vier Gran versüßtes Quecksilber enthielt, und schwarze, die einen Gran Opium enthielten. In der Anweisung hiess es, diese Pillen haben sich zur Hebung der Cholera als sehr nützlich bewährt; sobald Jemand von der Krankheit befallen werde, soll man ihn zwei weisse Pillen nehmen lassen, wenn sie ohne Wirkung bleiben, eine Stunde darauf noch eine, und wenn diese nicht helfen, vier Stunden nach der ersten Gabe eine vierte; wenn das Erbrechen sehr stark sein sollte, so müsse man eine von den schwarzen Pillen



jedesmal mit verschlucken lassen. Wenn diese Mittel nicht innerhalb der zwei oder drei ersten Stunden nach Anfang des Anfalls genommen werden, so lasse sich von ihrer Anwendung nur ein sehr beschränkter Erfolg hoffen; jedoch sei es rathsam, selbst in einem so späten Zeitraume der Krankheit deren fortgesetzte Anwendung nicht zu unterlassen, da sie auch in den böartigsten Fällen zuweilen den Kranken gerettet haben. Von anderweitigen Mitteln spricht Tytler in dieser Anweisung nicht; es geht daraus hervor, dass wirklich durch die alleinige Behandlung mit Calomel und Opium glückliche Kuren zu Stande kamen; denn der bloßen Heilkraft der Natur können dieselben nicht wohl zugeschrieben werden, da die Fälle, welche Tytler beobachtete, nichts weniger als gutartig waren; er bemerkt nämlich im Eingang seiner Anweisung, dass die Brechruhr, wenn sie nicht geheilt werde, unausbleiblich in 24 Stunden, oft in noch viel kürzerer Zeit tödte. Indem Dr. Tytler obiges Verfahren als das beste und in allen seinen nachherigen Erfahrungen bewährt gefundene empfiehlt, erklärt er sich zugleich heftig gegen die grossen Gaben von Quecksilber mit Mohnsaft, die bald an die Tagesordnung kamen, und meint, dass die Heilung so mancher Kranken durch dasselbe eigentlich nur sagen wolle, nicht alle seien daran gestorben.

Diese grossen Gaben reichte schon im November 1817 der Hülfswundarzt Corbyn. Er gab augenblicklich 15 oder 20 Gran versüsstes Quecksilber, welches er den Kranken auf die Zunge legte und mit 60 Tropfen Laudanum und 20 Tropfen Pfeffermünzöl in zwei Unzen Wasser hinunter-



spülen liess. Er erklärte dieses für die beste Gabe, »weil 60 Tropfen Laudanum, statt wie 15, 20 oder 30 zu reizen, vielmehr beruhigend wirken und 15 bis 20 Gran versüsstes Quecksilber, statt wie 5 bis 10 Gran Mattigkeit, Unbehagen und Entzündung der Gedärme zu bewirken und desshalb abzuführen, das Erbrechen stillen, die Krämpfe heben, den Kranken in Schlaf bringen und ihm ein oder zweimal Oeffnung verschaffen.« Nach dieser Behandlung des ersten Tages gab Corbyn am zweiten, wo schon Erbrechen und Abführen nebst den Krämpfen aufgehört hatten und allgemeine Feuchtigkeit der Haut, gesunder Schlaf und Fühlbarkeit des Pulses am Handgelenke eingetreten waren, 30 Gran Jalappenwurzel, welche einen oder zwei gallige Stuhlgänge bewirkten. Bei dieser Behandlung versichert er von 110 Kranken nur zwei, bereits alte hinfällige Leute, verloren zu haben. Bei Europäern empfahl Corbyn überdiess noch reichliches Blutlassen und niemals eine geringere Gabe, als 20 Gran versüsstes Quecksilber, 60 Tropfen Laudanum und 20 Tropfen Pfeffermünzöl mit zwei Unzen Wasser zu reichen, und bei Krämpfen des Unterleibs ein grosses Blasenpflaster über denselben zu legen. Wenn dieses indessen nicht ziehen oder das Blut nicht aus der Ader fliessen wollte, liess er die Kranken warm baden, oder auch nur, wo diess nicht zu erlangen war, warm reiben und mit warmem Wasser begiessen. Bei unaufhörlichem heftigem Erbrechen und Abführen reichte er 80 Tropfen Laudanum mit 20 Tropfen Pfeffermünzöl, 20 Gran versüsstes Quecksilber, und liess 40 Tropfen Laudanum als Klystier mit Reiswasser geben. Wenn in drei



bis vier Stunden keine Besserung eintrat, wiederholte er diese Gabe, worauf, wie er sagt, der Kranke in einen gesunden Schlaf verfiel, aus dem er fast geheilt erwachte. Die Nachkur bestand dann in regelmässigem Offenhalten des Leibes mit versüstem Quecksilber und Jalappe und gelegentlicher Gabe von 60 Tropfen Laudanum, um Schlaf zu bewirken. Das heftige und dringende Verlangen der über grossen Durst und starkes Brennen in den Gedärmen klagenden Kranken nach kaltem Wasser zum Trinken rath Corbyn niemals zu befriedigen, da er viele während des Trinkens ihren Geist aufgeben gesehen habe; er empfiehlt vielmehr warmes Reiswasser als Getränke zu geben. Das versüsste Quecksilber rath er stets in Pulverform und niemals in Pillen zu geben, da diese oft unverändert abgehen, und bei einer zwölf bis höchstens dreissig Stunden währenden Krankheit keine Zeit zu verlieren sei. Aus dem nämlichen Grunde wendete er den flüssigen, und nicht festen Mohnsaft an, dem er, um die Luft aus dem aufgetriebenen Magen und den Gedärmen zu entfernen, Pfeffermünzöl zusetzte. Als einen Beweis der guten Wirkung seiner Kurmethode führt Corbyn an, dass in Bombay von 14651 auf diese Weise Behandelten nur 1138 starben, während 1294, welche gar nicht behandelt wurden, sämmtlich das Leben einbüssten. — Viele englische Aerzte, die das Corbyn'sche Verfahren in Anwendung brachten, erklären, sich dabei am Besten befunden zu haben. Ueberhaupt wurden das Quecksilber und das Opium allgemein als die Hauptmittel gegen die Brechruhr angesehen. Beide Mittel wurden oft in ungeheuern, und noch dazu häufig wiederholten Gaben



gegeben; doch nur selten beschränkte man sich auf sie allein, es wurden die kräftigsten flüchtigen Reizmittel, Blutentleerungen durch Venaesection und Arteriotomie, so wie durch Blutigel, die verschiedensten Hautreize u. s. w. häufig zugleich damit in Anwendung gebracht, mit einem Worte die Behandlung so complicirt, dass schwer auszumitteln ist, was denn eigentlich wirklich hülfreich in der Krankheit war.

Ehe wir nun zu der Aufzählung der langen Reihe der in Anwendung gekommenen Mittel übergehen, wollen wir die Wirksamkeit der am allgemeinsten angewandten, nämlich des versüssten Quecksilbers, des Mohnsafts, der Blutentleerungen und der Hautreize einer genaueren Prüfung unterwerfen.

**Das versüsste Quecksilber.** — Es wird von den meisten englischen Aerzten und neuerlich auch von einem Theile der russischen Aerzte ganz vorzugsweise gerühmt; meistens betrachten sie dasselbe als das erste und unerlässlichste Mittel bei der Behandlung der Cholera, obgleich sie seine Wirkung auf die allerverschiedenste Art erklären. Dr. Tytler gab es, wie wir sahen, um das Uebermaass verdorbener Galle wegzuschaffen, Andere, um die ihrer Meinung nach unterdrückte Gallensekretion wieder einzuleiten, wieder Andere wandten es als antiphlogistisches Mittel an, Viele endlich, um die grosse Reizbarkeit des Magens zu beruhigen, denn Johnson behauptet in seinem gepriesenen Werke über die Krankheiten tropischer Länder, Calomel in grossen Dosen sei ein beruhigendes Mittel für den Magen, und was Johnson sagt, gilt den meisten Aerzten in Ostindien als Canon. Wenn man auf die grossen Dosen von Calo-



mel mit Opium Zunahme des Erbrechens beobachtete, was natürlich nicht selten der Fall war, so musste der Grund dieser Verschlimmerung in der Art, wie man das letztere gab, aber durchaus nicht in dem Calomel liegen. Nur selten wurde von dem versüssten Quecksilber ausschliesslich Gebrauch gemacht; Dr. Kinnis soll auf der Morizinsel, wo die Krankheit einen sehr bösartigen Charakter hatte, vom versüssten Quecksilber ganz allein zuweilen einigen Nutzen gesehen haben. Sonst finden sich keine Angaben über einen ausschliesslichen Gebrauch des versüssten Quecksilbers; dagegen wurde es aber auch selten ganz weggelassen und auf die allerverschiedenste Art gereicht. Die Gabe, welche zweckmässig sein soll, variirt nach den Angaben verschiedener Aerzte von einigen Granen bis zu vierzig; die Einen beschränkten sich auf eine einzige Dosis, Andere häuften die Dosen in einer grossen Anzahl auf einander, so dass die Kranken eine halbe Unze und drüber zu verschlucken bekamen. Viele gaben immer Skrupeldosen, Andere gaben nach der ersten Dose das Mittel in absteigender Quantität; wieder Andere stiegen von Anfang mit den Dosen und verminderten sie dann wieder nach und nach. So wurde es im Jahre 1823 im Seehospital zu Astrachan gemacht; man gab allen Kranken das versüsste Quecksilber zuerst zu zehen Gran, stieg dann alle drei Stunden um fünf Gran bis zu dreissig Gran pro dosi, dann verminderte man in gleicher Progression die Gabe und setzte zuletzt ganz aus. Die Verehrer dieses Wundermittels liessen sich durch das so häufig darauf folgende Erbrechen von seinem Gebrauche nicht abschrecken,



sondern sind der Meinung, jede ausgebrochene Gabe müsse sogleich durch eine gleiche, die nicht in Rechnung komme, ersetzt werden. Wallace schlug, um dem Erbrechen vorzubeugen, vor, das Calomel mit Opium in einer Portion Honig zu geben, welches Verfahren denn auch von Andern häufig in solchen Fällen, wo das versüsste Quecksilber immer wieder ausgebrochen wurde, benützt wurde. Sonderbar ist es, wie die Aerzte sich abmühten, den Grund des auf das Einnehmen von versüstem Quecksilber vermehrten Erbrechens aufzufinden. Corbyn empfiehlt Opium in flüssiger Form, weil das feste leicht wieder durch Erbrechen ausgestossen werde; dagegen meint Tytler, man müsse den Mohnsaft in fester Gestalt geben, da die Tinktur in grossen Gaben gereicht, statt die Neigung zum Erbrechen zu vermindern, sie vielmehr steigere. Diesem widerspricht dann wieder Boyle, der aus demselben Grunde den Mohnsaft lieber in Klystieren als innerlich geben will, wie er denn einen Fall erzählt, wo zwei Drachmen Mohnsafttinktur im Klystier alle übeln Erscheinungen hemmten, nachdem der Kranke ohne Verminderung der Reizbarkeit des Magens, in einer Stunde 130 Gran versüsstes Quecksilber und 250 Tropfen Mohnsafttinktur genommen hatte. Es gehört wirklich keine geringe Verblendung dazu, den Grund des vermehrten Erbrechens in der Form, wie das Opium gegeben wurde, zu suchen, statt im Calomel. Allerdings ist bei einer so grossen Reizbarkeit des Magens, wie sie in der Cholera statt findet, Alles, was der Kranke zu sich nimmt, im Stande, augenblicklich durch den mechanischen Eindruck Erbrechen hervorzurufen. Ue-



brings ist auch die dynamische Wirkung des Calomels der Art, dass es bei einem reizbaren Magen leicht Erbrechen hervorrufft; und wenn dies in der Brechruhr nicht immer sich bestätigt, so ist dies eher dem zugleich gegebenen Opium, als den grossen Gaben des Calomels zuzuschreiben. Dass das Opium diese Wirkung, die krampfhaften Zusammenziehungen, die das Erbrechen hervorbringen, zu heben besitzt, ist allgemein bekannt, zeigt sich aber ganz besonders in seiner ausserordentlichen Wirksamkeit in der gewöhnlichen Brechruhr, welche die grössten Aerzte anerkannt haben. Indessen theilen keineswegs alle diejenigen Aerzte, welche das versüsste Quecksilber zur Heilung der Cholera benützt haben, die Ansicht, dass dasselbe den reizbaren Magen zu besänftigen vermöge. Namentlich bemerkt John Henderson, obgleich er das Calomel für das vorzüglichste Mittel erklärt, dass es die Inkonvenienz habe, dass es das Erbrechen und die äusserst grosse Reizbarkeit des Magens vermehre, welches, da es das Einbringen von Arzneimitteln verhindere, das schwierigste von allen Symptomen sei. Eben so sagt William Scot, unbefangene Beobachter haben nicht gefunden, dass das versüsste Quecksilber beruhige, eher wohl das Gegentheil. Jedenfalls sollte man wohl die Behandlung mit solchen Mitteln beginnen, die, statt das fatale Erbrechen zu steigern, vielmehr demselben auf das Kräftigste entgegen wirken; letzteres werden ohne Zweifel wenige deutsche Aerzte vom Calomel erwarten.

Die meisten Aerzte, welche sich des versüssten Quecksilbers gegen die Brechruhr bedient haben,



hatten dabei den Zweck, die Gallensekretion wieder herzustellen. Die Wirkung des Quecksilbers auf die Sekretionsthätigkeit der Leber ist ausser Zweifel, tritt aber nur dann ein, wenn die resorbirenden Gefässe es der allgemeinen Säftemasse zugeführt haben. Dass die Resorptionsthätigkeit in der Cholera sehr darniederliegt, hat man bei dem allgemeinen Leiden des vegetativen Lebens allen Grund zu glauben. Wenn auch die Resorption nicht völlig unterdrückt ist, so ist sie doch höchst wahrscheinlich so unbedeutend, dass auf der Höhe der Krankheit nicht so viel Quecksilber durch die Gefässe aufgenommen wird, dass dadurch eine Wendung der Krankheit herbeigeführt werden könnte. Vielmehr wird der grösste Theil des eingenommenen Quecksilbers entweder als Ballast in den Darmkanal liegen bleiben, oder mit den wässrigen Stoffen durch das Erbrechen und das Abführen wieder ausgespült werden, ohne irgend eine Wirkung hervorgebracht zu haben. Hieraus lässt es sich erklären, wie in manchen Fällen eine so ungeheure Quantität von Quecksilber ohne Schaden gegeben werden konnte. Wenn die Krankheit durch die zugleich gegebenen Mittel gebrochen ist und die Resorptionsthätigkeit wieder kräftiger wird, dann tritt auch die Wirkung des im Darmkanal zurückgebliebenen Quecksilbers ein und gibt sich besonders durch die Antreibung der Gallensekretion zu erkennen; daher viele Aerzte gallige Stuhlentleerungen als eine kritische Erscheinung der Cholera aufführen. Ist die Quantität des im Magen und in den Gedärmen zurückgebliebenen Quecksilbers gross, so kann durch die übermässige Gallensekretion, welche dadurch ein-



geleitet wird, ein künstliches Gallenfieber hervorgebracht werden, dessen Prognose bei der durch die vorhergegangene Krankheit hervorgebrachten Schwäche des Körpers nicht anders als ungünstig ausfallen kann. Ob das von manchen Beobachtern angeführte sekundäre gallige Fieber wirklich auf diese Weise entsteht, wollen wir keineswegs bestimmt entscheiden, gestehen aber, dass wir sehr geneigt sind, dieses anzunehmen. Es findet sich nämlich bei vielen Aerzten, welche ihre Erfahrungen über die morgenländische Brechruhr bekannt gemacht haben, kein Wort über dieses Fieber, und zwar sind diess solche, welche von dem versüssten Quecksilber entweder gar keinen oder nur einen beschränkten Gebrauch gemacht haben, während man dasselbe gerade bei Solchen erwähnt findet, welche die Wirksamkeit des Quecksilbers über Alles erheben und dasselbe am ungemessensten in Anwendung gebracht haben. Man könnte entgegenhalten, dass die Erscheinungen, welche die Uebersättigung des Organismus mit Quecksilber gewöhnlich anzuzeigen pflegen, nach der Cholera nur selten beobachtet werden. Allerdings scheint selten in Folge der mit Quecksilber behandelten Brechruhr Speichelfluss einzutreten. Dabei ist aber wohl zu beachten, dass die Oberbauchgegend der in dieser Krankheit vorzugsweise leidende Theil ist und dass man daraus recht gut sich erklären kann, warum die eigenthümlichen Wirkungen des Quecksilbers sich gerade in der Affektion der Leber, die sonst weniger deutlich hervortritt, zeigen und dagegen die sonst das auffallendste Symptom abgebende vermehrte Speichelsekretion zurücktritt. Letztere Wirkung des Quecksilbers kann



auch desswegen weniger eintreten, weil durch die enormen wässrigen Ausleerungen in der Cholera die Quantität der wässrigen Stoffe im Körper sehr verringert sein muss; dass dieser Umstand von Einfluss ist, bestätigt die Angabe Dr. Rang's, dass nach der Behandlung der Cholera mit Quecksilber ohne Opium oder mit geringeren Gaben des letztern keine Salivation folgte, sondern diese dann am meisten beobachtet wurde, wenn grössere Dosen von Opium zugleich mit dem versüssten Quecksilber in Anwendung gebracht wurden. In letzterem Falle wurden die wässrigen Ausscheidungen des Darmkanals früher beschränkt, und die grössere im Körper zurückgebliebene Quantität wässriger Stoffe war die Bedingung der möglich werdenden Salivation.

John Henderson, der das versüsste Quecksilber für das vorzüglichste Heilmittel in der morgenländischen Brechruhr erklärt, gesteht zu, dass es unter diejenigen Mittel gehöre, welche am langsamsten wirken, während bei einer Krankheit, die so schnelle Fortschritte mache, schon auf einige Minuten sehr viel ankomme. Ferner bemerkt er, dass es von allen Arzneimitteln, welche gegenwärtig in dem Verzeichnisse der Purgirmittel stehen, in Hinsicht seiner Wirkungen das unsicherste sei. Und doch sagt er: »Das Calomel ist gewiss wegen seiner guten Wirkung, die es bloss durch seine purgirende Eigenschaft hervorbringt, das vorzüglichste Mittel, und wenn die purgirende Wirkung desselben fehlschlägt, so wird es gewiss ganz unnütz gefunden.« Wenn es sich, wie Henderson zu glauben scheint, in der Cholera vorzüglich um die Indikation handelt, zu purgiren, so



begreift man nicht, warum er dazu gerade das Calomel nimmt, das er selbst das unsicherste Purgirmittel nennt und von dem er selbst gesteht, dass es langsam wirke, während in dieser Krankheit eine schnelle Einwirkung der Kunst nöthig sei. Es könnte unrecht scheinen, um die Wirksamkeit eines Mittels verdächtig zu machen, eine ungeschickte Anpreisung desselben zum Angriff auf dasselbe zu benützen. Allein die Erfahrungen über das versüsste Quecksilber sind der Art, dass man unmöglich aus denselben ein genügendes Resultat ziehen kann. Die meisten Aerzte geben nur ihre Behandlungsweise an, ohne das Ergebniss derselben genau nachzuweisen, und können vielleicht letzteres für ganz günstig ansehen, wenn es auch gar nicht der Art ist, dass Andere sich damit begnügen würden. Welchen Theil aber das Calomel an den Resultaten der Behandlung hatte, bleibt überdiess noch ungewiss, da fast durchgängig auch andere Mittel zugleich angewendet wurden, die nicht ohne Wirkung sein konnten und vielleicht noch bessere Wirkungen hervorgebracht hätten, wenn sie nicht mit Calomel wären verbunden worden. Unter solchen Umständen kann man sich nicht damit begnügen, die Empfehlungen eines Mittels ohne Weiteres als begründet anzusehen; sondern man muss auch prüfen, ob rationelle Gründe zu seiner Anwendung statt fanden und ob dieselben richtig sind. Ferner ist zu beachten, ob nicht vorgefasste Meinungen die Beobachtungen trübten.

Dass die Erfahrung nicht so ganz glänzend für das Calomel spricht, geht schon daraus hervor, dass manche Aerzte von seiner Anwendung zurückkamen.



So müssen namentlich in der Präsidentschaft Madras die Erfahrungen nicht besonders für die Anwendung des Calomels gesprochen haben, da in dem Berichte des Gesundheitsrathes von Madras der Herausgeber desselben, William Scot sagt: die Erfahrung habe gelehrt, dass das versüsste Quecksilber keinen eigenthümlichen Einfluss auf die Krankheit habe, und diejenigen Aerzte, welche es gar nicht gebrauchten, bei der Behandlung der Brechruhrkranken nicht unglücklicher gewesen seien, als diejenigen, welche Gebrauch davon machten, während sich gegen seine frühzeitige Darreichung triftige Gründe anführen lassen; nur, wenn bereits eine glückliche Veränderung eingetreten sei, und die gewöhnlichen Verrichtungen wieder im Gange seien, soll das versüsste Quecksilber angezeigt sein. Dabei ist nicht zu übersehen, dass der Bericht des Gesundheitsrathes in Madras erst im Jahr 1824 erschien, dass demselben also eine längere Erfahrung zu Grunde liegt, als den Berichten der beiden andern Gesundheitsräthe von Kalkutta und Bombay, in welchen die ausgezeichnete Wirkung des Calomels gerühmt wird. In Russland wurde das Calomel auch häufig in Anwendung gebracht; aber die Stimmen über seine Wirksamkeit sind sehr getheilt. Im Jahre 1823 wurde in Astrachan das Quecksilber in den Hospitälern allgemein angewendet, in der Privatpraxis nur selten; der Erfolg aber scheint in jenen nicht günstiger gewesen zu sein, als in dieser; auch scheinen die meisten dortigen Aerzte dem Calomel nicht besonders hold gewesen zu sein. Dr. Markowsky wollte, als er von der Krankheit befallen wurde, die Calomelpulver nicht nehmen, wie Dr.



Seidlitz ganz lakonisch bemerkt. Dagegen nehmen die Aerzte, welche im Winter 18<sup>29</sup>/<sub>30</sub> im Orenburgischen Gouvernement die Cholera zu beobachten Gelegenheit hatten, das Calomel in Schutz. Man gebrauchte es daselbst neben dem Aderlasse sehr allgemein. Pupurew gesteht, dass er es nicht über 15 Gran pro dosi zu geben wagte; hingegen versichert Granbaum, dass er und andere Aerzte durch Erfahrung kühner gemacht es zu einem Skrupel und mehr 5 bis 8 mal nach einander in verschiedenen Intervallen gegeben und hiervon die erwünschtesten Wirkungen beobachtet haben. Grosse und seltene Gaben sollen nach ihren Erfahrungen am heilsamsten sein. Nicht zu übersehen ist es jedoch, dass in Orenburg neben dem Calomel nicht blos Aderlässe, sondern auch innerlich verschiedene Reizmittel und äusserlich die kräftigsten Hautreize gewöhnlich in Anwendung kamen. Ein ungenannter Moskauer Arzt sagt: »Versüsstes Quecksilber ist das allerschädlichste Mittel und sollte untersagt werden.« (Magazin der ausländ. Litter. der gesammten Heilk. Bd. XXI. S. 58.) Dr. v. Hübenthal, der die Brechruhr an der persischen Gränze beobachtete, bemerkt in seiner »Darstellung und Behandlung der orientalischen Cholera« (Hufeland's und Osann's Journ. der prakt. Heilk. 1831. Januarheft. S. 88 bis 103) über den Gebrauch des Quecksilbers: »Die ungeheuren Gaben von Calomel einiger englischen Aerzte habe ich aus leicht zu erachtenden Gründen nicht versucht; und da, wo ich dieses Mittel von Andern anwenden sah, schien es mir immer, als ob dadurch die krampfhaften Erschei-



nungen vermehrt, das Uebel selbst aber nie vermindert oder geheilt wurde.»

Eben so ungünstig spricht sich Professor Dr. H. Blumenthal in seinem »flüchtigen Schattenriss der sogenannten Cholera indica, wie sie im Jahre 1830 in der östlichen Hälfte des europäischen Russlands epidemisch herrschte,« (Rust's Magazin für die gesammte Heilk. Bd. XXXIII. S. 554 bis 581) über das Calomel aus: »Die englischen Aerzte haben in dieser Krankheit bekanntlich das Opium und Calomel in grossen Gaben empfohlen, und diese Mittel sind auch von der Mehrzahl der russischen Aerzte bona fide auf jenen Rath angewandt worden; ob mit vielem Nutzen, daran möchte ich zweifeln, wenn ich gleich manche Aerzte sich rühmen hörte, mit Calomel Wunderkuren vollbracht zu haben. Ich habe dieses Mittel selbst nicht angewandt, (denn für die Anwendung desselben in kleinen Gaben fand ich nie die mindeste rationelle Indikation, auch ward es, wie ich bei Andern gesehen habe, hier immer wieder weggebrochen, und in Gaben zu 15 bis 20 Gran, wie jene Aerzte rathen, habe ich nie gewagt, es anzuwenden); aber ich war einigemal Zeuge, als es von Andern in ungeheuern Gaben gereicht wurde. Die Ausleerungen nach oben und unten wurden schnell gestopft; der ganze Organismus gerieth in eine furchtbare Reaktion, die Kranken warfen sich unruhig hin und her, ihre Angst stieg mit jedem Augenblick, das Auge irrte wild umher, der ganze Leib fing an zu zittern, bis endlich im glücklichen Falle ein allgemeiner Schweiss ausbrach und der Patient von dieser epidemischen Krankheit gerettet war. (Sollten diese Erscheinungen nicht durch



das ohne Zweifel zugleich in grossen Gaben gegebene Opium hervorgebracht worden sein?) Hier wirkt das Calomel offenbar als ein Contrastimulus, und die vorhandengewesene Krankheit wird durch eine neuerregte überwunden. Aber ich sah auch Kranke, deren Zustand noch viel Hoffnung zur Genesung versprach, nach der Darreichung des Calomels in furchtbare Konvulsionen mit Zähneknirschen verfallen und in diesen sterben. Ich sah Andere, die durch diese Methode zwar dem epidemischen Uebel entrissen wurden, — in ein langwieriges Siechthum übergehen, und ward so in der Ueberzeugung immer mehr bestärkt, dass das Calomel hier ein verwerfliches Mittel sey, das für den wenigen Nutzen, den es in einzelnen Fällen gewährt, in der Mehrzahl derselben einen überwiegenden Schaden stiftet.»

Die vielerlei Gründe, welche für den Gebrauch des Calomels angegeben werden, sind ein Beweis, dass man über sein Indicirtsein nicht ganz im Klaren war. Der Meinung Johnson's, dass grosse Gaben dieses Mittels die Reizbarkeit des Magens haben, wird wohl in Deutschland Niemand beipflichten. Dass das Calomel nicht als antiphlogistisches Mittel in Anwendung kam, wie Einige meinen, wird schon durch den gleichzeitigen Gebrauch von den reizendsten Mitteln, der fast immer statt fand, widerlegt. Am allgemeinsten aber ist die Ansicht, man müsse die unterdrückte Gallensekretion herstellen. Zugegeben, die Gallensekretion sei unterdrückt, was durch den Mangel von Galle in den ausgeleerten Stoffen keineswegs erwiesen ist, wogegen vielmehr spricht, dass in den Lei-



chen die Gallenblase gewöhnlich gefüllt, ja überfüllt angetroffen wurde, so ist diese Unterdrückung der Sekretion aller Wahrscheinlichkeit nach entweder Folge des krampfhaften Zustandes, der den Darmkanal befallen hat und sich wohl auf die Gallengefäße erstrecken könnte, oder die Folge einer allgemeinen Schwäche des vegetativen Lebens, dem ein Leiden des Gangliennervensystems zu Grund liegt, und eine rationelle Behandlung wird also darauf hinarbeiten müssen, durch Regulirung der Thätigkeit der Nerven die Ausscheidung der Galle indirekt wieder herzustellen, anstatt sie direkt durch Mittel, welche auf die Leber wirken, einleiten zu wollen.

Darüber, dass in Ostindien bei der Behandlung dieser Krankheit gleich zu dem Calomel gegriffen wurde, darf man sich nicht wundern, indem dasselbe in neueren Zeiten als eine Art Universalmittel in den Krankheiten jenes Landes betrachtet wird, und daselbst unter den Aerzten eine eigentliche Sucht, mit Quecksilber zu kuriren, herrscht, die nicht unbeachtet gelassen werden darf, wenn man die Empfehlungen dieses Mittels gegen die morgenländische Brechruhr einer ruhigen Prüfung unterwerfen will.

Der Ursprung der Mode, mit Quecksilber zu kuriren, datirt sich aus den ersten Jahren des gegenwärtigen Jahrhunderts, zu welcher Zeit sie in Bengalen begann. Sie war anfangs gutartig und nicht sehr verbreitet, bis Johnson in seinem übrigens in vielen Beziehungen schätzbaren Werke: *Essay on the Influence of tropical climates, more especially the climate of India on european constitutions etc.* (erste Ausgabe, London, 1813) ihr zu einer allgemeinen



Herrschaft verhalf, die übrigens in neuester Zeit wieder in der Abnahme begriffen ist. Das Johnsohn'sche Werk, das nach dem Urtheile unparteiischer und sachkundiger Richter manches Schätzbare, aber auch viele ungegründete, verkehrt vorgetragene und für die Praxis höchst nachtheilige Lehrsätze enthält, gilt durch ganz Ostindien für ein untrügliches medicinisches Orakel und gab die hauptsächlichste Veranlassung zu dem unverantwortlichen Missbrauch des Calomels. Dieser Missbrauch geht so weit, dass nicht nur unwissende Aerzte dasselbe als Universalmittel gegen die meisten, ja beinahe alle Krankheiten ohne Unterschied, und zwar in den fürchterlichsten Gaben anwenden, sondern dass selbst Laien, vornämlich unter den Engländern, dasselbe als Hausmittel ohne ärztliche Vorschrift gegen jegliche Unpässlichkeit einnehmen. Einfach um zu laxiren nehmen Manche Calomel auf Butterbrod herumgestreut. Die Sucht der Anhänger Johnson's geht oft so weit, dass sie alle andere Heilmittel verwerfen oder als unwichtig betrachten und sich unter einander den Ruhm streitig machen, wer von ihnen je die grösste Dosis Quecksilber vorgeschrieben habe, und diese Modekrankheit hat einen solchen Schlendrian bei vielen Aerzten herbeigeführt, dass sie das Quecksilber ohne diagnostische Unterscheidung gegen alle möglichen Krankheiten anwenden. Es ist zwar nicht zu läugnen, dass das Quecksilber in warmen Klimaten weniger nachtheilige Folgen hat; aber bei der übertriebenen Anwendung desselben, wie sie in Ostindien gäng und gebe ist, kann es doch nicht anders sein, als dass durch die blinden Anhänger dieser Mode eben so



viele Menschen gemordet als gerettet werden. Wer sich über diesen Unfug genau unterrichten will, der lese den Aufsatz: Kurze Schilderung der Hydragryomanie und Haematomanie unter den Aerzten in Ostindien von Dr. F. A. C. Waitz, Stadtarzt und Geburtshelfer in Samarang; in Horn's, Nasse's und Wagner's Archiv für medicinische Erfahrung. Jahrg. 1830. Mai, Juni. S. 507 bis 566.

Bemerkenswerth ist es, dass Johnson mit seinen Lehren zu einer Zeit auftrat, wo der entzündliche Krankheitscharakter sich (in Europa) ausgebildet hatte. Das Glück, welches dieselbe machte, scheint dafür zu sprechen, dass dieser damals auch in Ostindien herrschte. Johnson kurirte Krankheiten mit Quecksilber, die früher mit tonischen Mitteln behandelt worden waren, beides mit Glück, weil die Krankheiten das eine Mal mit Entzündung complicirt waren, das andere Mal nicht. Er tadelt die Kurmethode seiner Vorgänger, Clarke und Lind, welche die Chinarinde mit gutem Erfolg gegen das Bengalische Fieber anwandten, und nennt sie einen Fehlgriff, weil er Blutentleerungen und Quecksilber von Nutzen fand. Dabei übersieht er, dass Clarke und Lind in ihrer Beschreibung des bengalischen Fiebers Nichts von Delirien und Schmerzen in der Oberbauchgegend erwähnen, Symptome, die zu seiner Zeit jedes Mal dieses Fieber begleiteten und die Anwesenheit einer Hepatitis sehr wahrscheinlich machten.

Dass die Johnson'sche Behandlung in der Leberentzündung, der Ruhr und dem bengalischen Fieber, welche letztere Krankheiten nicht selten mit der ersten complicirt sind, zu der Zeit, als sie in Aufnahme



kam, im Allgemeinen wirklich durch einen glücklichen Erfolg sich empfahl, kann man nicht in Zweifel ziehen; sie hätte sonst nicht so allgemein in Gebrauch kommen können. Auch führt Johnson Thatsachen an, die sehr günstig für die Behandlung sprechen, namentlich in der Ruhr, in welcher er dieselbe an sich selbst erprobte. Dass aber die Johnson'schen Lehren sehr einseitig sind und auch seine Nachahmer diese Einseitigkeit, vielleicht nur in noch höherem Grade theilen, muss jedem Unparteiischen, der dieselben einer gründlichen Prüfung unterwirft, einleuchten. Schon die ganz gleichförmige Behandlung einer ziemlichen Anzahl von Krankheiten muss den Verdacht erregen, dass dieselbe zu allgemein angewendet wurde und dass zu wenig dabei individualisirt wurde. Ebenso sind die grossen Gaben von Calomel anstössig; Johnson selbst gesteht, öfters davon üble Wirkungen gesehen zu haben, die sich mit seiner Behauptung, das Calomel beruhige den Magen, nicht vereinigen liessen; er schreibt dieses aber seiner Vermuthung nach stattgefundenen Erkältungen zu. Wie er zu jener Behauptung kam, wäre nicht zu begreifen, wenn er seine Skrupeldosen von Calomel nicht stets mit Opium gegeben hätte. Man sieht aber eben hieraus, wie sehr er in Befangenheit war, indem er eine Wirkung, die offenbar dem Opium zuzuschreiben ist, das er immer als Corrigens beisetzte, dem Calomel beilegt. Unparteiische Aerzte, welche die Johnson'schen Lehren an Ort und Stelle prüfen konnten, haben ihre Einseitigkeit dargethan und gezeigt, dass man mit geringeren Dosen von Quecksilber sicherer zu dem erwünschten Ziele kommen könne.



Beachtet man diese Befangenheit der Johnsonianer, so muss man gegen ihre Erfahrungen in Beziehung auf die Behandlung der Cholera auf der Hut sein; und ohne desshalb ungerecht zu sein, wird man ihre Anpreisungen des Calomels nicht hoch anschlagen dürfen. Wir wollen damit keineswegs das Calomel ganz aus der Behandlung der Cholera verbannen, aber aufmerksam machen, dass seine Wirksamkeit erst noch durch Erfahrungen nachzuweisen ist, die mit vorurtheilsfreierem Sinne gemacht werden.

Besondere Erwähnung verdient noch die Ansicht James Annesley's über die Anwendung des versüssten Quecksilbers in der morgenländischen Brechruhr. »Da man bei den Sektionen, sagt er, die Gedärme mit einer rahmfarbigen, dicken, klebrigen und zähen Masse angefüllt findet, welche altem Rahmkäse höchst ähnlich ist, und da diese Masse ohne Ausnahme bei allen an der epidemischen Cholera Gestorbenen gefunden wurde, so kann man wohl mit Recht schliessen, dass sie in geringerer Menge auch bei Allen, welche genasen, vorhanden gewesen ist; es muss daher unser Hauptbestreben sein, sie zu entfernen. Indessen scheinen abführende Mittel auf diese Masse anfangs nicht zu wirken, denn es erfolgen nur wässrige Ausleerungen darnach; so lange diess dauert, können wir überzeugt sein, dass der Zustand noch nicht gut ist, wenn auch die Ausleerungen kopiös sind und von selbst erfolgen. Man muss die Beschaffenheit der ausgeleerten Masse immer gehörig untersuchen; so lange als nicht die eben beschriebene Masse abgeht, darf man sich nicht einbilden, in der Kur grosse Fortschritte gemacht zu haben. Calomel



skrupelweise gegeben, fand ich immer am zweckmässigsten, um dieses eigenthümliche Secretum zu entfernen. Zuweilen verband ich das Calomel mit Aloë\*) und liess es alle Abend und Morgen nehmen, bis der Stuhlgang schwärzlich grau, konsistent und zähe wurde. Alsdann wurden abführende Mixturen und Klystiere gegeben, und zwar mit dem besten Erfolge. Diese Kurmethode wurde täglich befolgt, mit Blutigeln, Blasenpflastern u. s. w. den Umständen gemäss. Nach ein bis zwei Tagen fand ich gewöhnlich, dass der Stuhlgang dunkelgrün wurde, und diess deutete immer den Anfang einer heilsamen Einwirkung an. Indessen wurde mit den abführenden Mitteln und dem Calomel doch noch 5 bis 6 Tage länger fortgefahren, bis der Stuhlgang natürlicher und in dem ganzen Habitus des Kranken eine merkliche Besserung sichtbar wurde. Alsdann wurden, nach Umständen 1 bis 2 Monate lang alterirende Mittel gegeben. Diess ist durchaus nöthig, einen Rückfall zu verhüten.» —

»Mein Hauptzweck (bei der Behandlung der Cholera), bemerkt Annesley weiter, war, die Symptome von Kongestion zu bekämpfen und die Ausleerung der klebrigen zähen Masse aus den Gedärmen zu bewirken; ersteres geschah durch Blutentziehung, sowohl allgemeine als örtliche, durch Antispasmodica, Aether, Ammonium und Kampher, verbunden mit äusserlichen Reizmitteln; letzteres geschah durch Calomel

---

\*) Es ist nicht überflüssig, hierbei darauf aufmerksam zu machen, dass Annesley im Anfang der Krankheit seinen Skrupeldosen von versüßtem Quecksilber immer Mohnsaft (2 Gran pro dosi) beifügte.



mit Aloë. Die Drogue amère \*) schien mir oft sehr gut zu thun, und allerdings lässt sich auch denken, dass die Gummata, aus welchen sie besteht, die Wirkung des Calomels unterstützen und zur Entfernung der klebrigen und zähen Masse aus den Gedärmen beitragen; ich gab sie desshalb oft neben dem Calomel zu einer halben bis ganzen Unze in Verbindung mit der Kamphermixtur \*\*); der Erfolg, so wie auch die Sektionsbefunde schienen dafür zu sprechen, denn in einigen Fällen fand ich, dass die klebrige Masse halb im Ileum hinuntergeführt und der obere Theil des Darmkanals ganz davon frei war. Da die Anhäufung dieser Masse so beträchtlich ist, da sie in allen Fällen von Cholera vorkömmt, und da es so schwer ist, sie zu entfernen, so glaube ich, dass die Rückfälle häufig dadurch entstehen, dass sie sich noch in den Gedärmen befindet, selbst nachdem die Circulation wieder hergestellt ist. Ich betrachte daher auch die Ausleerung dieser Masse als einen Hauptgegenstand der Behandlung; denn so lange als die Gedärme mit einem solchen klebrigen

---

\*) Die Zusammensetzung der Drogue amère giebt Annesley folgendermaassen an:

R. Aloës Socotr. libr. unam,

Gumm. Myrrh.

— Mastich.

— Benzoës

Rad. Columbo ana uncias octo,

Croci Angelic. (?)

Rad. Gentian. ana uncias quatuor,

Eau de vie libras triginta sex,

Genèvre (Wachholderbeerengeist?) libras duodecim.

M.

Diese Mischung muss vierzig Tage lang stehen und dann vor dem Gebrauche durch Papier filtrirt werden.

\*\*) Die Mixtura Camphorae wird bereitet, indem man eine halbe Drachme Kampher mit einer Pinte Wasser abreibt.



Stoffe ausgekleidet sind, kann die Arznei nicht auf dieselben wirken, und die Krankheit wird also dadurch in die Länge gezogen. Da ich fand, dass selbst nach Beseitigung der Symptome von Kongestion die Heilung nur wenig fortschritt, bis schwärzlich graue, und späterhin dunkel grüne, klebrige Massen ausgeleert wurden, so war ich begierig zu sehen, wie sich die Sekrete des Magens und der Gedärme verhalten würden, wenn sie mit den verschiedenen in der Cholera gebräuchlichen Mitteln in Berührung kommen. In dieser Absicht nahm ich eine beträchtliche Menge dieser Masse aus den Gedärmen eines an der Cholera Gestorbenen heraus, in einem Falle, wo sie sehr reichlich vorhanden war, und stellte in Gegenwart mehrerer Männer von Fach, welche mit mir das Hospital (zu Malras) besorgten, mit grosser Geduld allerlei Versuche an, die ich mir vorher ausgedacht hatte. Folgendes waren die Resultate:

Das Secretum selbst war koncentrirt und sah rahmartig oder graulich gelb aus, wie gutartiger Eiter. Wenn es mit Alkohol vermischt wurde, so bildeten sich eine Menge koagulirter, von einander abgesonderter, sehr feiner Klümpchen; die Farbe blieb unverändert, oder sie wurde mehr ocherartig.

Ammonium, Aether und Kampher brachten durchaus keine Veränderung hervor.

Verdünnte Salpetersäure verursachte einen Niederschlag von feinen Flocken; Weinsteinsäure, in einer ziemlich starken Auflösung lösete sie vollständig auf und machte sie ganz flüssig.

Gallenblasengalle lösete die Masse merklich auf,



und die Mischung bekam eine Farbe, die zwischen beiden Farben in der Mitte stand.

Calomel, in geringerer Menge hinzugemischt, brachte eine dunkle, grünlich graue Farbe hervor, so dass die Masse ganz so aussah, wie die mehr erwähnten dunkel grauen Stuhlausleerungen; auch schien es die Masse etwas aufzulösen.

Calomel und Gallenblasengalle verbunden brachten eine dunkel grüne Farbe hervor und machten die Masse flüssiger.

Diese Versuche wurden nachher, so oft sich eine Gelegenheit darbot, wiederholt, jedoch ohne die secernirte Masse aus den Gedärmen herauszunehmen, und das Resultat war jedesmal dasselbe. Ich schliesse daher aus diesen Beobachtungen Folgendes:

1) Weinsteinsäure ist am passendsten zum Getränk, weil sie die Masse auflöst.

2) Das Calomel verbindet sich mit dieser klebrigen Masse, löset sie ab und bewirkt jene schwarzen, grauen Stuhlausleerungen, welche dem Anfange der Besserung vorangehen, zu welchen aber die Galle Nichts beiträgt, und welchen auch keine Galle beige-mischt ist.

3) Die grünen Stuhlausleerungen, welche auf die vorigen folgen werden dadurch veranlasst, dass sich Gallenblasengalle und Calomel mit dieser Masse verbinden.

Diese Versuche haben über die Behandlung der Cholera ein ganz neues Licht verbreitet, und in allen Fällen, welche ich nachher zu behandeln hatte, richtete ich mich nach den dadurch festgestellten Principien. Limonade wurde als gewöhnliches Getränk gereicht



und war den Kranken immer ganz besonders angenehm. Calomel in grossen Dosen, skrupelweise, und mit der Drogue amère verbunden, wurde dreist und zuversichtlich öfters wiederholt; wenn dann die Symptome von Kongestion einmal beseitigt und die Circulation wiederhergestellt war, so konnte man ruhig eine einfache Nachbehandlung folgen lassen. Wenn ich dunkelgraue Stuhlausleerungen erfolgen sah, so wusste ich, dass das Calomel gehörig wirkte, und wenn sie eine grüne Farbe bekamen, so war ich überzeugt, dass die Gallengänge sich entleerten, dass die Galle angefangen hatte zu fliessen, und dass Alles auf gutem Wege war.»

Diese interessanten Untersuchungen James Annesley's sprechen allerdings dafür, dass das versüsste Quecksilber ein bei der Behandlung der morgenländischen Brechruhr nicht zu vernachlässigendes Mittel ist, erweisen aber seine Nothwendigkeit im ersten und zweiten Stadium der Krankheit nicht; und es möchte nach allem Obigen die Anwendung desselben auf das dritte Stadium zu beschränken sein, wie diess schon von William Scot angenommen wurde.

Der Mohnsaft — ist bekanntlich von alten Zeiten her als eines der wirksamsten Heilmittel in der Brechruhr betrachtet worden. Schon Serapion und Heraklides von Tarent empfahlen ihn, und auch die grössten Aerzte neuerer Zeit loben seine ausgezeichnete Wirksamkeit, wiewohl sich auch immer Stimmen gegen seine Anwendung hören liessen; doch scheint es, dass sich diese mehr auf theoretische Ansichten, als auf die Erfahrung stützten. Da man die scharfgewordene und auf den Darmkanal schädlich einwir-



kende Galle als den Grund der Krankheit anzusehen gewohnt war, musste man in der Theorie mehr für ausleerende Mittel sein; allein in der Praxis behauptete doch der Mohnsaft so sehr den Sieg, dass manche Aerzte dadurch veranlasst wurden, jene Ansicht über die Entstehung der Krankheit in Zweifel zu ziehen, wie sich denn namentlich Peter Frank jener Ansicht sehr bestimmt entgegensetzt und das Opium als das vorzüglichste Mittel in der Brechruhr anpreist, ebenso auch Berends.

Am bestimmtesten spricht sich J. Quarin für die ungesäumte Anwendung des Opiums aus; er sagt: »Plurimi initio morbi jusculum pulli tenue ad mentem Sydenhami largiter potandum jubent, ut acrimonia hoc modo eludatur; ego centum et amplius aegros cholera affectos tractavi, in quibus vix elapsis aliquot ab accessu aegritudinis horis debilitatem summam, oculos caliginosos et pulsum inveni vix sub sensus cadentem; itaque mox ad opium confugiendum est. Nunquam me hujus methodi poenituit, etsi Joung asserat, frequentius nocere opium, nisi acre vomitu ante expulsum sit.« So günstig äussert sich Quarin für den Gebrauch des Opiums, ungeachtet er eine zu reichliche Absonderung von scharfer Galle als die gewöhnliche Ursache der Krankheit ansieht.

Auch Sydenham lobt das Opium sehr, doch liess er vor seiner Anwendung einige Stunden verstreichen, während welcher Zeit er die Ausleerungen durch Darreichung von Hühnerbrühe unterstützte und Klystiere mit derselben Flüssigkeit setzen liess. Kam er zu den Kranken, nachdem die Krankheit schon längere Zeit gedauert hatte, so nahm er gleich zu der



»sacra hujus morbi ancora,» wie er das Laudanum nennt, seine Zuflucht. Er hatte bei den vielen Brechruhrfällen, die ihm in den Jahren 1669 und 1676 zu London vorkamen und deren Schilderung wir oben (S. 215) mitgetheilt haben, viele Gelegenheit, die Wirksamkeit seiner Behandlungsmethode zu erproben.

Ebenso spricht sich S. G. Vogel sehr günstig über das Opium aus und stimmt überhaupt im Ganzen mit Sydenham überein. Auch er empfiehlt anfangs laue Getränke und lässt dann zum Opium übergehen. In heftigen Fällen, sagt er, müsse sogleich dazu geschritten werden. »Sind gleich anfangs die Ausleerungen, sie mögen beschaffen sein, wie sie wollen, so heftig und angreifend, dass von ihrer Enormität das Schlimmste zu befürchten und mithin zu ihrer Stillung kein Augenblick Zeit zu verlieren ist, so muss sofort mit Nachdruck zu diesem Zwecke das Möglichste veranstaltet werden; und das ist gewöhnlich der Fall mit jeder ächten Cholera.«

De Haën beklagt die Uneinigkeit der Aerzte in Betreff der schnellen Anwendung des Opiums in einer Krankheit, die dem Menschen oft binnen einer Viertelstunde alle Kräfte raube.

Wenn in der gewöhnlichen Brechruhr die öfters stattfindende scharfe Beschaffenheit der ausgeleerten Stoffe im Anfang der Krankheit von der ungesäumten Anwendung des Mohnsafts abhalten kann, so findet diese Rücksicht auf keinen Fall in der morgenländischen Brechruhr statt, und man begreift nicht, warum man nicht allgemeiner von dem Opium als Hauptmittel Gebrauch gemacht hat, um so mehr da die engli-



schen Aerzte die morgenländische Brechruhr als *Cholera spasmodica* der gewöhnlichen als *Cholera biliosa* entgegengestellt haben. Allein die britisch-ostindischen Aerzte fanden es bequemer, in ihrem Quecksilberschlendrian zu beharren, und so sind die Erfahrungen über die Wirkungen des Opiums in der Brechruhr noch nicht sehr zahlreich. Die Fälle, wo dasselbe gemeinschaftlich mit Calomel gebraucht wurde, können weder für noch gegen seine Wirksamkeit sprechen, da seine Wirkung durch diese Verbindung sehr bedeutend modificirt werden musste.

Das Opium bekämpft, wie man bei der gewöhnlichen Brechruhr sieht, am kräftigsten die Ausleerungen, die zwar nicht der erste Grund des Collapsus sind, aber doch bei ihrer oft so enormen Quantität die Kräfte noch mehr herabstimmen müssen, wesshalb diese Ausleerungen um jeden Preis schnell zu stillen sind. Zweitens empfiehlt sich das Opium durch seine ausgezeichnete diaphoretische Wirkung; alle Beobachter stimmen darin überein, dass ein warmer Schweiss eine sehr günstige Erscheinung in der Cholera sei und die gegründetste Hoffnung zur Herstellung gebe. Einen Schweiss bewirkt unstreitig das Opium viel eher als das Calomel, obgleich letzteres nach Johnson auch schweisstreibend wirken soll, diess aber nur aus dem Grunde, weil nach ihm eine *Sympathia cutaneohepatica* besteht, vermöge der ein beständiges Gleichgewicht der Haut- und Leberthätigkeit statffinde; hätte es damit seine Richtigkeit, so müssten schweisstreibende Mittel immer auch vermehrte Sekretion der Leber bewirken, und Mittel, welche die Gallensekretion antreiben, zugleich auch Diapho-



retica sein. Demnach könnte man an die Stelle des Calomels eben so gut jedes schweisstreibende Mittel setzen; eine Behauptung, welche noch Niemand aufzustellen in den Sinn gekommen ist und die auch Johnson selbst schwerlich vertheidigen möchte.

Eine dritte Wirkung des Opiums, welche es ganz vorzüglich für die Cholera passend macht, ist seine krampfstillende. Sowohl die örtlichen Krämpfe im Darmkanal als die allgemeinen, erfordern krampfstillende Mittel; und der hohe Grad, in welchem sie gewöhnlich auftreten, muss auch dazu bestimmen, zu dem kräftigsten krampfstillenden Mittel zu greifen. Endlich erhöht auch der Mohnsaft die Thätigkeit des Gefässsystems, die in der Brechruhr so tief gesunken ist.

Ein Uebelstand bei der Anwendung des Opiums ist es, dass durch dasselbe leicht Kongestionen gegen den Kopf entstehen. Die Affektion des Gehirns in der Cholera ist, so weit sich aus den bisherigen Beobachtungen schliessen lässt, allerdings keine der Krankheit wesentlich zukommende Erscheinung, scheint aber in manchen Fällen doch so bedeutend zu sein, dass die Anwendung des Opiums schädlich werden muss; und die nähere Bestimmung seiner Indikation ist desshalb sehr wünschenswerth. Nie aber sollte man sich aus dem angegebenen Grunde auf das Opium allein verlassen (vielleicht den ersten Anfang der Krankheit ausgenommen); immer sollten zugleich kräftige Hautreize angewendet werden, um die schweisstreibende Wirkung desselben zu unterstützen; denn wenn sich diese Wirkung zeigt, hat man wohl von den ungünstigen Nebenwirkungen des Opiums wenig



oder nichts mehr zu fürchten. Mit dem Eintreten des Schweisses ist nothwendig eine gleichförmigere Vertheilung der Blutmasse verbunden und damit eine Sistirung oder wenigstens Verminderung der Congestionen gegen einzelne Theile. Ebenso wird auch das Aderlassen als ein wichtiges Corrigen des Mohnsafts zu betrachten sein.

Wenn gleich die Theorie und die Erfahrungen bei der gewöhnlichen Brechrühr sehr günstig für die Anwendung des Mohnsafts in der morgenländischen Cholera sprechen, so ist doch sein Nutzen in der letztern durch die Erfahrung noch nicht genügend erwiesen. Da in Ostindien die meisten Aerzte der Johnson'schen Behandlungsweise anhiengen, so wurde das Opium nur selten als Hauptmittel in Anwendung gebracht. Doch fanden sich auch Aerzte, welche demselben am meisten Vertrauen schenkten; so James Ranken, der in dieser Beziehung sagt: »Bei der Behandlung der Cholera sind die stärksten Reizmittel indicirt, und von diesen ist die Opiumtinktur vielleicht das zweckmässigste. Werden bei dem ersten Anfall vom Vomiren hundert Tropfen genommen, so macht sich eine zweite Dosis häufig unnöthig. Ich pflegte gemeiniglich die Dosis so oft zu wiederholen, bis sie im Magen blieb. War diess der Fall und liessen die beunruhigenden Symptome nicht nach, so habe ich die hundert Tropfen in einer Stunde wohl dreimal gereicht und zuletzt einen glücklichen Erfolg erhalten. Kleine Gaben bewirkten denselben nie.« Dabei empfiehlt er zugleich Wein, in geringen Quantitäten, die aber oft wiederholt werden dürfen, und Warmhalten des Kranken.



Obgleich John Henderson das Calomel über alle andern Mittel erhebt, so lässt er doch auch dem Opium Gerechtigkeit widerfahren; und es verdient alle Beachtung, was er darüber sagt: »Laudanum und stimularende Mittel stehen dem Calomel sehr nach, doch sind sie zum Theil nützlich gewesen, da sie beide das gehörige Gleichgewicht im Körper wiederherstellen, die spasmodische Thätigkeit entfernen und der natürlichen Thätigkeit der Gedärme gestatten, den Stoff nach unten fortzutreiben. Während das Laudanum die Reizbarkeit vermindert, unterdrückt es auch das Erbrechen; jedoch ist es von wenigem Erfolg, wenn es nicht gleich im ersten Stadium der Krankheit gegeben wird.«

William Scot spricht sich gleichfalls günstig über das Opium aus: »Unter allen gegen die gastrische Reizung und die krampfhaften Erscheinungen angewendeten Mittel steht der Mohnsaft oben an, dessen Wirkungen in einer frühen Periode der Krankheit entschieden hülfreich gewesen sind, besonders bei den Eingebornen, wo die Krankheit selten Komplikationen zeigt, schwerer lässt sich die geeignete Dosis dieses Mittels bestimmen. Achtzig bis hundert Tropfen der Tinktur oder zwei bis vier Gran in Substanz, war die gewöhnlichste Gabe, so dass man es anfangs in flüssiger und später in Pillenform anwendete. Besonders eignen sich diejenigen Fälle für seinen Gebrauch, in welchen der Magen und Darmkanal vorzugsweise afficirt sind, was sich durch Erbrechen, Schmerz im Epigastrium oder Durchfall zu erkennen gibt. Es ist aber keineswegs als ein specifisches Mittel gegen die Cholera zu betrachten.«



Bei den Eingebornen in Ostindien scheint sich das Opium als das beste Mittel gegen die Cholera erprobt zu haben. Dr. Vos sagt in dieser Beziehung: »Bei den Eingebornen wies sich als das sicherste und passendste Hülfsmittel die möglichst schleunige Anwendung des Opium nach, sobald sich nur die ersten Symptome der Cholera gezeigt hatten, nachher purgirende Mittel. Unmittelbar nachdem die Krankheit sich als epidemisch zeigte, wurde vom englischen Gouvernement allen Obrigkeiten durch ganz Bengalen befohlen, inländische Aerzte auf Kosten der Regierung in Dienst zu nehmen und mit allen nöthigen Heilmitteln zu versehen, um Jedermann ohne Unterschied aufs Schnellste zu Hülfe zu eilen. Es ist unmöglich, die Zahl derjenigen zu bestimmen, welchen diese Maassregel das Leben erhalten hat; allein in Kalkutta sind von den 35796 Menschen, welche durch eingeborne Aerzte behandelt wurden, nur 2308 gestorben.« Es ist zu bedauern, dass Vos anzugeben unterlässt, welche Behandlungsmethode diese inländischen Aerzte angewendet haben; indessen da er von diesem glücklichen Resultat der Behandlung so unmittelbar auf die Empfehlung des Mohnsafts spricht, so ist mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass dieser die Hauptrolle bei der Behandlung spielte.

Dr. William Steuart Anderson rühmt die Wirkungen des Mohnsafts; nach ihm zeigte sich derselbe in Gaben von 3 bis zu 5 Gran, oder auch 60 bis 80 Tropfen Laudanum sehr wirksam (in Verbindung mit Blutentleerungen und Bädern); wenn er ausgebrochen wird, soll man ihn in Klystieren zu 10 Gran beibringen. Nachdem durch dreiste Gaben von



Opium die Nervenreizung beruhigt, die Schmerzen und Krämpfe gemildert und die Gefässthätigkeit gehoben ist, soll man durch gelinde ölige oder salzige Mixturen Stuhlgang wieder zu erwecken suchen. Dabei ist zu beachten, dass Anderson ausdrücklich bemerkt, das Hirn bleibe in der Cholera bis zum letzten Augenblicke frei. Dem Calomel ist er nicht hold. Nach Dr. Thomas Mifflin Hall endete die Brechruhr in den Jahren 1817 und 1818 in Bengalen meistens unglücklich, wenn nicht Opiumtinktur in den grössten Dosen, Branntwein, Aether u. s. w. innerlich gegeben und die äusserliche Anwendung von Senf, Spiritus und Friktionen bald Einhalt thaten. Bei der Brechruhr, welche im December 1827 und Januar 1828 in dem Distrikte von Ballyhackamore vorkam, fand R. M. Kittrick den Mohnsaft in grossen Gaben sehr wirksam \*).

Nach der Angabe niederländischer Zeitungen liess auf der Insel Java die Regierung eine Arznei aus Laudanum, Pfeffermünzöl und Branntwein austheilen, welche mit grossem Nutzen gebraucht wurde. Ebenso wurde nach Fraser in Persien gewöhnlich eine Mischung von Laudanum und Branntwein angewendet.

In Astrachan sahen im Jahre 1823 mehrere Aerzte von der Anwendung des Opiums in Verbindung mit

---

\*) Mit Unrecht wird Dr. W. Robson von Julius (Magazin der ausländ. Litter. der ges. Heilk. Bd. VII. S. 400) und Schnurrer (die Cholera morbus etc. S. 52) unter diejenigen Aerzte gezählt, welche vorzugsweise den Mohnsaft rühmen. Er empfiehlt vielmehr Pillen aus einem Skrupel Calomel und einem Gran Opiumextrakt, alle zwei Stunden, und in bösen Fällen die doppelte Dosis. (Medic. chirurg. Zeitung. 1824. Bd. II. S. 263.)



Bädern guten Erfolg. Auch neuerlich haben sich in Russland manche Aerzte sehr günstig über dasselbe ausgesprochen. Dr. v. Hübenthal sagt: »Zur Erfüllung der zweiten Indikation (Zurückführung der gesunkenen Gefässthätigkeit zu ihrem Normalverhältnisse und Aufrichtung des deprimirten Vitalitätsverhältnisses des Nervensystems) giebt es kein zuverlässigeres Mittel als den Mohnsaft; nur durch den zweckmässigen Gebrauch des Mohnsafts allein kann die gesunkene Gefässthätigkeit wieder zu ihrem Normalverhältnisse zurückgeführt und das deprimirte Vitalitätsverhältniss des Nervensystems wieder aufgerichtet werden. Am sichersten wirkt dieses Mittel, wenn es nach vorhergegangenen reichlichen Blutausleerungen in öligen Emulsionen oder auch im reinen Oele aufgelöst und in nicht zu langen Zwischenräumen gegeben wird:

R. *Opium purissimi gr. VIII.*  
*solve in Aq. Nucis moschatae libr. dimid. adde*  
*Ol. Ricini,*  
*Mucil. Gummi arab. ana unciam,*  
*Syr. Aurant. unciam dimidiam.*  
 MDS. anfangs alle Viertelstunden, später stündlich einen Esslöffel voll.

\*

R. *Opium purissimi gr. VIII.*  
*solve in Olei Papaveris alb. uncia una.*  
 DS. anfangs alle Viertelstunden, nachher alle Stunden einen Theelöffel voll.

Mit diesem Mittel wird so lange fortgefahren, bis aller Schmerz verschwindet und das Erbrechen aufhört. Bis dahin muss der Kranke durch öfteres Anreden,



durch starke Riechmittel u. dgl. von Schlaf abgehalten werden, weil dieser bei der torpiden Stimmung des Gehirns leicht den Tod herbeiführen kann. Erst dann, wenn die nöthigen Bedingungen erfüllt und die gesunkene Gefästhätigkeit zu ihrem Normalverhältnisse zurückgeführt ist, genieße der Kranke der Ruhe.» Ein ungenannter Moskauer Arzt nennt das Opium das beste Mittel in der Cholera; nach ihm soll man es in Pulverform oder in Pillen geben von einem halben bis zu einem Gran pro dosi. Andere russische Aerzte dagegen sprechen sich gar nicht günstig über die Wirkungen des Opiums aus, z. B. Dr. H. Blumenthal und Dr. Lindgroen. Letzterer sagt in dieser Beziehung: »Was die innern Mittel betrifft, so hat die Erfahrung die von den Engländern zu allgemein empfohlene Anwendung der erhitzen- den krampfstillenden Mittel (Ol. Menth., Ol. Cajeput etc.) nicht bewährt und die günstige Wirkung des Opiums höchst zweifelhaft gemacht, es schien vielmehr wegen der leicht eintretenden Entzündungen und soporösen Zustände geradezu schädlich zu sein. Nur Gewohnheitstrinker ertrugen es leichter.« (Rust's Magazin für die gesammte Heilkunde. Bd. XXXIII. S. 600). Dr. Blumenthal sagt, er habe das Opium einigemal als krampfstillendes und Gefästhätigkeit erweckendes Mittel angewendet, doch, so sicher es auch anfangs für beide Zwecke wirken möge, so sehr seien seine sekundären Wirkungen zu fürchten; was auch die Erfahrung bestätige, indem Kranke nach einer augenblicklichen Erregung des arteriellen Systems in Sopor verfallen seien, aus dem sie nicht wieder erwachten.» Ebenso haben auch mehrere brittisch-ostindische Aerzte



unglückliche Erfahrungen über die vorzugsweise Anwendung des Mohnsafts gemacht.

Nimmt man alle diese Urtheile zusammen, so wird man sich wohl vor einem zu grossen Vertrauen auf den Mohnsaft hüten müssen. Jedenfalls scheint er durch eine bereits stattfindende Affektion des Kopfes oder durch eine in der Konstitution des Kranken begründete Neigung dazu bestimmt kontraindicirt zu sein, und im Allgemeinen mehr für schwächliche Personen als für vollblütige geeignet zu sein, wie man schon in Ostindien beobachtete, dass er bei den schwächlichen Eingebornen sicherere Dienste leiste als bei den kräftigern Europäern. In denjenigen Fällen aber, wo das Opium nicht kontraindicirt ist, möchte es immerhin unter die Hauptmittel gegen die Cholera zu setzen sein.

Manchem könnten die öfters in Anwendung gebrachten enormen Gaben von Mohnsaft anstössig erscheinen, wie z. B. Thomas Hall einem Kranken in Zeit von einer Stunde 700 Tropfen Opiumtinktur mit 12 Unzen Branntwein gab, und Dr. Lloyd innerhalb 20 Minuten einem eben erst an der Cholera erkrankten Offizier 270 Tropfen Laudanum mit Schwefelnaphtha reichte. Man erinnere sich aber dabei, welche ungeheure Gaben Opium bei heftigen Affektionen des Nervensystems, z. B. beim Tetanus der menschliche Körper nicht allein zu ertragen im Stande ist, sondern auch zu seiner Herstellung erfordert, und man wird auch in der Cholera weniger abgeneigt sein, bedeutende Dosen von Mohnsaft zu geben, besonders wenn man bedenkt, dass in heftigen Fällen derselben Symptome vorkommen, die sehr deutlich eine Annä-



herung zur tetanischen Affektion des Nervensystems zu erkennen geben, und dass manche Fälle erzählt werden, wo Kranke nach Anwendung von ganz ausserordentlichen Gaben von Opium hergestellt worden sind, die dieselben durchaus hätten tödten müssen, wenn das Opium kein zur Bekämpfung der Cholera geeignetes Mittel wäre.

**Blutentziehungen.** — Bei der englischen Behandlungsweise wurden gewöhnlich auch Aderlässe angewendet. Die Erfahrungen über ihren Erfolg sind sich widersprechend, insofern Manche sie dringend empfehlen, Andere aber einen nachtheiligen Erfolg gesehen haben wollen; doch ist es hier weniger schwierig, als bei andern Heilmitteln, zu bestimmen, unter welchen Umständen sie genützt haben. Alle englischen Aerzte stimmen darin überein, dass das Aderlassen in der Regel contraindicirt sei bei den Eingebornen Ostindiens, die eine schwächlichere Konstitution haben, als die Europäer. Ebenso waren sie bei schwächlichen und alten Europäern erfolglos, oder schädlich. Ferner mag die Zuträglichkeit des Aderlasses von dem Stadium der Krankheit abhängen. Manche Aerzte sahen von dem Aderlassen allein im Anfang der Krankheit guten Erfolg.

Der Bericht des bengalischen Gesundheitsrathes sagt: »Das Blutlassen konnte im Durchschnitt bei allen Europäern und bei kräftigen Eingebornen in der ersten, zweiten oder dritten Stunde nach dem ersten Anfalle von zwölf bis dreissig Unzen angewendet werden. In allen Fällen, wo es unter den angegebenen Umständen geschah, schnitt es schneller als jedes andere Mittel die Krankheit kurz ab,



löste die Krämpfe, stillte die Reizbarkeit des Magens und der Eingeweide und entfernte die allgemeine Niederdrückung der Lebensverrichtungen. Bei den Eingebornen trat gewöhnlich so schnell allgemeine Schwäche ein, dass es zu spät zum Blutlassen war.»

Im Bombay'schen Berichte wird gleichfalls das Aderlassen bei Europäern als das sicherste Mittel empfohlen, und auch bei Eingebornen, wenn es früh genug geschehen könne.

Bemerkenswerth ist, was William Scot im Berichte des Gesundheitsrathes von Madras über die Blutausleerungen sagt. Er sagt, man könne nur mit Mühe zu der Ueberzeugung gelangen, dass dieselben bei dem niedrigsten Grad der Lebenskräfte, bei fast erloschenem Herzschlag, bei Vernichtung aller Lebenswärme, und bei dem Stillstehen fast aller Funktionen dennoch Hülfe zu leisten im Stande seien. Anfangs habe man in Fällen von heftigem Krampf zur Ader gelassen, und als die Leichenöffnungen öfters einen mit Blut überladenen Zustand der Gefässe in den Eingeweiden zu erkennen gegeben, habe man diesem Zustand die Blutausleerungen entgegengesetzt. Erfolgte Ohnmacht auf den Aderlass, so wäre dies gemeiniglich ein günstiges Zeichen gewesen. Man habe mitunter auf den Aderlass einen tödtlichen Collapsus folgen sehen, am häufigsten aber, wenn nur eine kleine Quantität Blutes ausgeleert worden sei; denn wenn die Ausleerung des Blutes so lange fortgesetzt worden sei, bis sich die Wirkung derselben bis auf die innern Gefässe und das Herz erstrecken konnte, so habe es geschienen, dass hierdurch die Circulation von einem sie unterdrückenden Hinderniss befreit worden sei.



Die einzige Schwierigkeit hierbei liege in der zuweilen stattfindenden Unmöglichkeit, eine hinreichende Menge Bluts zu bekommen. Der Arzt müsse dabei Frikationen, warmes Wasser und den innern Gebrauch von Reizmitteln zu Hülfe nehmen, ohne sich durch eine Anwandlung von Schwäche abschrecken zu lassen, noch auch bei einer temporären Besserung des Pulses zu beruhigen; denn wenn es gelinge, die innern Gefässe zu entleeren, so sei der Kranke wahrscheinlich gerettet; wo nicht, so sei er wahrscheinlich verloren. Der Collapsus sei nicht die Folge des Blutverlustes, sondern müsse durch letztern gehoben werden; dem ungeachtet solle man nicht einzig und allein auf ihn bauen, und der Gesundheitsrath ertheilt den Rath, dem Aderlass die Anwendung antispasmodischer und reizender Mittel vorzuschicken.

Als ein auffallendes Beispiel von der Nützlichkeit des Blutlassens bei Europäern werden die Erfahrungen des Dr. Burrell angeführt. Dieser liess unter 100 Kranken 88 zur Ader, wovon zwei starben, 12 wurde kein Blut abgezapft und von ihnen starben 8. Allein bei näherer Betrachtung kann man darauf doch keinen grossen Werth legen; da nichts Näheres über die Krankheitsumstände angegeben ist, so könnten letztere 12 Fälle so heftig gewesen seyn, dass man gar keinen Aderlass zu Stande bringen konnte, und die andern 88 Fälle solche, die vielleicht auch ohne Aderlässe gehoben worden wären. So meinte auch wirklich D. Kinnis, in denjenigen Fällen von Cholera, wo aus einer gemachten Venenöffnung das Blut in Strömen geflossen sei, hätte auch die Heilung an und für sich erfolgen können.



Marshall, der die Krankheit in Ceylon beobachtete, ist ebenso wie Kinnis dem Blutlassen nicht geneigt; doch gesteht er, er habe es dennoch zuweilen bei Europäern nützlich gefunden, wenn es angewendet worden sei, ehe die Thätigkeit des Herzens und der Schlagadern bereits vermindert war. Bei Schwarzen dagegen fand er das Aderlassen immer schädlich, so wie auch dann, wenn die Haut schon angefangen hatte, kalt und klebrig und der Puls schwach zu werden.

Von einigen Aerzten in Ostindien wurde auch öfters das Blutlassen ausschliesslich in Anwendung gebracht. Conwell sagt in dieser Beziehung, man könne fragen, ob der Aderlass und besänftigende Getränke nicht ohne versüßtes Quecksilber und Mohnsaft angewendet werden müssen. Er antworte hierauf, dass mehrere Aerzte dieses Verfahren befolgen und einige es sogar vorziehen; er sei fest überzeugt, dass der Aderlass, im Anfang angewendet, und selbst vielleicht das warme Bad, noch früher, in vielen Fällen die Krankheit heben könne; jedoch sei man den vielfältigen Erfahrungen Achtung schuldig, welche die gleichzeitige Anwendung von versüßtem Quecksilber und Opium als wirksam erwiesen haben.

Sehr beachtenswerth sind die Angaben James Annesley's in Betreff der Blutentziehungen.

»An Blutentziehung, sagt er, muss man (wegen der gefährlichen Kongestionen gegen die innern Organe) wenn sie anders ausführbar ist, ganz vorzüglich denken. Der Zweck derselben ist Verminderung der Blutmenge, damit das Herz und die Lungen von Oppression befreit und in Stand gesetzt werden, ihre



Funktionen zu verrichten. Man kann diesen Zweck jedoch nur in den frühern Stadien der Krankheit und ehe die Circulation am Handgelenke aufgehört hat, erreichen; es ist also höchst nöthig, dass früh Hülfe geleistet wird, denn späterhin will das Blut selten aus der Vene heraus fließen, und wenn es auch fließt, so geschieht es doch nur in zu geringer Menge, als dass Besserung dadurch hervorgebracht werden könnte. Ich habe zuweilen gesehen, dass 16, 18, ja wohl 20 Unzen Blut langsam und in einem dicken Strahle aus der Vene herausflossen; dann hörte es plötzlich auf zu fließen, und der Kranke starb schnell. Ich glaube, dass in diesen Fällen nur die Quantität Blut entzogen wurde, welche in den Venen geblieben war, nachdem die Circulation schon in ihnen aufgehört hatte, und dass das Blut folglich zu fließen aufhörte, als die Venen entleert waren. Dieser Umstand hat zu sehr verschiedenen Urtheilen über die Zweckmässigkeit der Blutentziehungen Veranlassung gegeben, und Einige haben daraus geschlossen, dass der Tod durch Aderlässe beschleunigt würde. Ich will die Sache selbst nicht leugnen; aber ich glaube, dass alsdann die Krankheit schon so weit vorgeschritten war, dass der Tod unter allen Umständen erfolgt seyn würde, und dass dieser Ausgang der Krankheit durch die Blutentziehung vielleicht nur um eine halbe oder um eine ganze Stunde früher hergeführt wurde. Wir haben aber auch Fälle, wo das Blut, selbst wenn man die Blutentziehung in den späteren Stadien der Krankheit vornahm, so lange floss, bis das Gleichgewicht in der Circulation hergestellt war und die Kranken genasen. In diesen Fällen war das Blut anfangs dick,



schwarz und kam nur tropfenweise hervor; nach und nach wurde es dünner und floss leichter, bis es endlich eine hellrothe Farbe annahm. Nach dieser Veränderung muss man sich immer richten; ob sie schon eintritt, wenn nur eine Unze Blut entzogen ist, oder erst, wenn dreissig entzogen sind, ist gleichgültig; aber ehe sie nicht eingetreten ist, kann man den Kranken nicht für gerettet halten. Meiner Meinung nach sollte man daher unter allen Umständen eine Blutentziehung versuchen. — Obwohl ich übrigens rathe, in allen Fällen und in jedem Stadium der Krankheit eine Blutentziehung zu versuchen, so weiss ich doch auch sehr wohl, dass manche Kranke genasen, ohne dass ihnen irgend Blut entzogen war; auch kann ich den Erfolg der Blutentziehungen nicht immer verbürgen; aber ich glaube, behaupten zu können, dass, wenn man in den frühesten Stadien der Krankheit, ehe die Circulation am Handgelenke aufgehört hat, einen Aderlass vollführen kann, neun Fälle unter zehn glücklich verlaufen werden, namentlich wenn die schwarze Farbe des Blutes in die rothe übergeht, wenn der Puls sich hebt und die Krämpfe nachlassen. — Wenn ich übrigens Blutentziehung als den Hauptanker in der Behandlung der Cholera bezeichne, so muss man deshalb nicht glauben, dass sie allein zur Heilung hinreichend wäre. Auch andere Mittel sind sehr wesentlich. Der Zweck der Blutentziehung ist, den Krampf und die venöse Kongestion zu mindern, das Herz und die Lungen von der Oppression zu befreien und die dringendsten und quälendsten Symptome zu heben; wenn man diesen Zweck nicht bis zu einem gewissen Grade erreicht, so wird alle weitere Bemühung frucht-



los bleiben; wenn er aber erreicht wird, so ist die Krankheit dadurch gleichsam in einen lenkbaren Zustand gebracht, obgleich auch nicht selten nachher die kräftigsten Mittel erforderlich werden, um einen ganz entgegengesetzten Zustand der Krankheit zu bekämpfen, welcher beinahe eben so gefährlich ist, als der erstere, und durch die eintretende Reaktion veranlasst wird, während die Konstitution sehr ungünstig für die Entwicklung desselben gestimmt ist. Ich hielt es um so mehr für nöthig, die Vortheile der Blutentziehungen aus einander zu setzen, da ich weiss, dass viele von den Aerzten in Ostindien ein grosses Vorurtheil dagegen haben. Meine eigene Erfahrung spricht entschieden dafür; nur sehen wir die Kranken nicht immer so früh, dass man eines guten Erfolges gewiss sein kann. In solchen Fällen muss man zu andern Mitteln seine Zuflucht nehmen, man muss nämlich Antispasmodica und Stimulantia geben.»

Der Wundarzt B. L. Sardham liess im Jahre 1823 zu Meerat gleich im Anfange der Krankheit vierzig bis sechzig Unzen Blut abzapfen, und zwar, wie er versichert, mit dem besten Erfolge. Die Verrichtung des Herzens werde dadurch gehoben, der Puls kehre an der Hand zurück, die Oberfläche der Haut verliere ihr zusammengeschrumpftes Ansehen und ihre Todeskälte, die Krämpfe, das Erbrechen und der unauslöschliche Durst vermindern sich. (Nach dem Aderlassen gab Sardham 1 bis 2 Unzen Wunderbaumöl mit  $\frac{1}{2}$  bis 1 Unze Terpentinöl, was nach einigen Stunden wiederholt wurde; ein Blasenpflaster auf die Magengegend. Wenn sich alle Krämpfe gelegt hatten, so gab er eine volle Dosis Calomel, und nach



einigen Stunden einige Drachmen Jalappe, wodurch dann mit Erleichterung des Kranken viele galligte Massen ausgeleert wurden. Das Calomel, sagt er, wirke durchaus nicht, wenn man ihm nicht die Oele vorausschicke; es werde wegen der heftigen krampfhaften Zusammenschnürung des Magens und der Gedärme gewöhnlich gleich wieder ausgebrochen, was er 1817 häufig gesehen habe.)

Dr. Gravier zu Pondichery, ein eifriger Anhänger Broussais's, der die Cholera mit dem Namen *Gastro-entérite épidémique de l'Inde* belegt, konnte an der englischen Behandlungsweise keinen Gefallen finden, und nahm seine Zuflucht zu lauen Getränken und zum Aderlassen, bis er später zu Blutigeln überging, worauf wir weiter unten zurückkommen werden. Er sagt, in einfachen Fällen, oder wo die Krankheit ganz frisch gewesen sei, habe er lauwarmes Wasser und versüßtes Reiswasser reichen lassen und diese Mittel haben grösstentheils ausgereicht; wenn aber die Erscheinungen einen baldigen Tod ankündigten, wenn die Gliedmaassen kalt, die Krämpfe, die Beklemmung heftig waren, habe er seine Zuflucht zu einem Aderlasse nehmen müssen, der meistens sehr günstig gewirkt, aber doch nicht alle seine Wünsche befriedigt habe. Die Wirkungen des Aderlassens schildert er mit folgenden Worten: »Sogleich klärt sich das Gesicht des Kranken auf; er, der bis jetzt kein Wort hervorbringen konnte, ruft nun mit einem unbeschreiblichen Ausdrücke aus: ich bin gerettet! Die Zunge wird feucht, das Erbrechen, die Stuhlausleerungen, die Krämpfe, die Beklemmungen vermindern sich und hören manchmal ganz auf, die



Harnabsonderung kehrt wieder, eine Erscheinung, welche in allen Fällen das Zeichen eines günstigen Ausgangs war. Nach einem zweiten Aderlasse tritt in der Regel ein Nachlass aller beunruhigenden Symptome ein. Dann fühlen die Kranken einen beinahe wüthenden Hunger \*), dem man nicht nachgeben darf, weil sonst alle Zufälle mit der grössten Heftigkeit wiederkehren und alle Hülfe unnütz ist.»

John Cormick, der die Cholera im Jahre 1822 in Persien beobachtete, bemerkt über die Blutentziehungen: »Nur selten wurde ich beim ersten Entstehen des Uebels herbeigerufen, um reichlichen Aderlass, von dem man wohl in diesen Stadien am ersten guten Erfolg erwarten durfte, vornehmen zu können. In mehreren Fällen wandte ich denselben an, während das Uebel schon einen hohen Grad von Heftigkeit erreicht hatte, konnte aber alsdann den Ausfluss von 5 bis 6 Unzen Blut nur mit so viel Mühe erreichen, dass ich davon abstand. Jedoch fand ich den Aderlass während der sekundären Stadien der Krankheit höchst wohlthätig, da der Kopf freigemacht, die Neigung zur Schlafsucht beseitigt und der Wiedereintritt der normalen Sekretionen des hepatischen Systems erleichtert wurde.»

Bei der Epidemie in Astrachan im Jahre 1823

---

\*) Auch William Scot spricht von dem sich öfters einstellenden Hunger, scheint ihn übrigens nicht als eine Folge der Blutentziehung anzusehen. Ihm zufolge darf man sich von der Empfindung des Hungers nicht leiten lassen, doch dürfe man sie auch nicht ganz unberücksichtigt lassen. Man soll etwas leichte Nahrung reichen und beobachten, ob jene Empfindung darauf erleichtert werde, und wenn dieses der Fall sei, soll man mit Umsicht fortfahren.



wurden zwar nach Dr. Seidlitz Blutentleerungen versucht, gelangen aber fast nie, weil die Thätigkeit im Blutgefäßsysteme von Anfang an zu sehr unterdrückt war und die Haut in einem kalten erstarrten Zustande sich befand; die wenigen entleerten Quintchen Blutes vermochten auch nie zu nützen.

Bei der Epidemie im Winter 18<sup>29/30</sup> im Orenburgischen Gouvernement wurde das Blutlassen als das hauptsächlichste und erste Mittel in der Cholera betrachtet, obgleich es auch Fälle gab, wo Cholera-kranke ohne Aderlass glücklich hergestellt wurden. Als kontraindicirend führt Sokolow auf: hohes Alter des Kranken, schwache, erschöpfte Körperbeschaffenheit oder vor noch nicht langer Zeit vorgenommene Aderlassen, Schwangerschaft, der Eintritt oder die Fortdauer des Monatsflusses \*). Nach dem Berichte des Staabsarztes Blagodatow war eine starke Blutentziehung zuweilen hinreichend, die Krämpfe, die Schmerzen und alle andern Zufälle zu heben; auf der Höhe der Krankheit blieb sie jedoch zuweilen fruchtlos.

In dem übrigen Russland sind die Stimmen über den Nutzen des Aderlasses getheilt. Professor Dr. H. Blumenthal rühmt denselben und fand ihn in Verbindung mit Nervinis und Diaphoreticis und Hautreizen sehr vortheilhaft. Auch Dr. Lindgroen

---

\*) Dieses Fortdauern des Monatsflusses in der Brechruhr ist eine sehr auffallende Erscheinung; in einer so heftigen Krankheit sollte man erwarten, dass derselbe unterbrochen wird. Es ist zu bedauern, dass Sokolow über die Fälle, die er beobachtete, nichts Näheres angibt und diese Erscheinung nur so gelegentlich erwähnt.



überzeugte sich in Nischnei-Nowgorod von den guten Wirkungen des Blutlassens. »Der zwei- bis dreimal innerhalb 24 Stunden wiederholte Aderlass, sagt er, gehört zu den Hauptfordernissen der Kur, darf aber nur bei wirklich vollblütigen robusten Subjekten in reichlichem Maasse bewerkstelligt werden; bei schwächlichen nervösen Subjekten sind Aderlässe zu 4 Unzen, etwa nach einiger Zeit wiederholt hinreichend, die freiere Blutcirculation und Derivation von innern Theilen zu befördern.« Dr. v. Hübenthal, der die Cholera in Arkatak an der persischen Gränze behandelte, sagt über die Blutentleerungen:

»Der ersten Anzeige (Entfernung der Kongestionen und Wiederherstellung des verlornen Gleichgewichts des Kreislaufsystemes, mit besonderer Rücksicht auf die gesunkene Temperatur des Bluts) zu genügen, behaupten die Blutausleerungen den ersten Rang. Sie geben noch immer das sicherste Mittel an die Hand, die obwaltenden Hindernisse des freien Kreislaufs aus dem Wege zu räumen, hindern dadurch nicht allein das weitere Fortschreiten des Uebels, sondern tragen auch viel zur Aenderung der abnormen Temperatur des Blutes bei und befördern so auch die Wiederherstellung des Gleichgewichts des Kreislaufs. Aus diesem Punkte betrachtet ist es einleuchtend, wie Blutausleerungen, selbst bei dem niedrigsten Grade der Lebenskräfte, bei völlig erloschenem Herzschlage und gänzlichem Erkalten noch hülfeleistend waren. Mit der Anwendung des Aderlasses ist daher keine Zeit zu verlieren. Die dabei gemachte Oeffnung muss hinlänglich gross sein, um dem Blute einen ungestörten Ausfluss zu gestatten. Bei hohem Grade des ver-



lornen Gleichgewichts der Circulation und bei schon beginnender Gerinnung des Blutes ist es indessen keine geringe Aufgabe, eine hinlängliche Menge Blut zu erhalten. In diesem Falle muss durch Eintauchen des Körpers in warmes Wasser von 35° R. das zurückgetretene Blut wieder hervorgerufen und der Aderlass an mehreren Stellen zugleich vorgenommen werden. Nach geschehenem Aderlasse muss man darauf sehen, dass die geöffnete Vene nicht durch festes Binden in ihrer Funktion gehindert werde. Besonders ist diess beim Aderlassen am Halse nicht ausser Acht zu lassen. Am sichersten ist es, die kleine Wunde nur mit einem Stückchen englischen Pflaster zu bedecken.» Der genannten Anzeige entsprechen ferner nach Hübenthal Erwärmen des Körpers, Bähungen und Einreibungen, wovon später die Rede sein wird; der zweiten Anzeige Hübenthals, der vorzüglich das Opium entspricht, wurde schon erwähnt.

Alle Erfahrungen über das Aderlassen in der Cholera zusammengenommen, findet man, dass dasselbe ein ganz ausgezeichnetes, aber keineswegs in allen Fällen anzuwendendes Mittel ist. Diejenigen Fälle, in welchen es geschadet haben soll, darf man wohl als solche betrachten, die eine solche Höhe erreicht hatten, dass überhaupt Nichts mehr fruchten konnte, oder in denen es gar nicht hätte angewendet werden sollen, in denen es contraindicirt war. Die Nichtbeachtung von Gegenanzeigen steht der reinen Erfahrung am meisten im Wege. Wenn ein Mittel ohne alle Berücksichtigung der Individualität der Krankheitsfälle angewendet wird, so kann es gar nicht fehlen, dass so



unglückliche Fälle vorkommen, dass dem Arzte über den Schaden, den er gestiftet hat, die Augen aufgehen müssen; und häufig wird dann ein Mittel, was in einigen Fällen, wo man es nicht hätte anwenden sollen, eine auffallend nachtheilige Wirkung hatte, bei Seite gesetzt, wenn es auch gleich bei einer besseren Individualisirung der Fälle den anfangs gehegten Erwartungen vollkommen entsprechen würde. So lassen sich wohl die ungünstigen Aeusserungen, die neuerlich aus Russland über das Aderlassen verlauteten, ungezwungen erklären.

Als entschiedene Gegenanzeige ist eine schwache Konstitution und Blutarmuth anzusehen; daher man in Indien bei den Eingebornen vom Aderlassen nie vielen Nutzen gesehen hat, wohl aber Schaden, wenn man glaubte, dass das, was bei einem kräftigen englischen Matrosen gute Dienste geleistet habe, auch einem schwächlichen Hindu helfen müsse.

Auch bei alten Leuten hielt man schon in Indien das Aderlassen für unpassend, und die Erfahrungen der russischen Aerzte stimmen damit vollkommen überein.

Am meisten empfiehlt sich das Aderlassen im Anfang der Krankheit, wo durch die Entleerung einer beträchtlichen Quantität von Blut den Kongestionen des Blutes gegen die inneren Theile vorgebeugt oder denselben wenigstens ein minder heftiger Charakter ertheilt werden kann. In Beziehung auf die Quantität scheint man nicht ängstlich sein zu dürfen, und die Ansicht W. Scots verdient alle Berücksichtigung, dass man reichlich Blut lassen müsse, um die innern Theile von dem Andrang des Blutes zu befreien.



Lässt man nur wenig Blut, so wird dadurch nur bewerkstelligt, dass die Hautvenen, die ohnediess wenig Blut enthalten, noch mehr entleert werden und dadurch wird das gestörte Gleichgewicht zwischen den äussern und innern Theilen noch erhöht; lässt man dagegen eine grosse Quantität Blut, so befreit man die innern Gefässe von der Menge Blut, die dieselben nicht mehr gehörig fortzuschaffen im Stande sind; die durch die Masse des Blutes halb gelähmten Gefässwandungen können nun auf die verminderte Blutmasse wieder kräftiger wirken und sie mehr gegen die äussern Theile treiben, wodurch eine wohlthätige Vertheilung der Säfte bewirkt wird, die ein nothwendiges Erforderniss zur Hebung der Krankheit ist. Die Quantität des zu lassenden Blutes wird daher auch am meisten von der grössern oder geringern Vollblütigkeit des Kranken abhängig zu machen sein, weniger von der Heftigkeit des Krankheitsanfalles. Die brennende Empfindung in der Oberbauchgegend kann auch als Maassstab dienen; sie ist ohne Zweifel die Folge der Ueberfüllung der grössern Gefässe des Unterleibs. Bei schwächlichen Personen ist sie nicht so heftig, als bei kräftigen und vollblütigen; in Ostindien wurde sie bei den Hindus, die selten das Aderlassen ertragen konnten, in viel geringerem Grade beobachtet, als bei den Europäern, bei denen nach den Versicherungen so vieler Aerzte die Blutentleerungen ausgezeichnete Dienste leisteten.

Auch auf der Höhe der Krankheit wird die Anwendung des Aderlasses von manchen Aerzten empfohlen, von andern widerrathen. Diese Verschiedenheit der Ansichten erklärt sich aus der eben berührten



Wirkung von der Entleerung kleiner Quantitäten Blutes. Da in dem Stadium der höchsten Depression selten eine ordentliche Quantität Blut wird entzogen werden können, so möchte allerdings das Aderlassen nicht am Platze sein, und es ist nicht auffallend, wenn Kranke schnell auf das Aderlassen starben, wiewohl es Unrecht wäre, gerade das letztere als die Ursache des unglücklichen Ausgangs anzusehen, da der Kranke schon vorher in einem Zustande ist, in welchem der Eintritt des Todes nicht unerwartet sein kann. Das Wichtigste ist unstreitig, in solchen Fällen durch die kräftigsten Hautreize eine Revulsion gegen die oberflächlichen Theile des Körpers zu bewirken, und erst wenn diese eingetreten ist, zum Aderlassen seine Zuflucht zu nehmen. In manchen Fällen wird aber das Blutlassen eben durch die günstige Wirkung der äussern Mittel überflüssig gemacht werden; jedoch ist dieses keineswegs immer der Fall, und nicht selten hat man, nachdem dadurch ein Trieb gegen die äussern Theile eingetreten war, noch Blutentleerungen für nöthig erachtet und, selbst wiederholt, mit Glück ausgeführt.

Manche Aerzte haben gegen die Anwendung des Aderlasses in der Cholera die Einwendung gemacht, dass dieselbe keine entzündliche Krankheit sei. Die Nichtigkeit dieser Einwendung springt in die Augen; der Aderlass wird in manchen Krankheiten, die durchaus nicht entzündlicher Natur sind, in Anwendung gebracht, namentlich in Fällen, wo die Blutcirculation gestört ist, z. B. in manchen Arten von Aphyxie. Durch die Ausleerung eines Theiles des stockenden Blutes wird die Circulation des zurückbleibenden er-



leichtert und damit der Blutlauf und das Gleichgewicht zwischen Gefäss- und Nervensystem wiederhergestellt. Demnach möchten allgemeine Blutentziehungen immer ein Hauptmittel bei der Behandlung der Cholera bleiben. Dieselben wurden auch schon früher bei unserer gewöhnlichen Cholera mit Glück angewendet, z. E. von Wintringham; doch werden sie hier nur selten nöthig sein, und desshalb haben sich mehrere ausgezeichnete Aerzte ganz gegen dieselben ausgesprochen, wie Quarin, Berends.

Auch örtliche Blutentziehungen wurden in der Cholera nicht selten vorgenommen. Besonders wurde von englischen Aerzten die Oeffnung der Schläfenschlagader öfters bei heftigem Blutandrang gegen den Kopf vorgenommen, jedoch, wie es scheint, in der Regel ohne besondern Erfolg. Besser bewährte sich die Oeffnung der Drosselblutader oder die Anlegung von Blutigel an den Kopf.

**Blutigel.** Der grösste Lobredner der Blutigel ist Dr. Gravier, der anfangs seine Kranken blos mit Aderlassen und Reiswasser kurirte; später setzte er an die Stellen des erstern Blutigel. Er sagt darüber, in den beiden letzten Monaten der Seuche zu Pondichery (1819) seien von ihm selbst, oder unter seiner Anleitung, dreiundneunzig Personen behandelt worden. »Zwanzig, bei denen die Krankheit eben erst sich gezeigt hatte, tranken frisches Wasser und waren nach 24 bis 26 Stunden hergestellt; dreiundsechzig, die schon länger erkrankt waren, tranken ebenfalls frisches Wasser und bekamen dreissig bis fünfzig Blutigel an die Magengegend und genasen in kurzer Zeit. Bei diesen verschwanden alle beunru-



higenden Erscheinungen, sobald die Blutigel mit dem Saugen fertig waren; die Wärme der Gliedmaassen kehrte wieder, der Puls hob sich, es wurde Harn gelassen, und ein ruhiger Schlaf, wobei die Haut allemal feucht wurde, verkündigte den glücklichen Ausgang. Die Freude der Kranken bei ihrem Erwachen lässt sich nicht beschreiben, sie hatten weder Angst noch Schmerzen mehr. Die schnelle Wiederherstellung der Kräfte trug besonders dazu bei, ihre Zufriedenheit zu erhöhen, und jene Einheizer (incendiaires) in Erstaunen zu setzen, die es noch immer nicht begreifen können, wie klares Wasser und Blutigel ein solches Wunder thun können, denn so nennen sie diesen Erfolg. Allein die Beispiele waren so häufig und so allgemein bekannt, dass sie sich wohl überzeugen mussten. Diese dreiundsechzig Kranke waren alle am dritten Tage nach der Anwendung der Blutigel schon wieder bei ihren gewöhnlichen Geschäften.» Um diese Thatsachen zu bekräftigen und sie gegen allen Widerspruch zu sichern, ersuchte Gravier den Generalgouverneur der französischen Besitzungen in Ostindien, den Grafen Dupuy, die obigen dreiundachzig Genesenen durch den Polizeirichter darüber befragen zu lassen, und ihre Aussage wurde zu Protokoll genommen. — Gravier versichert, der Erfolg seiner Behandlung sei so rasch gewesen, der Ruf derselben habe sich so schnell verbreitet, dass die Malabaren, welche sonst keinen Tropfen Blut sehen konnten, sich zuletzt, ohne einen Arzt zu befragen, dreissig und vierzig Blutigel setzten. Ferner bemerkt er, die Kranken, welche mit Blutigeln oder blos mit frischem Wasser behandelt wurden, haben niemals jenen Hunger



geföhlt, den er nach dem Aderlasse so heftig und unheilbringend gesehen habe. Beachtenswerth ist nach ihm der Vorzug, den klares Wasser vor dem säuerlichen und Gummiwasser hätte, ein Vorzug, den er erst ziemlich spät erkannt, von dem er sich aber hinlänglich überzeugt habe. Der Kranke, meint er, müsse entweder sterben oder durch Blutigel und reines Wasser geheilt werden. »Tausende von Magenentzündungen, fügt er hinzu, die hier recht zu Hause sind, überzeugen mich täglich davon und geben mir ein Recht, so bestimmt zu sprechen. Heutzutage, wo die Heilkunst nicht mehr im bloßen Arzneigeben, sondern wesentlich darin besteht, die entzündliche Reizung zu heben, sobald sie sich zeigt, (Dank sei dir dafür gebracht, o grosser Broussais!) ist dieser Unterschied zwischen klarem und Gummiwasser, den man noch vor kurzer Zeit als albern kleinlich verworfen haben würde, von grösserer Wichtigkeit.»

Die Gravier'sche Behandlung wurde von den ihm untergeordneten Aerzten gleichfalls in Anwendung gebracht, und wie er behauptet, mit Glück, namentlich von Dr. Negrin bei der Seuche in Karikal im August und September 1825.

Dass diese einfache Behandlungsmethode ausserdem eingeschlagen worden wäre, ist unbekannt; und so glänzend auch Gravier ihren Erfolg schildert, so wird man gegen seine Empfehlung doch auf der Hut sein müssen. Er zeigt sich, wie aus dem Obigen hervorgeht, als einen sehr exaltirten Anhän-



ger Broussais's. Die Krankheit kann, wie sie ihm vorkam, nicht besonders heftig gewesen sein; denn eine Krankheit, wo unter 93 Fällen 20 durch blosses Wasser in Zeit von 24 Stunden kurirt werden, kann man in der That nicht einer besondern Bösartigkeit beschuldigen. Da wir hier blos die Behandlung mit Blutigeln berücksichtigen, so bleiben, um ein Resultat aus den angegebenen Erfahrungen zu ziehen, nur 73 Fälle übrig, die mit Blutigeln behandelt wurden. Von diesen genasen 63 und 10 starben, mithin starb nicht ganz der siebente Theil der mit Wasser und Blutigeln Behandelten, ein Resultat, das allerdings noch nicht ganz befriedigend ist, aber doch neben den Resultaten, die manche andere Aerzte von ihrer Behandlung sahen, immerhin nicht gering zu achten ist, um so mehr, da diess die schwereren Fälle waren; denn die gelinderen waren mit blossem Wasser behandelt worden. Was jene 10 Fälle mit tödtlichem Ausgang betrifft, so sucht Gravier den Grund davon darin, dass hier die Blutigel statt in die Magengegend an die Weichen und an die Unterbauchgegend gesetzt worden waren. Auffallend ist es, dass unter den 93 Fällen Gravier's 32 sind, wobei kein Erbrechen, und purpurrothe Stuhlentleerungen stattfanden, sonst aber, wie er versichert, alle gewöhnlichen Symptome der Brechruhr. Wenn auch hier und da von andern Beobachtern als Ausnahme blutige Stuhlentleerungen erwähnt werden, so ist doch diese Angabe Gravier's von purpurrothen Stuhlgängen so entblöst von der Bestätigung anderer Aerzte, dass man geneigt sein muss anzunehmen, dass entweder die Brechruhr in Pondichery einen ganz eigenthümli-



chen Charakter hatte, oder dass Gravier eine Krankheit, die gar nicht die Cholera war, mit diesem Modenamen belegte. Zwar enthält die allgemeine Schilderung der Krankheit, wie sie Gravier gibt, Nichts, was im Widerspruch stünde mit andern Beschreibungen der Krankheit; jedoch ist sie sehr kurz und ungenügend, so dass damit jene Vermuthung nicht vollkommen widerlegt ist.

Nach allem dem zweifeln wir, ob andere Aerzte geneigt sein werden, dem Beispiel Gravier's zu folgen und sich einzig auf frisches Wasser und Blutigel zu verlassen. Damit soll übrigens keineswegs geleugnet werden, dass das Ansetzen von Blutigeln an den Unterleib in vielen Fällen die übrige Behandlung kräftig unterstützen kann. Auf der Höhe des zweiten Stadiums können sie wahrscheinlich nicht in Anwendung kommen, weil sie bei der Blutleerheit der äussern Theile nicht saugen können, (daher kommt wohl die Angabe des Dr. Dobrodejeff, dass Blutigel während Brechruhipidemien nicht saugen; s. Bd. I. S. 119. Haben sie denn auch bei andern, als Brechruhrkranken, nicht gesaugt?) aber im ersten Stadium und im Anfang des zweiten können sie gewiss häufig sehr nützlich, im dritten Stadium aber öfters unumgänglich nothwendig werden. Oefters wendete man statt der Blutigel auch blutiges Schröpfen an; doch scheinen die erstern den Vorzug zu verdienen; die Blutentziehung bewirken beide gleich gut, aber die Blutigel haben voraus, dass durch sie, besonders wenn sie in grösserer Menge gesetzt werden, zugleich ein kräftiger Hautreiz bewirkt wird, was beim Schröpfen in geringerem Maasse der



Fall ist, und dass sie somit der Blutüberfüllung der innern Theile auf doppelte Weise entgegenwirken. Manche der brittisch-ostindischen Aerzte machten mit gutem Erfolge Gebrauch von den Blutigel; ebenso versichert John Cormick, in Persien häufig örtliche Blutentziehungen durch Schröpfen und Blutigel vorgenommen zu haben, und nie ohne wohlthätigen Erfolg. Ganz besondere Aufmerksamkeit verdienen die Bemerkungen James Annesley's, bei dem wir überhaupt die genügendste Belehrung zu finden gewohnt sind, über den Gebrauch der Blutigel im dritten Stadium der Krankheit. »Die Indikation in diesem Stadium, sagt er, ist Verhütung von Kongestion in den Eingeweiden des Unterleibs und der Brust und im Gehirne. Meistens bemerkt man in dem spätern Stadium der Krankheit eine ungewöhnliche Betäubung und Trägheit an den Kranken, und zuweilen sind sie so eigensinnig und mürrisch, dass sie höchst unangenehm werden; wenn nämlich diese Symptome eintreten, so kann man nur mit der grössten Mühe eine Antwort aus ihnen herausbringen, und da man keine Auskunft erhält und das, was man selbst bemerkt, nicht in allen Fällen zureichend ist, so muss man oft gleichsam im Finstern handeln. Die Kranken, bei welchen diese Symptome vorkommen, klagen selten über vielen Schmerz; wenn man aber den Unterleib untersucht, so fühlt er sich meistens an allen Stellen sehr voll und teigig an, als ob in den Gedärmen eine bedeutende Ueberladung und in den Eingeweiden eine sehr starke Kongestion stattfände; wenn man auf die Lebergegend drückt, so krümmen sich die Kranken zusammen, und in ihrem Benehmen spricht sich eine



unbehagliche Empfindung aus, obgleich sie oft sehr bestimmt und hartnäckig versichern, sie fühlen keinen Schmerz. Die Augen sind zuweilen ungewöhnlich glänzend, die Pupillen verengert, und offenbar ist Lichtscheu vorhanden; dennoch behaupten die Kranken, sie hätten kein Kopfweh, und könnten ohne alle Beschwerde in das Licht sehen. Der Puls ist oft unterdrückt und mühsam, selbst wenn im ersten Stadium eine grosse Quantität Blut entzogen ist. Diese Symptome erfordern schnelle Hülfe, und wenn sie heftig sind, so muss man zur Ader lassen; meistens aber wird man mit Blutigeln ausreichen, und ich halte sie in diesem Stadium selbst für ein besseres Mittel als eine allgemeine Blutentziehung, denn mir scheint es, dass sie die Kapillargefässe entleeren, und zur Herstellung der Circulation beitragen, ohne dass sie die Kräfte des Kranken schwächen, — ein Umstand von hoher Wichtigkeit, da die Konstitution ohnehin schon sehr gelitten hat. — Eine sehr ausgebreitete Erfahrung hat bewiesen, dass diese Behandlungsart der Krankheit einen auffallend glücklichen Erfolg hat. Die Symptome, durch welche sie indicirt wird, erfordern jedoch ein höchst wachsames und genau unterscheidendes Auge, weil die Kranken selten darüber klagen; ich weiss viele Fälle, wo sich die Aerzte mit den Antworten, die sie erhielten, begnügten, ohne weiter nachzuforschen, und nachher waren sie oft erstaunt, wenn höchstens 1 oder 2 Stunden, nachdem sie günstig berichtet hatten, gefährliche Symptome zum Vorschein kamen. Ein höchst gründliches Krankenexamen ist daher zur Behandlung der epidemischen Cholera durchaus erforderlich, um so mehr da die



Sensibilität durch das Allgemeinleiden der Konstitution in bedeutendem Grade mitzuleiden scheint, und die Kranken gegen ihr Schicksal ganz gleichgültig zu sein pflegen. Wachsamkeit und richtige Unterscheidung sind offenbar von so grosser Wichtigkeit bei der Behandlung dieser Krankheit, dass ich den praktischen Arzt nicht dringend genug dazu ermahnen kann. Wenn der Kranke bei einem Drucke auf den Unterleib zurückweicht, so muss man Blutigel in beträchtlicher Anzahl ansetzen, und zwar vorzüglich auf die Lebergegend. Wenn Kopffaffektion da ist, so muss man Blutigel an die Schläfen und an den unteren Theil des Schädels setzen. Letzteres ziehe ich vor, denn ich glaube davon grösseren Erfolg gesehen zu haben, als wenn sie an die Schläfen angesetzt wurden. — Abführende Mittel (Calomel allein oder mit Aloë) müssen natürlich dazu gegeben werden.»

Auch die Erfahrungen mancher russischen Aerzte sprechen zu Gunsten der Blutigel; jedoch stimmen sie nicht ganz mit einander überein. Sokolow sagt, wenn nach dem Aderlassen und einer Gabe Calomel und Opium die Unruhe der Kranken, besonders das Gefühl von Druck unter der Brust fortdaure oder gar noch stärker werde, so müsse man in die Praekordialgegend 12 bis 20 und mehr Blutigel setzen; öfter genüge jedoch eine allgemeine Blutentziehung, ohne welche die Blutigel, so viel ihrer auch sein mochten, zu Nichts nützten. Andere meinen, man solle bei vollblütigen Personen zur Ader lassen, bei schwächlichen dagegen statt dessen Blutigel setzen.

**Aeusserliche Mittel.** — Viele der brittisch-



ostindischen Aerzte, welche sich auf ihre Behandlung mit Calomel, Mohnsaft und Aderlassen verliessen, legten im Allgemeinen keinen grossen Werth auf kräftige Reizung der Haut und sahen sie nur als Unterstützungsmittel der Kur, nicht als einen integrirenden Theil der Behandlung an; sie scheinen desshalb auch in vielen Fällen ganz ausser Acht gelassen worden zu sein, gewiss mit Unrecht. Die Theorie spricht unstreitig für die Anwendung von Hautreizen in der Cholera; es gibt fast keine Krankheit, in der nicht eine Antreibung der Hautthätigkeit einen günstigen Einfluss hätte; und in allen Fällen, wo uns erhöhte Hautthätigkeit erwünscht ist, begnügen wir uns nicht blos mit innerlichen auf die Haut wirkenden Heilmitteln, sondern unterstützen letztere auch durch unmittelbares Reizen der Haut, das nur selten kontraindicirt, meistens aber sehr nützlich ist.

Die rothmachenden und blasenziehenden Mittel dienen als Heilmittel vorzüglich bei Störungen des Gleichgewichts im Nervensystem und Gefässsystem, und bei gesunkener vegetativer Thätigkeit der äussern Haut. Alle diese Bedingungen finden in der Brechruhr statt, und man darf desshalb bei der Behandlung dieser Krankheit den Hautreizen keine untergeordnete Stelle anweisen, um so mehr, da die Anwendung innerlicher Heilmittel durch die ausserordentliche Reizbarkeit des Magens so sehr behindert ist. Oft wird die Anwendung von Hautreizen erst die Anwendung von innerlichen Mitteln möglich machen, indem sie durch den Gegenreiz die grosse Reizbarkeit des Magens mildert, wie auch das Aderlassen oft erst gelingt, wenn durch die Hautreize bereits wieder eine



gleichförmigere Vertheilung der Blutmasse und der Nerventhätigkeit bewirkt ist. Ueberdiess hat sich die Wirksamkeit der Hautreize in Persien und in Russland sehr glänzend ausgewiesen in Fällen, wo man von ihnen ausschliesslich Gebrauch machte oder sie mit andern Mitteln verband, denen man keine ausgezeichnete Wirkung zuzuschreiben geneigt sein kann. Dabei haben diese Mittel den Vortheil, dass sie in der Cholera nie wirklichen Schaden stiften können, was wir von keinem der andern gegen dieses Uebel empfohlenen Mittel behaupten möchten.

Oertliche Hautreize wurden auch von den brittisch-ostindischen Aerzten selten vernachlässigt. Anfangs wandten sie auf die Empfehlung Corbyn's grosse Blasenpflaster am Unterleib an. Dass dieselben nicht viel wirken konnten, leuchtet ein. Bei der Cholera müssen die Mittel, welche überhaupt nützen sollen, schnell wirken, was die Kanthariden keineswegs thun. Selbst bei normaler Hautthätigkeit tritt ihre Wirkung nur langsam ein, noch viel mehr aber bei einer so sehr gesunkenen Thätigkeit der Haut, wie sie in der Cholera stattfindet. Man kam desshalb bald auf andere kräftigere Mittel; besonders bediente man sich der von William Scot versuchten und angerathenen Salpetersäure, und viele englische Aerzte meinten, sie sei jedem andern Hautreize vorzuziehen; man bediente sich zum Aufstreichen gewöhnlich einer Mischung von zwei Theilen Säure mit einem Theile Wasser und brachte dieselbe mit dem Barte einer Feder auf die Haut; sie wurde dann entweder gleich wieder mit Wasser abgewaschen oder mit einer Pottaschenauflösung oder mit Salmiakgeist



neutralisirt. Besonders rühmen die Wundärzte A. Killet und Dr. Kennedy dieses Verfahren; ebenso fand es Povell sehr wirksam. Von 41 Kranken, die er auf diese Weise behandelte, starben ihm nur 6. Nach ihm konnte nach dem angegebenen Verfahren die Oberhaut leicht abgenommen werden, und dann wurde ein Blasenpflaster auf den entblösten Theil gelegt, um den Gegenreiz zu unterhalten. Dabei wurden innerlich Opium und Kampher in kleinen Gaben nebst schleimigen Getränken gegeben. James Annesley versuchte die Salpetersäure oft als blasenziehendes Mittel und fand, dass sie heftiges Brennen in der Haut, aber in keinem einzigen Falle Blasen hervorbrachte; er hält kochendes Wasser für vorzüglicher, obgleich er gesteht, niemals davon Gebrauch gemacht zu haben. Auch W. Scot empfiehlt Umschläge mit kochendem Wasser, bemerkt aber dabei, dass diese Mittel in einem spätern Zeitraum der Krankheit nur unsicher wirken, indem die Haut öfters so unempfindlich werde, dass sie auch auf die stärksten Reize nicht mehr reagire. Es erklärt sich hieraus, warum mehrere englische Aerzte diese Mittel ganz unwirksam gefunden haben wollen; indem sie zum Voraus wenig davon erwarteten, nahmen sie erst, wenn sie sahen, dass die übrigen Mittel zur Bekämpfung der Krankheit nicht ausreichen, zu den Hautreizen ihre Zuflucht; aber dann war es meistens zu spät, die Haut war schon in eine solche Unthätigkeit versunken, dass die Hautreize nicht einmal eine örtliche Wirkung hervorbrachten, also auch nicht durch Gegenreiz auf die Affektion der innern Organe wirken konnten. Wenn diese Hautreize wirksam sein



sollen, müssen sie gleich zu Anfang der Krankheit ungesäumt in Anwendung gebracht werden. Der Anweisung des Petersburger Medicinalraths zufolge wurde auch in Russland häufig die Salpetersäure als Hautreiz benützt und erhielt den Beifall mancher Aerzte. Dr. v. Hübenthal bemerkt, die gewöhnlichen blasenziehenden Mittel können nur allenfalls im Anfange der Krankheit einigen Nutzen gewähren, späterhin trete die eigene Beschaffenheit der Haut des Erkrankten ihrer Anwendung in den Weg; statt ihrer können aber Begiessungen mit geschmolzenem Wachs angewendet werden. Auch Senfteige werden von Manchen empfohlen u. dgl. mehr. Sehr beachtenswerth ist der Vorschlag des Dr. Seidlitz, Moxen zu versuchen. Empfehlung möchte auch die Gondret'sche Ammoniumsalbe verdienen, die ausserhalb Frankreich weniger bekannt ist, als sie es verdient \*). Solche

---

\*) Diese Salbe wirkt je nach der Verschiedenheit ihrer Anwendung als rothmachendes, als blasenziehendes und als äzendes Mittel, und nimmt durch die Sicherheit und Schnelligkeit ihrer Wirkung eine der ersten Stellen unter den Hautreizen ein. Alibert gibt in seinen *Nouveaux élémens de Thérapeutique et de Matière médicale* (5te Ausg. Paris. 1826. Thl. III. S. 267) ihre Zusammensetzung folgendermaassen an:

R.

Adipis porcini paululum liquefacti drachmas septem,  
Sebi ad candelas liquefacti drachmam unam;

Mixta conjice in lagenam perfecte obturatam; adde

Ammoniacae liquidae (25<sup>o</sup>) drachmas sex ad unciam unam,

M. agitandø hermeticeque obtura.

Einreibungen mit dieser Salbe vermehren schnell die Hautthätigkeit; bleibt sie 5 bis 6 Minuten auf der Haut aufgetragen, so wirkt sie als rothmachendes Mittel; in 15 bis 20 Minuten bewirkt sie eine vollständige Blase, in einer Stunde eine förmliche Kauterisation.



Hautreize sind übrigens nicht auf die Herzgrube zu beschränken, sondern sollten namentlich auch längs des Rückgrats und an den Extremitäten angebracht werden. John Cormick liess mit sehr gutem Erfolg die Beine und Arme des Kranken mit Lappen, die in fast kochendes Wasser getaucht wurden, beständig umwickeln und reiben, und versichert, ihm sei kein Mittel bekannt, durch welches die Wärme in den Extremitäten besser unterhalten werden könnte. Das Anlegen von Flaschen, die mit siedendem Wasser gefüllt sind, oder von mit heissem Sand angefüllten Säcken wird von manchen Aerzten zu demselben Zwecke gerühmt. Wichtiger aber noch als alle diese auf einzelne Theile angebrachten Hautreize scheint es zu sein, auf die ganze Hautoberfläche reizend einzuwirken, und vielleicht dürfte man sich hiervon mehr als von allen sonst noch angepriesenen Mitteln versprechen, wenn gleich mehrere Aerzte keinen besondern Erfolg davon gesehen haben wollen. Es fragt sich, ob diese Aerzte nicht schon vorher gegen ausgebreitete Hautreize ein Vorurtheil hatten. Die Erfahrung ist bekanntlich eine Achselträgerin und bestätigt gerne jedem Arzte, was er sich vorher dachte. In den Fällen, wo ausgebreitete Hautreize Nichts nützten oder gar geschadet haben sollen, trägt vermuthlich die verspätete Anwendung oder der Mangel an gehöriger Ausdauer die Schuld, die dem Mittel selbst aufgebürdet wurde.

Am meisten sprechen für die ausgedehntesten Hautreize die Erfahrungen in Baku im Jahre 1823, von denen uns Dr. Seidlitz berichtet (vergl. Bd. I. S. 69 u. f.). Dort bestand die ganze Behandlung der



Brechrühr in Uebergiessung des sogleich entkleideten Patienten mit Wasser und darauf folgenden starken Reibungen des Körpers, die so schonungslos vorgenommen wurden, dass der Wiedergenesene blaue Flecken am ganzen Körper davon trug. Die Gliedmaassen und der Rumpf wurden nicht blos gerieben, sondern auch gekneipt und geknetet, ein Verfahren, zu dem schon der Instinkt auffordert. Jedermann weiss, dass das einfachste Mittel gegen Wadenkrämpfe ein kräftiges Reiben und Kneipen ist. Jene Manipulationen wurden immer von mehreren Personen zugleich vorgenommen und mehrere Stunden anhaltend fortgesetzt. Erst wenn darauf Besserung eintrat, bekam der Kranke einen warmen Thee, worauf die Haut einen wohlthätigen Schweiss ergoss, mit dem die Genesung eintrat. Weiterhin wurde Nichts als eine strenge Diät beobachtet, um Rückfällen vorzubeugen. Diese einfache Behandlungsmethode verdient die grösste Beachtung und beweist, wie viel durch ein kräftiges Antreiben der Hautthätigkeit in der Brechrühr geleistet werden kann; denn nach Dr. Seidlitz war das Verhältniss der Genesenen zu den Gestorbenen günstiger als zu Astrachan, (wo man die Behandlung der englisch ostindischen Aerzte befolgt hatte,) wiewohl die Seuche an denen, welche das Opfer derselben wurden, ihre ungeheure Schnelltödtlichkeit bewies.

In Ostindien sah man öfters einen guten Erfolg von einfacher Anwendung der Wärme. Einen solchen Fall erzählt Dr. White zu Madras. Einer seiner Bedienten war von der Brechrühr befallen worden; seine Kameraden hielten ihn in der Nähe eines grossen Feuers, wandten einige Zeit hindurch Einreibungen



an und retteten so den Kranken. Conwell, der dieses Falls erwähnt, bemerkt dabei, die Wärme, wenn man sie unmittelbar auf die Oberfläche des Körpers anwende, sei von ausserordentlichem Nutzen; es gebe wenige Mittel, die so geeignet wären, die Wärme mitzutheilen, als gewöhnliches, gut erwärmtes Küchensalz in kleinen Säcken oder in Servietten eingeschlagen. Einreibungen mit erwärmtem Flanell und Sorge für eine beträchtliche Wärme der Luft dürfen nach ihm nie vernachlässigt werden. James Annesley versichert, von allen äusserlichen Mitteln gewärmten Flanell, Sinapismen und Blasenpflaster am zuträglichsten gefunden zu haben, und schlägt auch ein gut eingerichtetes Sandbad vor, indem er darauf aufmerksam macht, dass in den Jahren 1780, 1781 und 1782, wo die Brechruhr in Indien herrschte, Nichts so gute Dienste leistete als ein Bad von heissem Schrot. Auch William Scot sagt, trockene Wärme mit heissen Salz- oder Sandsäcken sei oft mit gutem Erfolg angewendet worden. In Orenburg sah man ebenfalls von trockenen Reibungen mit erwärmtem Flanell, so wie von dem Anbringen von Wärme mittelst erwärmtem Hafer, Kleie, Asche, Salz u. dergl. günstige Wirkungen. Nach Prof. Dr. H. Blumenthal tragen Reizung der Haut durch fleissiges Reiben des Körpers und ununterbrochene Applikation von Wärme kräftiger und schneller als alle innere Mittel dazu bei, Leben und Wärme in die peripherischen Theile des Organismus zurückzurufen und das obwaltende Missverhältniss im Kreislaufe wieder auszugleichen. »Nach gemachtem Aderlass, sagt er, ist vor allen Dingen nachdrückliches Frottiren des ganzen Körpers



vorzunehmen. Hier hat man hauptsächlich darauf zu sehen, dass alle Theile des Körpers zugleich gerieben werden, und darum müssen vier Personen auf einmal diese Reibungen an einem Kranken vornehmen, denn sonst können dieselben keinen Nutzen schaffen. Man kann sie entweder mittelst einfachen Baumöls und der bloßen Hand, oder noch besser mit von geistigen Flüssigkeiten durchfeuchteten flannelnen Lappen vornehmen lassen, und da hat sich besonders folgende sonderbare Mischung einen vorzüglichen Ruhm erworben, so dass man sie allgemein das *Linimentum anticholericum* genannt hat:

R.

Theriac. drachm. III.

Acid. nitr. dilut. unc. II.

Ol. Terebinth. unc. III.

Mell. despumat. unc. I.

Spirit. Vini rectific. unc. VI.

M. F. Linimentum.

Nach den Reibungen aber muss ungesäumt und gleichzeitig mit der Anwendung der oben erwähnten innern Mittel (die verschiedenen Aetherarten, die flüchtige Baldriantinktur, der Liqueur C. C. succ., Moschustinktur, u. a. dgl. erregende Mittel) eine künstliche Erwärmung ununterbrochen fortgesetzt werden. Allgemeine warme Bäder taugen zu diesem Zwecke nicht; der Vortheil einer allgemeinen Erwärmung, den sie vorübergehend gewähren, wird weit überwogen von dem nachtheiligen Druck, den das Wasser auf die Oberfläche des Körpers ausübt, wodurch das Blut noch mehr gegen die innern Theile gedrängt und die Gefahr der Erstickung erhöht wird, wesshalb die Pa-



tienten selbst sich auch selten wohl im Bade befinden. Sehr zweckmässig aber sind warme, ja heisse Fussbäder. Mit dem günstigsten Erfolge wurde die Ader an beiden Füßen zugleich geöffnet, und letztere sodann bis an die Kniee in so heisses Wasser gesteckt, als der Kranke es nur vertragen konnte, während gleichzeitig der obere Theil des Körpers mit erwärmten wollenen Tüchern fleissig gerieben ward. — Ein Moskovischer (?) Bürger hat zur künstlichen Erwärmung des Körpers das Belegen desselben mit abgebrühtem Heusamen empfohlen (s. Bd. I. S. 131 u. f.); so zweckmässig dieses Mittel an sich ist, so kann dabei doch, besonders wenn man nicht sehr sorgsame Krankenwärter hat, die mit der grössten Gewissenhaftigkeit den kühlwerdenden Heusamen durch frisch abgebrühten immer wieder ersetzen, gar zu leicht eine nachtheilige Erkältung, gerade während der eintretenden Krise erfolgen, die dann sicher ein Recidiv verursachen und den Tod herbeiführen würde. Daher bediene ich mich zu diesem Zwecke lieber des gedörrten Hafers, mit dem ich, nachdem er in kleine Säcke geschüttet worden, den ganzen Körper umlegen und den kühler werdenden natürlich aufs Sorgfältigste wieder mit frischgedörrtem verwechseln lasse, womit so lange fortgefahren werden muss, bis nach eingetretenem allgemeinem Schweisse die gefahrdrohenden Zufälle nachlassen und die Krankheit in das Stadium der Rekonvalescenz übergeht.» — Dr. Lindgroen empfiehlt im Stadium prodromorum Einreibungen von starken, die Haut reizenden Dingen, als Mischungen der Tinctura Capsici mit Weingeist, Kampherspiritus, Ammonium, mit Zusätzen von Terpentin oder Theer,



das Tragen eines Stücks Leinwand, welches mit Theer getränkt und nachher getrocknet worden, auf Brust und Unterleib, Sinapismen auf die Magengegend, Waden, Arme und Fusssohlen, scharfe Fussbäder und ganze Bäder (dabei Aderlass oder Blutigel, und Calomel, 3 bis 4 Gran pro dosi alle 2 Stunden). Im zweiten Stadium rath er anhaltendes Reiben des ganzen Körpers mittelst Bürsten und wollenen Tüchern, die mit Kampherspiritus u. dgl. vorher befeuchtet sind, warme feuchte Umschläge aus aromatischen Kräutern oder mit Lappen, die in heissen Essig abwechselnd getaucht werden, um Füsse, Kniekehlen, Kopf und Gesicht, (die Umschläge um den Kopf sollen sehr erleichtern,) ferner Essigdämpfe, besonders aromatische, die man um den Körper streichen lässt, indem man den Kranken entkleidet und mit Decken bis zum Halse einhüllt, über glühende Steine setzt, auf welche alsdann aromatischer Essig gegossen wird; jedoch bemerkt er, man dürfe dabei die aromatischen Umschläge um Kopf und Augen nicht vernachlässigen, sonst entstehen leicht Schwindel und Ohnmacht. (Ausserdem empfiehlt Dr. Lindgroen in diesem Stadium Blutentziehungen und Calomel zu 6 bis 8 Gran pro dosi alle Stunden 3 bis 5mal wiederholt; die auf seinen Gebrauch nachfolgenden lästigen Zufälle, fügt er bei, fordern zu seltenern Gaben auf; auch gebe es Fälle, die ganz ohne seinen Gebrauch einen glücklichen Ausgang und eine kürzere Rekonvalescenz gehabt haben.) Auch Dr. v. Hübenthal erklärt das Erwärmen des Körpers für sehr wichtig und sagt, man wende dazu mit Nutzen Bähungen von gebrühetem Birkenlaub, Hopfen, Heu u. dgl. an; nur



müsse man damit so lange fortfahren, bis Herz- und Pulsschlag sich wieder einstellen; ebenso leisten auch Einreibungen von Oel und Theer an einem warmen Orte, das Reiben mit Senf, Pfeffer, oder mit spirituösen Mitteln, als Salmiak- oder Kamphergeist, Kantharidentinktur u. dgl. grossen Nutzen. — In Ostindien machte man nach William Scot besonders von den beiden folgenden Linimenten bei den Einreibungen Gebrauch: 1) eine Mischung aus 2 Drachmen Kantharidentinktur, 3 Drachmen Kampher und 4 Unzen Seifenliniment mit Opium, 2) 2 Drachmen Senfsamenpulver,  $1\frac{1}{2}$  Unzen Terpentinöl und  $\frac{1}{2}$  Unze Olivenöl. Ausserdem werden noch zu Einreibungen empfohlen: heisser Arrak oder Branntwein, Balsamus vitae externus, Opodeldok, Aufgüsse von Senf, von spanischem Pfeffer, Zwiebel, Knoblauch, Meerrettig u. s. w. Vorzüglich scheinen sich Einreibungen mit einem Aufguss von spanischem Pfeffer zu empfehlen; man hat in Russland auf seine Anwendung einen Ausschlag entstehen sehen, ein Beweis, wie kräftig er auf die Haut einwirkt. Gelingt es, die Haut in eine solche Thätigkeit zu versetzen, die zur Bildung eines Erythems nothwendig ist, so darf man nicht daran zweifeln, dass die Macht der Krankheit vollständig gebrochen ist; und ein Mittel, von dem man schon einen solchen Erfolg beobachtet hat, verdient besonderes Vertrauen, wenn auch seine Wirkung nicht immer in so vollkommenem Grade sich zeigen sollte.

**Bäder.** Die Erfahrungen und Urtheile über die Wirkung warmer Bäder in der Brechruhr stimmen nicht ganz überein. Nach William Steuart Anderson zeigten sie sich in Ostindien sehr wirksam,



um die Krankheit im ersten Entstehen zu ersticken, indem man den Kranken in ein Bad von 97 bis 100° F. lange genug — wohl 1½ bis 2 Stunden — setzen und die darauf folgende Ausdünstung im Bette genau abwarten liess. Dr. Vos bemerkt über diesen Gegenstand: »Das warme Bad besass allerdings die Kraft, den Krampf etwas zu lindern, den Kreislauf zum Theil wieder herzustellen und bei Einigen das Erbrechen etwas zu lindern, besonders auf so lange, als sich der Kranke im Wasser befand. Doch blieb diese Besserung nur von kurzer Dauer, und nachdem das Bad verlassen war, stellten sich die vorigen Zufälle alsbald mit ausserordentlich vermehrter allgemeiner Schwäche ein. Einige Kranke wollten sich durchaus nicht baden lassen, und dazu gezwungen leisteten sie grossen Widerstand. Man hat sie oft mehrere Stunden anhaltend darin erhalten, jedoch ohne den mindesten heilsamen Einfluss.»

Nach Conwell sind die Bäder zu verordnen im Anfang der Krankheit, oder wenn die Thätigkeit im Blutsystem bereits wieder sich verbessert, dagegen taugen sie im Zustande des Collapsus nicht. Im Stadium der Besserung seien sie von dem grössten Nutzen.

Uebereinstimmend damit bemerkt John Cormick, er habe die warmen Bäder häufig während der grössten Heftigkeit des Anfalls versucht, aber nie habe der Patient die geringste Erleichterung gefühlt, im Gegentheile über Zunahme der Schmerzen sich beklagt, und jederzeit habe seine Erschöpfung darauf zugenommen; wenn jedoch dieses Stadium vor-



übergewesen sei, so sei die Rekonvalescenz durch das Bad um Vieles beschleunigt worden, und vorzüglich haben ihm die Bäder zur Wiederherstellung der Urinsekretion sehr dienlich geschienen.

William Scot sagt, sowohl die warmen als die Dampfbäder haben den Erwartungen, die man von ihnen hegte, nicht entsprochen, besonders nicht in den Fällen von bedeutendem Collapsus. Oft haben die Kranken, wenn sie todtkalt anzufühlen gewesen seien, bei Anwendung einer mässigen Wärme über unleidliches Sengen und Brühen geklagt.

Nach Boyle's Erfahrungen ist das Bad nur dann nützlich, wo der Kranke über dessen grosse Hitze sich beklagt und sich davon loszumachen sucht, ganz unwirksam aber, wo es demselben blos angenehm war, wesshalb es 1821 in Bombay auch so heiss angewendet wurde, dass es die Haut fast verbrühte.

Am meisten werden die warmen Bäder von den Astrachan'schen Aerzten nach den Erfahrungen in der Epidemie vom Jahre 1823 gerühmt. Im Seehospitale daselbst wurden die Kranken sogleich bei ihrer Aufnahme in ein warmes mit Branntwein geschärftes Bad gesetzt, das stets bereit war, und blieben darin fünfzehn bis dreissig Minuten. Sowohl im Bade als nach demselben wurden fast fortwährend Reibungen gemacht mit Flanell und einem spirituösen Aufguss des rothen Pfeffers, dem kaustischen Salmiakgeist u. s. w. und in den freien Zwischenräumen der ganze Körper mit Säcken voll warmem Sande belegt. Die Wannenbäder wurden später, da sie sich als das vortrefflichste Mittel bewährten, um welches die Kranken als das einzige Labsal flehten, zwei- bis viermal des Tags wie-



derholt und wenigstens einmal täglich bis zur völligen Genesung fortgesetzt. Auch in der Privatpraxis zeigten sie sich von der besten Seite; die heftigsten Krämpfe lösten sich in demselben, die erstarrten, zusammengezogenen Glieder thauten nach den Ausdrücken der Kranken gleichsam auf und wurden dem Willen unterthan, das Brechen und Purgiren ward auf eine wunderbare Weise beschwichtigt, welche Zufälle alle wiederkehrten, sobald der Patient aus der Wanne stieg. Diejenigen, welche genasen, konnten sich nicht genug in Lobpreisungen dieses Mittels ergiessen. Je länger die Brechruhrkranken in der Wanne sassen, desto mehr gestärkt fühlten sie sich durch die mitgetheilte künstliche Wärme und die gegönnte Ruhezeit. Es scheint, wie Dr. Seidlitz beifügt, dieses Mittel allein allen Indikationen zu entsprechen und verdiente in verzweifelten Fällen stundenlang angewendet zu werden, wobei in der Zwischenzeit die kräftigsten rothmachenden Mittel, am besten Senf, auf eine möglichst grosse Oberfläche, auf Wirbelsäule und Herzgrube gelegt werden müssten. (Wie schon früher erwähnt wurde, verband man in Astrachan mit den Bädern die Anwendung von Calomel und Opium, oder von letzterem in Verbindung mit verschiedenen Reizmitteln.)

Auch in neuester Zeit sahen manche russische Aerzte von Bädern glücklichen Erfolg. Dr. v. Hübenthal sagt, Bäder von 30° R. leisten bei mässiger Kälte des Körpers grossen Nutzen, und fügt bei: »Im höhern Grade des Verschwindens der Lebenswärme aber findet ihre Anwendung nicht mehr statt; in diesem Falle muss aller äusserliche Druck sorgfältig vermieden werden, um nicht noch mehr das Blut von



der Oberfläche des Körpers zu entfernen. Dem Drucke des Wassers allein ist es auch zuzuschreiben, dass warme Bäder das hier nicht leisten, was uns ihr Wärmegrad zu erwarten berechtigt.»

Wenn man von den warmen Bädern Gebrauch macht, wovon man nach den bisherigen Erfahrungen im ersten und im dritten Stadium sich allerdings günstige Wirkungen versprechen darf, so sollte man wohl nicht unterlassen, ihre Wirkung durch zweckmässige Beimischungen zu erhöhen. Man kann dazu alle Rubefacientia, namentlich Senf, spanischen Pfeffer, Seifensiederlauge \*) u. dgl., ferner aromatische Kräuter und spirituöse Flüssigkeiten benützen. Ein ungünstiger Umstand ist es, dass die Bäder gewöhnlich nicht so gleich, wenn sie für nothwendig erachtet werden, angewendet werden können und man über ihrer Zubereitung leicht eine kostbare Zeit verliert; in der Privatpraxis wird man sich desshalb in der Regel nicht damit befassen können, ausgenommen in Fällen, in welchen die Krankheit nicht rasch überhand nimmt.

---

\*) „Die grosse Ableitung,“ welche Tilesius vorschlägt, sind Laugenbäder. (Ueber die Cholera und die kräftigsten Mittel dagegen, nebst Vorschlag eines grossen Ableitungsmittels, um die Krankheit in der Geburt zu ersticken, von Dr. Tilesius. Nürnberg. 1830.) Der Grund, warum wir die Erfahrungen dieses Arztes im vorliegenden Abschnitt nicht berücksichtigen, ist, dass wir uns nicht klar machen konnten, von welcher Krankheit derselbe eigentlich spricht. Fast auf jeder Seite werden die Ruhr und die Cholera unter einander geworfen. Wenn auch die Ruhr und die Brechruhr hinsichtlich ihrer Ursachen ziemlich übereinstimmen mögen, so sind doch die Krankheiten selbst verschieden; und wer die Erfahrungen, die er bei der einen dieser Krankheiten machte, auf die andere übertragen will, darf wenigstens den Beweis ihrer Identität nicht schuldig bleiben.



In Krankenhäusern aber sollte man während Brechruherepidemien stets warmes Wasser zu Wannenbädern bereit halten, wie es im Jahre 1823 in Astrachan der Fall war; denn wenn das Wasser erst zubereitet werden muss, so kann häufig das Bad, das im Augenblick, wo es der Arzt verordnete, zweckmässig und nützlich gewesen wäre, in der Zeit, wo es wirklich angewendet wird, unnütz, ja schädlich werden. Daher mag es auch kommen, dass sich manche Aerzte ganz dagegen aussprechen. So meint James Annesley, die warmen Bäder schaden in der Brechruhr mehr als sie nützen; übrigens gesteht er, nur 2 bis 3mal von warmen Bädern Gebrauch gemacht zu haben, und desshalb ist ihm kein entscheidendes Urtheil zuzugestehen.

Dampfbäder scheinen die gewöhnlichen Bäder noch an Wirksamkeit zu übertreffen und werden besonders von Russland aus sehr gerühmt, wiewohl man übrigens schon in Indien davon Gebrauch machte. Auch Annesley hält Dampfbäder für zweckmässiger, obgleich er auf beides nicht viel hält. Dr. Seidlitz, der die warmen Wannenbäder am meisten empfiehlt, schlägt für solche Fälle, wo die Verhältnisse des Kranken die Anwendung derselben nicht zulassen, Dampfbäder vor. »Da möchte ein einfaches Dampfbad, wie es nach den Mittheilungen eines englischen Arztes, der während meiner Anwesenheit durch Astrachan reiste, in Indien jetzt häufig angewendet werden soll, die Stelle des schwierigeren Wannenbades ersetzen. Man stellt nämlich unter die (wollene) Bettdecke zu jeder Seite des Kranken ein irdenes Gefäss mit siedendheissem Wasser, hüllet den Kranken fest ein und lässt ihn allenfalls auch den Kopf unter die Decke



stecken. Die Wirkung der eng eingeschlossenen Dämpfe ist in der That schnell und kräftig.» Nach vielfältigen neuern Erfahrungen haben sich solche Dämpfe wirklich als sehr erfolgreich bewährt. P u p r e w versuchte dieselben in Orenburg; er liess den Kranken mit einer warmen Decke bedecken und unter diese ein Gefäss mit heissgemachten Steinen bringen, auf welche dann Wasser und Essig gegossen wurde; diese Dämpfe brachten einen starken Schweiss hervor und wurden je nach den Umständen 2 bis 3mal täglich angewendet. Die Erscheinung des Schweisses diente immer als glückliches Vorzeichen; wenn er unterhalten wurde, genas der Kranke sehr schnell. Solche Dämpfe wurden auch in Moskau von mehreren Aerzten, Dr. Brosse, Wisotzky, Richter 2, Heimann, Sülke und Räsantzow in Verbindung mit diaphoretischen Getränken sehr wirksam gefunden. An ihre Erfahrungen reiht sich auch die eines schweizerischen in Moskau ansässigen Fabrikanten an, der, einem Privatschreiben von daher zufolge, folgende Behandlung mit Glück anwandte: Gleich bei den ersten Symptomen der Krankheit gab er einen vollen Theelöffel voll Magnesia und traf dann schnell Anstalt zu einem Dampfbad. Er nahm eine Badwanne, stellte darein einen Rohrstuhl, durch welchen die Dämpfe gut durchdringen konnten, und legte unter diesen Stuhl einen oder zwei heisse Ziegelsteine. Darauf setzte er den Kranken auf den Stuhl und deckte ihn mit einem Betttuch oder Mantel dermaassen zu, dass nur der Kopf frei und die Wanne rundum zugedeckt war. Um die Dämpfe hervorzubringen, nahm er eine Mischung von Weingeist oder starkem Kornbrannt-



wein mit Essig, goss davon, indem das Betttuch oder der Mantel ein wenig mit der Hand aufgehoben wurde, so viel auf die Ziegelsteine, dass genug Dampf entstand, um den Kranken gehörig in Schweiss zu bringen, was zehn bis fünfzehn Minuten Zeit brauchte. Dabei bemerkte er, dass, sobald die erkalteten Hände und Füße im Dampfbade ihre gehörige Wärme wieder erlangten, der Kranke gerettet war. Während des Dampfbads wurde ein warmes Bett bereitet, auf welches dann der Kranke sammt dem Mantel oder Betttuch gebracht und allmählich von oben bis unten abgetrocknet wurde, wobei man mit dem ihm angezogenen Hemd jeden Theil gleich nach dem Abtrocknen zudeckte. Nach dem Abtrocknen wurde der Patient warm zugedeckt, damit er wieder in Schweiss gerathe, und demselben 5 bis 6 Tassen eines Aufgusses von gleichen Theilen Krausemünze, Chamillen und Lindenblüthen mit etwas Zucker gereicht. Es trat nun eine ausserordentliche Transpiration ein, die ein Wechseln der Wäsche nothwendig machte; sobald der stärkste Schweiss etwas nachgelassen hatte, nahm man eine Mischung von gleichen Theilen Kamphergeist und Essig und rieb damit mittelst Flanell den ganzen Körper des Kranken von oben bis unten ein, was ein ausserordentliches Brennen über die ganze Hautoberfläche bewirkte. Im Falle, dass der Kranke heftige Leibschmerzen haben sollte, empfiehlt der Urheber dieser Behandlungsmethode ein Kissen, das mit Chamillen und Krausemünze angefüllt ist und den ganzen Unterleib bedeckt, erwärmt aufzulegen. Nützt dieses nicht, so soll man das Kissen mit rothem Wein benetzen und so heiss auflegen, als es der Kranke er-



tragen kann. Im Falle, dass der Durchfall sich nicht geben will, soll man den Kranken ein Spitzglas guten Medoc oder eines andern starken rothen Weines mit einem Esslöffel voll gestossenen Birkenkohlen vermischt trinken lassen. Der schweizerische Fabrikant wandte diese Behandlung bei 18 Kranken seines Hauses an, worunter auch seine eigene Frau war, mit einem solchen Erfolg, dass nur zwei davon starben, deren Einer sich jedoch durch grobe Diätfehler, während er Rekonvalescent war, der Andere durch zu lange Verheimlichung der Krankheit seinen Tod selbst zuzog. »Diese Behandlung hat die Meinigen im Hause ausserordentlich beruhigt,« bemerkt der Fabrikant, »da zu sehen ist, dass durch diese Behandlung die Krankheit vollkommen zu heilen ist.« Wir sind zwar nicht der Meinung, dass diese Behandlungsweise untrüglich ist, wie das überhaupt keine sein wird; jedoch mag ihr Erfolg als ein Beweis für die Wirksamkeit der Dämpfe in der Cholera gelten; denn dass die letztern bei dieser Behandlungsweise am meisten wirkten, springt in die Augen.

Dr. Lindgroen rühmt auch die Wirkung aromatischer Essigdämpfe. Professor Blumenthal sagt, das gemeine Volk in einigen Gegenden des südlichen Russlands habe durch Dampfbäder die Wärme des Körpers herzustellen versucht; die Kranken seien in die Dampfbäder gebracht und überdem noch ihr ganzer Körper mit gereinigtem Daegutt (?) eingeschmiert worden; »und wahrlich, fügt er hinzu, erlauben uns die Lokalverhältnisse überall unsere Kranken sogleich in eine gute russische Badstube zu bringen, wir bedürften der innern Mittel nur höchstens als



Nachkur noch und würden in der Behandlung dieser scheusslichen Seuche glücklicher sein, als es leider bisher der Fall war.» Nicht minder lobt Dr. v. Hübenthal die einfachen Dampfbäder. Doch scheinen Dämpfe von reinem oder aromatischem Essig den Vorzug vor einfachen Wasserdämpfen zu verdienen.

Ehe wir die in der Brechruhr angewendeten äusserlichen Heilmittel verlassen, haben wir noch eine anscheinend sonderbare Behandlungsweise zu erwähnen, die früher gegen heftige Brechruhrfälle in Ostindien mit grossem Erfolg angewendet worden sein soll. Es wurde nämlich die Ferse mit einem glühenden Nagel, jedoch nicht tief und mehr an den kallosen Theilen, gebrannt, worauf die Schmerzen meistens sogleich nachliessen und die Wirkung der schweisstreibenden Mittel am sichersten vorbereitet wurde. Dellon, dem anfangs diese Behandlung lächerlich erschien, überzeugte sich von ihrem guten Erfolg so sehr, dass er die Kur selbst annahm und sie sogar an sich selbst anwenden liess. In neuerer Zeit scheint diese Behandlung ganz in Vergessenheit gekommen zu sein.

Die bis jetzt betrachteten Mittel, versüsstes Quecksilber, Mohnsaft, Blutlassen und Hautreize sind diejenigen, welche bei der Behandlung der Brechruhr bisher am häufigsten in Gebrauch gekommen sind; ausser ihnen aber versuchte man noch eine Menge anderer Mittel mit grösserem oder geringerem Erfolg, die wir im Folgenden vollständig aufzuführen uns bestreben werden.

**Aetherischölige Mittel.** — Schon in Ostindien wurde von ihnen häufig Gebrauch gemacht. Bei der so allgemein befolgten Corbyn'schen Behandlungsweise wurde Pfeffermünzöl, 20 Tropfen pro



dosi, in Verbindung mit versüßtem Quecksilber und Mohnsaft gegeben. Corbyn reichte es als karminatives Mittel; und als solches wurde es immer nur zur Unterstützung anderer Mittel gegeben, nie aber als Hauptmittel. Auch in Russland wurde es auf die Empfehlung des Medicinalrathes in St. Petersburg häufig angewendet. Welchen Antheil das Pfeffermünzöl an dem Erfolg der Kuren hatte, ist in der Erfahrung nicht nachzuweisen. Der Staabsarzt Solomow in Astrachan empfahl es bei der Epidemie im Jahre 1830 im ersten Anfang der Krankheit zu 4 bis 5 Tropfen auf Zucker oder in Wasser, gibt aber nicht an, was damit bewirkt worden sei. Ebenso wenig weiss man über die Wirkungen des Kajeputöls etwas Bestimmtes anzugeben, das man neuerlich in Ostindien öfters mit günstigem Erfolg angewandt haben soll. Pupurew wandte es in Orenburg ohne Nutzen an. Das Terpentinöl wurde wegen seiner Wirkung auf die Leber von englischen Aerzten in Ostindien innerlich öfters angewendet, aber wie es scheint, gewöhnlich ohne Erfolg; Sardham will es indessen nützlich gefunden haben (s. oben S. 233). Finlayson empfiehlt es in Klystieren mit Opium anzuwenden. Sehr häufig benützte man es äusserlich zu Einreibungen, wozu es auch nicht unzweckmässig ist.

Professor Dr. H. Blumenthal empfiehlt nach vorausgeschicktem Aderlasse unter andern Mitteln besonders den Baldrian; er machte von der flüchtigen Baldriantinktur Gebrauch, da er überhaupt meint, man könne sich in der Brechruhr nur der Tropfenform mit einigem Erfolge bedienen, weil man Alles in möglichst kleinem Volumen reichen müsse, um den



Magen nicht zu belästigen. Man soll nach ihm die Baldriantinktur u. dgl. Mittel, (Aetherarten, Liq. C. C. succ, u. s. w.) entweder auf Zucker oder in kleinen Portionen eines feurigen Weines, wie Madera, Ungerwein u. dgl. mehr geben. Im weitem Verlaufe der Krankheit soll man dann zu Infusionen von Valeriana, Arnica, Serpentaria u. s. w. mit einem Zusatze von Aether übergehen, die bald dem Kalmus, der Kaskarille und den Mineralsäuren weichen müssen, welche letztere die Nachkuhr vollenden sollen. Von andern Aerzten wurden auch Infusionen von Angelica, Contrajerva, Pfeffermünz, Melissen, Chamillen, Hollunderblüthe u. dgl. empfohlen, und in Russland scheinen manche Kranke bloß mit solchen diaphoretischen Getränken in Verbindung mit äusseren Hautreizen, besonders Dampfbädern, hergestellt worden zu sein, wie diess auch 1823 in Baku der Fall war. Besonders wichtig scheinen diese Aufgüsse dann zu sein, wenn ein Schweis ausbricht, um die Thätigkeit der Haut zu unterstützen. Ausserdem empfehlen sich mehrere dieser Mittel durch ihre ausgezeichnete Wirkung auf das Nervensystem, und mehrere russische Aerzte rühmen sie desshalb für den Zweck, den Uebergang der Brechrühr in ein nervöses Fieber zu verhüten. Die destillirten Wasser sind passende Vehikel für andere Arzneistoffe.

Kampher. — An die ätherischen Oele reiht sich der Kampher an, der gleichfalls öfters in der Cholera versucht wurde und eine häufigere Anwendung zu verdienen scheint. Von seiner äusserlichen Anwendung war bereits die Rede. Auf der Morizinsel soll eine Mischung von Olivenöl mit Kampher und Naphtha in-



nerlich genommen viele Kranke gerettet haben. William Scot sagt, der Kampher habe sich in Verbindung mit versüßtem Quecksilber und Opium sehr nützlich gezeigt. Dr. C. Livingstone wandte in Kanton den Mohnsaft in einem Kampherjulep, in Verbindung mit Salpeterminaphtha an und versichert, er habe davon gewöhnlich einen so glücklichen Erfolg gesehen, dass er selten Ursache gehabt habe, irgend ein anderes Mittel zur Linderung anzuwenden. In solchen Fällen, wo durchaus alles in den Magen Gebrachte wieder ausgebrochen wurde, wurde von Dr. Vos und vielen andern Aerzten in Bengalen folgendes Verfahren mit dem besten Erfolge eingeschlagen; zwei Gran Opium und vier oder fünf Gran Kampher wurden in sechs und dreissig Tropfen Spirit. ammon. aromat. aufgelöst und zwei Theelöffel voll Wasser hinzugesetzt; wurde auch dieses wieder ausgebrochen, so wiederholte man nach einer halben Stunde eine Dosis der Auflösung von einem Gran Opium und drei Gran Kampher. Oefters wurde dabei auch ein Klystier mit Asa foetida und einem Theelöffel voll Laudanum gesetzt. Auch in Russland wurde vom Kampher öfters Gebrauch gemacht; Sokolow in Orenburg rühmt namentlich denselben und sagt, dass derselbe in Verbindung mit Calomel und Opium in vielen Fällen weit mehr geleistet habe, als letztere allein. Wir bringen hierbei in Erinnerung, dass der Kampher von mehreren Aerzten in unserer gewöhnlichen Cholera sehr empfohlen worden ist. Dr. Blang schreibt seinem Liquor nervinus eine spezifische Kraft bei der Brechruhr zu; derselbe ist eine Auflösung von zwei Skrupeln Kampher in einer halben Unze Hoffmann'scher Tropfen.



Der Kampher ist eines der wirksamsten erregenden Mittel, verbreitet seine Wirkung schnell über alle Systeme und Organe; dabei ist diese Wirkung dauernder und anhaltender, als die von verwandten erregenden Mitteln. Unter seinen Wirkungen auf einzelne Systeme und Organe tritt besonders hervor seine nervenstärkende und krampfstillende Eigenschaft, seine ausgezeichnete Wirkung auf die Thätigkeit der Haut; Alles Eigenschaften, welche ihn in der Cholera empfehlen. Besonders passend erscheint er auch wegen seiner beruhigenden Wirkung auf die Harnwerkzeuge. Man trifft bei Leichenöffnungen von Personen, die an der Brechruhr gestorben sind, öfters ein Erythem der Harnblase, wie es auch in Folge der Anwendung von spanischen Fliegen so häufig eintritt, wobei bekanntlich der Kampher als das beste Mittel sich durch lange Erfahrung erprobt hat. In der Cholera ist es ein gutes Zeichen, wenn der Harnzwang aufhört und wieder reichlich Urin gelassen wird; und es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Kampher darauf günstig hinwirken wird.

Ein Uebelstand beim Gebrauch des Kamphers ist es, dass er häufig vom Magen nicht ertragen wird. Es scheint übrigens, dass man sich in der Brechruhr nicht besonders davor zu fürchten hat, da, wie wir so eben angeführt haben, manche Aerzte die Erfahrung machten, dass, wenn die Kranken alle ihnen gereichten Mittel wieder ausbrachen, sie diese bei sich behielten, wenn man denselben Kampher zusetzte. Indessen beklagt sich doch Professor Blumenthal gerade in dieser Beziehung über den Kampher. »Anfänglich glaubte ich, sagt er, der Kampher müsse das Mittel sein, wel-



ches hier hauptsächlich Anwendung findet, weil er Diaphoreticum und Nervinum zugleich ist, und versuchte ihn daher in verschiedenen Formen, — aber in der Regel wurde er nicht vertragen, und selbst da, wo Erbrechen nicht zugegen war, gab ihn der Magen doch schnell wieder zurück. Dasselbe ist immer der Fall, wenn man sonst zweckmässige Mittel in der Form von Pulvern oder Mixturen darreicht. — Selbst in Naphtha aufgelöst wurde der Kampher selten ertragen.» Wahrscheinlich hätte Blumenthal besseren Erfolg von diesem Mittel gesehen, wenn er es in Oel gegeben hätte, wie man es auf der Morizinsel anwendete. Auch ein Zusatz von Mohnsaft wird den Kampher in dieser Beziehung korrigiren. Der Kampher möchte besonders in der Periode des Collapsus als eines der wirksamsten Mittel anzusehen sein, und es ist zu wünschen, dass derselbe in Zukunft mehr, als bis jetzt geschah, bei der Behandlung der Cholera benützt werde.

Moschus, Castoreum. — Auch diese Mittel verdienen mehr beachtet zu werden; beide wurden schon in Indien öfters angewendet, ohne dass die Erfahrungen darüber genauer bekannt wären. Der Staatsarzt Solomon sah im vorigen Jahre in Astrachan einen Fall, wo Erbrechen, Durchfall, Erkalten der Glieder und Sinken des Pulses durch die Anwendung von Moschus und Bibergeil zu 28 Gran, innerhalb 12 Stunden in 8 Gaben, geheilt wurden, ohne dass Blut entzogen wurde. In verzweifelten Fällen wendete er mit Erfolg Moschus, Bibergeil und Kampher verbunden bei schon weit vorgerückter Krankheit an. Ebenso lobt auch Dr. Blumenthal die Moschustinktur. Be-



rends erklärt den Moschus und das Bibergeil für sehr wirksame Mittel in der gewöhnlichen Brechrühr.

Phosphor. — Unsers Wissens wurde der Phosphor blos von Dr. John Adam angewandt, und zwar in drei Fällen von Cholera, von denen nur einer glücklich ablief. In Ermanglung von Naphtha, um den Phosphor darin aufzulösen, gab ihn Adam in Substanz in der bedeutenden Gabe von 2 bis 3 Gran. In einem der tödtlich abgelaufenen Fälle hatte der Kranke nicht weniger als zwölf Gran Phosphor in kleinen Stücken eingenommen. Es gehört kein geringer Grad von Keckheit dazu, den Phosphor auf diese Art in Substanz anzuwenden; das traurige Beispiel eines Apothekerlehrlings, der das Opfer seiner tollkühnen Versuche mit dem Phosphor wurde, wovon vor wenigen Jahren die öffentlichen Blätter berichteten, ist noch in frischem Andenken. Adam fordert zu fernern Versuchen mit dem Phosphor auf; diese müssten aber jedenfalls mit einer Auflösung desselben in Naphtha oder besser in Oel gemacht werden; übrigens scheint der Phosphor bei dem Kongestionszustand des Darmkanals in der Brechrühr nicht am Platze zu sein, da er so leicht Magenentzündung bewirkt.

Ammoniummittel. — Diese wurden nicht selten in der Brechrühr angewendet, indessen immer mit andern innerlichen Heilmitteln verbunden, so dass in der Erfahrung nicht nachzuweisen ist, welchen Antheil sie an dem Erfolg der Behandlung hatten. James Annesley gab neben Calomel und Mohnsaft gewöhnlich eine Mischung aus Aq. Ammon. (Liq. Ammon. caust.) 35 Tropfen, Schwefeläther 2 Drachmen und  $1\frac{1}{2}$  Unzen Kamphermixtur. Von dieser Mix-



tur wurde alle 10, 15 oder 20 Minuten ein kleiner Esslöffel voll gegeben. Die flüchtige Salbe wurde öfters zu Einreibungen benützt. Pupurew empfiehlt das essigsaure Ammonium als diaphoretisches Mittel. Die ausgezeichnete Heilkraft dieser Mittel in andern Krankheiten, wo ähnliche Indikationen zu erfüllen sind, wie in der Brechruhr, sprechen zu Gunsten ihrer Anwendung in der letztern.

Geistige Mittel. — Auch diese wurden gewöhnlich zur Unterstützung anderer Mittel gegeben, doch scheinen sie oft einen nicht unbedeutenden Antheil an dem Erfolg der Behandlung gehabt zu haben. Gegen ihren Gebrauch haben die wenigen Aerzte, welche die Brechruhr für entzündlicher Natur halten, sehr geeifert. Dagegen half nach Sardham den Eingebornen in Ostindien oft eine Gabe Brantwein. Sehr oft wurde dieser als Vehikel für andere Arzneistoffe benützt, besonders für Kampher und Opium. In Persien gab man Mohnsaft und Branntwein mit gutem Erfolg. Ebenso machte man in Ostindien von verschiedenen Weinen Gebrauch, entweder rein oder mit Wasser vermischt. Nach Schnurrer hält man neuerlich in Ostindien viel auf den Rheinwein und sieht ihn als ein Hauptmittel an. Interessant und sehr zu Gunsten des Weines sprechend ist folgende Thatsache, die der Missionär Dietrich aus Schuscha berichtet: »Der Bruder Zaremba, in dessen Armen Saltet an der Cholera gestorben war, kam dem Geiste nach ziemlich munter, aber in grosser körperlicher Schwachheit bei uns in Schuscha an. Kaum hatte er sich zwei Tage in unserm Missionshause niedergelassen, um von den Anstrengungen und kummervollen Erfah-



rungen seiner Reise im brüderlichen Schoose auszu-  
 ruhen, so brach diese fürchterliche Krankheit den 28.  
 Sept. (1830) an ihm hervor und nahm den folgenden  
 Tag so sehr zu, dass alle Hoffnung für seine Rettung  
 zu verschwinden schien. In der Nacht vom 29. auf  
 den 30. liess mich unser leidender Bruder um drei  
 Uhr Morgens zu seinem Krankenlager rufen, um mir  
 noch seinen letzten Willen mitzutheilen. Nach einigen  
 Stunden stiller Geistesfassung verlangte er, dass man  
 ihm zur Erleichterung seiner Schmerzen warmen  
 Wein zum Trinken und zu Umschlägen auf den Magen  
 geben möchte. Da aber dieses bis jetzt durchgängig  
 für tödtliches Gift in dieser Krankheit gehalten wurde,  
 so konnte sich Bruder H., der ihn aufs treulichste  
 verpflegte, unmöglich entschliessen, ihm Wein zu rei-  
 chen, bis endlich der Sterbende ihn durch die feste  
 Erklärung dazu nöthigte, dass hoffnungslosen und be-  
 reits aufgegebenen Kranken Alles, was sie zur Er-  
 quickung und Erleichterung der Schmerzen wünschen,  
 gegeben werden müsste. So erhielt er denn endlich  
 warmen Wein, und die Arznei wurde bei Seite ge-  
 setzt. Als ich am andern Morgen wieder zu dem  
 Kranken kam, war er so munter, dass er Speise ver-  
 langte, und er besserte sich von einer Stunde zur  
 andern so sichtbar, dass wir am Morgen den 1. Oct.  
 der süssen Hoffnung seiner Wiedergenesung uns hin-  
 geben durften.» Einem andern Briefe aus Schuscha  
 zufolge genas der erwähnte Zaremba vollkommen,  
 und die andern Brüder, die er angesteckt hatte, folg-  
 ten seinem Beispiele und genasen ebenfalls. Diese  
 Erfahrungen sind durchaus unverdächtig und beweisen,  
 dass der Wein ein nicht zu übersehendes Unter-



stützungsmittel in der Behandlung der Brechruhr abgibt. Auch in der gewöhnlichen Cholera wird ein guter Wein nicht unpassend den Getränken beige-mischt und dient vorzüglich zur Milderung des so ausnehmend quälenden Durstes. Naphthen wurden gleichfalls oft mit Glück bei der Behandlung der Brechruhr benützt.

Kaltes Wasser, Eis. — Wie die Aerzte bei der gewöhnlichen Cholera sich noch nicht darüber vereinigt haben, was man den Kranken am besten zu trinken gebe, so findet in dieser Beziehung auch bei der morgenländischen ein grosser Gegensatz der Ansichten statt. Einestheils werden warme, aromatische Getränke empfohlen, anderntheils kaltes Wasser, das wieder von Andern geradezu für Gift erklärt wird. Ein Arzt will, man soll sich in der Krankheit des Trinkens enthalten, ein Anderer meint, man soll dem gewaltig mahnenden Instinkt folgen und kecklich trinken. Corbyn und Boyle rathen, das heftige und dringende Verlangen der über grossen Durst und starkes Brennen in den Gedärmen und der Herzgrube klagenden Kranken nach kaltem Wasser zum Trinken niemals zu befriedigen, da Viele während des Trinkens ihren Geist aufgegeben haben; sie empfehlen vielmehr warmes Reiswasser als Getränke zu geben. Es fragt sich noch sehr, ob in den von Corbyn bezeichneten Fällen das Trinken von kaltem Wasser wirklich die Ursache des tödtlichen Ausgangs war; das *post hoc ergo propter hoc* ist bekanntlich ein sehr trüglicher Schluss. Es stehen vielmehr ganz konträre Erfahrungen der Behauptung Corbyn's entgegen; schon früher erwähnten wir Dr. Gravier's,



der seinen Kranken mit dem besten Erfolg kaltes Wasser gegeben und zwanzig Personen ganz allein durch dasselbe geheilt haben will. Gravier erzählt einige Fälle, um die gute Wirkung des kalten Wassers zu beweisen. Velly Tschetty, Dollmetscher, ein starker kräftiger Mann, ward Morgens früh mit grosser Heftigkeit befallen. Erbrechen, Stuhlgänge, Krämpfe, kalte Schweisse traten zugleich auf. Der indische Arzt Rassendren, der gerade bei dem Kranken war, liess ihn sogleich einige Gläser Wasser trinken, welches zum Abkühlen hingestellt war. Eine Stunde nachher hatten alle Zufälle aufgehört, der Kranke schlief ruhig und fühlte am Abend nur noch geringe Müdigkeit, die sich am andern Morgen ganz verlor. Ein zweiter Fall ist folgender: Ein Landmann war seit siebzehn Stunden in einem gefühllosen Zustande, so dass seine Kameraden ihn für todt hielten. Rassendren ward gerufen, fand keinen Puls, keine Wärme mehr und setzte, um wenigstens Nichts versäumt zu haben, fünfzehn Blutigel in die Magengegend. Gravier, dem er sogleich die Anzeige gemacht, gab, als er den Kranken sah, alle Hoffnung auf; indessen hiess er ihm etwas frisches Wasser in den Mund giessen und die Gliedmaassen mit kameelhaaren Decken reiben. Da der Kranke das eingegossene Wasser niedergeschluckt hatte, ward eine zweite Portion eingefüllt; er griff mit der Hand nach der Magengegend, um das Tuch, womit diese bedeckt war, wegzureissen. Die Blutigel hatten sich vollgesogen, fielen ab; man liess das Blut fliessen. Die Wärme des Körpers hatte sich gehoben, nur die Gliedmaassen waren noch kalt; mit dem Reiben so



wie mit den kleinen Gaben Wassers wurde fort gefahren. Nach zwei Stunden war die Wärme überall gleich, allein der kleine, schnelle Puls, die entstellten Züge, die Unruhe, die sich auf dem Gesichte aussprach, die Begriffsverwirrung deutete noch auf eine heftige Reizung in der Schleimhaut des Darmkanals. Nach wiederholtem Aufstossen erfolgten Erbrechen und ziemlich heftige Nervenzufälle. Da das Wasser allein nicht ausreichte, wurden dreissig Blutigel auf die Magengegend gesetzt. Hierauf trat in der Nacht völliges Nachlassen der Krankheit ein, am andern Morgen bekam der Kranke Gummiwasser, am dritten versüßtes Reiswasser und bis zum sechsten Tage Hühnersuppe. Am siebenten Tage stand der Kranke auf, ohne sich besonders schwach zu fühlen, was auch durch seine Bewegungen an den Tag gelegt ward. Der dritte Fall, dessen Gravier erwähnt, ist folgender: »Der indische Bediente des Kapitan Delarche vom Sepoybataillon, ward von der epidemischen Gastro-entérite befallen. Mohnsaft, Aether, bittere Mittel, Ingweraufguss waren angewandt und wieder ausgebrochen. Ein herbeigerufener indischer Arzt bereitete eine Salbe aus Citronensaft, Alaun und Eisenoxyd und rieb dem Kranken damit die Augen ein; der dadurch erregte Schmerz reizte den Kranken bis zur Wuth, das Erbrechen nahm zu, er schlug um sich, seine Umgebungen flohen, er verfolgte sie, traf auf seinem Wege einen vollen Wasserbehälter, stürzte sich hinein und trank mehrere Minuten lang mit grosser Gier. Man umringte ihn, er blieb ruhig im Wasser; eine Ohnmacht war die Folge der ungeheuren Menge Wassers, die er hinuntergestürzt hatte; man



zog ihn aus dem Wasser, trocknete ihn, brachte ihn zu Bette; er schlief eilf Stunden lang sehr ruhig, und erwachte ohne Erbrechen, ohne fernere Stühle, ohne irgend eine Klage, allein er ist seitdem blind. Diesen Fall kennt ganz Pondichery.» — Diese Fälle mögen dazu dienen, nicht so ohne Weiteres die Meinung der meisten englischen Aerzte anzunehmen, dass das Trinken des kalten Wassers in der Cholera höchst gefährlich sei. Indessen haben wir früher unser Misstrauen gegen die Erfahrungen Gravier's geäußert, und wir würden auch hier auf dieselben kein besonderes Gewicht legen, wenn ihnen nicht anderweitige Erfahrungen zur Seite stünden. Der Staatsarzt Solomon sagt, er habe bei heftigem Erbrechen mit grossem Nutzen die Präkordien mit Eis waschen, kalte Umschläge darauf legen und innerlich Eiswasser viertelstündlich zu einem Desertlöffel voll geben lassen. Ein Preusse, der in Saratow die Krankheit überstand, meldet in der Königsberger Hartung'schen Zeitung, 1830, nro. 138: »Vierzehn Tage hielt so die Krankheit in der Stadt an, ohne dass ich auch nur den geringsten Anfall gehabt hätte, obgleich ich Kranke und Sterbende fast täglich besuchte; und schon glaubte ich mich mit meiner festen Natur brüsten zu dürfen, als auch ich davon befallen wurde, und zwar so heftig, dass ich den zweiten Tag schon fast unkenntlich war. Ich konnte mich indessen nicht entschliessen, die geringste Arznei zu nehmen; das Einzige, was ich während der Krankheit genoss, waren Häringe, Essig und ein paar Eimer Wasser, Alles, wie es meine Neigung erforderte, und heute, nach 14 Tagen, bin ich wieder völlig stark und hergestellt.» Ganz vor-



zöglich fand Professor Dr. Blumenthal das Eis, um das ausserordentliche Erbrechen zu stillen. Er bemerkt in dieser Beziehung: »In Fällen, wo der Magen so reizbar war, dass er durchaus nicht das Geringste mehr nehmen konnte, sondern alles Dargebrachte ohne Ausnahme schnell wieder wegbrach, griff ich zum Eise und bemerkte zu meiner grossen Freude, dass dieses Mittel hier ausserordentliche Hülfe leistet. Jetzt lasse ich überall, wo ein heftiges Erbrechen die Anwendung innerer Mittel vereiteln will, alle 5 Minuten, oder so oft, als sich nur nach dem Einnehmen der Arznei Uebelkeit einstellt, eine Eispille schlucken, worauf die Uebelkeit jedesmal wieder verschwindet. Ja, wo auch nicht einmal starkes Erbrechen zugegen ist, bediene ich mich des Eises, nur um den brennenden Durst des Kranken zu löschen, indem das auf diese Art in den Magen gebrachte Quantum von Flüssigkeit nicht bedeutend ist, das quälende Gefühl des Durstes aber dadurch am sichersten und schnellsten gestillt wird. Dagegen ist alles laue Getränk, selbst nur verschlagenes Wasser, durchaus zu widerrathen, indem es das Erbrechen erregt, ohne den Durst stillen zu können. Die Patienten selbst fühlen die wohlthätige Wirkung des Eises und verlangen mit einer heissen Begierde darnach, ja es scheint, auf sie wie ein Analepticum zu wirken, und Kranke, deren Zustand schon fast keine Hoffnung mehr gewährte, wurden durch den anhaltend fortgesetzten Gebrauch des Eises wieder hergestellt. Nicht als ob das Eis für sich die Genesung bewirken könne, aber indem es die excessive Reizbarkeit des Magens herabstimmt, schafft es den indicirten innern Mitteln bessern Eingang, die



dann durch Wiederbelebung des arteriellen Systems eine wohlthätige Krise herbeizuführen vermögen. Sobald der Puls sich zu heben beginnt und ein allgemein ausbrechender Schweiss die Heftigkeit der Symptome mildert, muss der Gebrauch des Eises natürlich eingestellt werden, damit es nicht die Krise störe, und in dem Maasse, als das Athmen freier wird und der Puls sich hebt, müssen die flüchtigen Reize mit permanenteren vertauscht werden.»

Schon in alten Zeiten wurden öfters kalte Getränke in der Cholera angewendet; wir finden bereits bei Aretaeus das kalte Wasser empfohlen, ebenso bei Coelius Aurelianus. Auch versichert G. Cleg-horn in seinen Beobachtungen über die epidemischen Krankheiten, die 1744 bis 1749 in Minorca geherrscht, (a. d. Engl. übers. von J. C. G. Ackermann, Gotha, 1776. S. 222) die spanischen Aerzte hätten in der äusserst heftigen Cholera Nichts wirksamer gefunden, als den Gebrauch des kalten Wassers. S. H. Vogel bemerkt in Beziehung auf das Trinken kalten Wassers und die kalten Umschläge: »Wenn alles Andere, was näher liegt, Nichts hilft, was hat man zu verlieren, auch diese Mittel zu versuchen! Der kluge, umsichtige Arzt weiss Zeit und Umstände zu solchen Maassregeln gehörig zu benutzen und findet nicht selten unerwartete Hülfe von Dingen, die ohne alle Ueberlegung angewendet, allerdings Schaden thun könnten.»

Von der Ansicht, dass man in der Brechrühr das Trinken untersagen müsse, scheint man neuerdings ganz zurückgekommen zu sein. Bei der Epidemie in Orenburg liess man die Kranken vieles schleimige Getränk, Abkochungen von Gerstengraupe, Perlgraupe,



Reis u. dgl. trinken, an andern Orten in Russland häufiger Aufgüsse von aromatischen Pflanzen, die auch von Conwell empfohlen wurden. Sydenham liess bei der Cholera dünne Hühnerbrühe trinken und sie auch in Klystieren beibringen; und die meisten Aerzte folgen in der Behandlung der gemeinen Brechruhr seinem Beispiel, indem sie nur warme Getränke reichen. Andere jedoch halten sich an kühle Getränke, die den Kranken besser zusagen; ganz besonders eignen sich dazu kohlensaure Mineralwasser, Selterser, Fachinger Wasser u. dgl., von deren guter Wirkung ich mich in einigen schweren Fällen von Brechruhr überzeugt habe, wobei die Kranken mir für das ihnen dadurch bereitete Labsal nicht genug danken zu können versicherten. William Scot empfiehlt einen Zusatz von Pflanzen- und Mineralsäuren zu den Getränken; auch in Orenburg setzten mehrere Aerzte den schleimigen Getränken gewöhnlich Sauerhonig zu, während andere namentlich die vegetabilischen Säuren für nachtheilig erklären und behaupten, dass dieselben sogar in der Rekonvalescenz plötzlich einen Rückfall zu bewirken vermögen. James Annesley empfiehlt Limonade.

Mineralsäuren. — Von der Salzsäure, Schwefelsäure und Salpetersäure machte man in Ostindien sowohl als in Russland bei der Behandlung der Brechruhr Gebrauch; jedoch fehlt es an genaueren Nachweisungen, was damit geleistet wurde; mehrere Aerzte loben sie wegen ihrer Wirksamkeit gegen den so ausnehmenden Durst. Dieses Symptom scheint allerdings besondere Berücksichtigung zu verdienen; mit vielem Getränk ist der Durst nicht zu



löschen, auch wird dasselbe gewöhnlich schnell wieder ausgeworfen, und die Eispillen Blumenthal's möchten doch nicht durchgängig anzuwenden sein. Es handelt sich also um ein Getränk, das in geringer Quantität den Durst zu mildern geeignet ist, und dazu möchten sich vor Allem Mineralsäuren empfehlen, entweder mit Wasser oder mit diaphoretischen Getränken verdünnt. Ueberdiess erscheinen sie auch wegen ihrer Wirkung auf die Blutmasse und Blutbewegung als passend; sie wirken den Kongestionen entgegen, bewirken eine gleichförmigere Vertheilung des Bluts und bessern die Mischung desselben, Alles Umstände, auf welche bei der Behandlung der Brechrühr Rücksicht genommen werden muss. Indessen fällt in die Augen, dass sie doch keineswegs unter die Hauptmittel gesetzt werden können, da sie weder die aborme Nerventhätigkeit zu reguliren noch einen kräftigen Trieb gegen die oberflächlichen Theile zu bewirken im Stande sind; dagegen können sie andere Mittel sehr passend unterstützen und korrigiren. Namentlich möchten sie in Verbindung mit Mohnsaft sehr heilsam wirken; eine solche Verbindung wurde in der gewöhnlichen Brechrühr von englischen Aerzten mit grossem Erfolg angewendet. Thomas Hope wandte sie zuerst in der Dysenterie an; er kam durch Zufall darauf. Ein Ruhrkranker, den er behandelte und bei welchem die gewöhnlichen Mittel ohne Erfolg waren angewendet worden, beschloss auf seine Gefahr hin eine Arznei zu nehmen, die Hope für seine Anmme geschickt hatte, welcher die Erfüllung ihrer Pflicht schwer fiel und die über unmässigen Durst klagte. Die Arznei bestand aus zwei Drachmen salpetriger



Säure, zwei Gran Opium, zwei Unzen Wasser, und heilte die Ruhr vollkommen. Darauf gab Hope diese Arznei einem andern Ruhrkranken, und auch bei diesem leistete sie vortreffliche Dienste. In einem dritten Falle gab er die Säure ohne das Opium, erreichte aber seine Absicht nicht eher, als bis sie mit einander kombinirt wurden, worauf die Heilung erfolgte. Hope theilte diese Erfahrungen im Jahr 1800 im London medical Journal mit und setzte seitdem in seiner Praxis die Anwendung dieses Mittels mit gleichem Erfolge fort. Im Jahre 1819 wurden in einem Hospital Versuche mit dem Mittel angestellt; es waren 26 Ruhrkranke da; von diesen wurde bei 15 die Hope'sche Arznei angewendet, davon wurden 12 hergestellt und 3 starben; und von den andern 11 Patienten, die auf die gewöhnliche Weise behandelt wurden, genasen nur 3, und 8 starben. Im Jahre 1821 behandelte Hope auch viele Fälle von Cholera mit seinem Mittel und stellte alle seine Kranke her, ebenso wieder im Jahre 1825. Die gewöhnliche Form, in der er die Arznei anwandte, war folgende:

R. Acid. nitrosi drachm. I,  
 Mixt. camphor. unc. VIII,

M. et adde

Tinct. Opii gtt. XII,

S. a. 3 bis 4 St. den vierten Theil z. n.

Ein kleiner Zusatz von Syrup. papav. rhoeados verbesserte nicht bloß das Aussehen der Mixtur, sondern schien auch in manchen Fällen ihre Wirkung zu verstärken. Das Mittel ist wohlschmeckend, löscht den Durst, entfernt bald die Heftigkeit des Schmerzens und verschafft gewöhnlich eine schnelle und dauernde



Hülfe. Während des Gebrauchs desselben ist nichts Anderes zu beobachten, als dass man die Hände und Füße warm hält, den Körper so viel als möglich vor Kälte und Zugluft verwahrt, und warmes Gerstenwasser oder dünnen Haferschleim und eine Speise aus Sago oder dem Mehl der Maniokwurzel geniessen lässt. Die erste Dosis wurde häufig mit einer beträchtlichen Quantität grüner Flüssigkeit durch Erbrechen ausgeworfen doch bemerkt Hope, dass in allen diesen Fällen die Genesung am schnellsten erfolgte. Flanell mit heissem Wasser ausgerungen und auf das Abdomen gelegt und mit heissem Wasser angefüllte Flaschen an die Füße applicirt, brachten gewöhnlich einen profusen Schweiss hervor, und die zweite Dosis der Arznei verursachte meistens einen gesunden und erquickenden Schlaf. Hope macht ausdrücklich aufmerksam darauf, dass das Mittel Acidum nitrosum mit Opium, nicht Acidum nitricum ist; letzteres zeigte sich nicht wirksam. Diese Hope'sche Behandlungsweise verdient gewiss, auch in der morgenländischen Brechruhr versucht zu werden; doch werden hier stärkere oder wenigstens öfter wiederholte Gaben nothwendig sein.

Auch das Chlor wurde in Russland innerlich angewendet, und man behauptet, mit gutem Erfolg. Ein Kranker soll in seinem heftigen Verlangen nach Getränk ein Glas voll Chlorkalkauflösung, das zur Desinfektion der Luft hingestellt war, ausgetrunken haben und dadurch wieder hergestellt worden sein. Von den Erfahrungen über dieses Mittel ist nichts Genaueres bekannt.

Bekannt sind die Wirkungen der Kohlensäure,



die erhöhte Reizbarkeit des Magens zu beruhigen und das dadurch entstandene Erbrechen zu stillen, und ihre Anwendung in dieser Beziehung ist so allgemein, dass man sich nicht genug wundern kann, dass von ihr bei der Behandlung der Cholera so wenig die Rede ist. Allerdings kann sie in derselben nur als symptomatisches, gegen das Erbrechen gerichtetes Mittel betrachtet werden, aber gerade in dieser Rücksicht ist sie äusserst wichtig, weil durch das sich immer wiederholende Erbrechen die Wirkung der kräftigsten Mittel gehindert wird. In Ostindien scheint man wenig oder keinen Gebrauch davon gemacht zu haben; dagegen wurde die Riverische Potion bei der Epidemie in Orenburg von mehreren Aerzten mit gutem Erfolg angewendet.

Säurewidrige Mittel. — Wie man bei so vielen Angaben über die morgenländische Cholera auf direkte Widersprüche stösst, so auch hier wieder. Während die Einen Säuren geben, geben die Andern absorbirende Mittel. Ainslie, der übrigens nie die epidemische Cholera sah, schlug die von ihm in sporadischen Fällen mit Erfolg angewandten Antacida vor, besonders kalcinirte Magnesia. Nach Dr. Conwell wurden wirklich in Ostindien Gaben von einem Skrupel oder einem halben Quentchen kohlensaurer Magnesia in frischer Milch in Zwischenräumen von einer halben bis zu einer ganzen Stunde gegeben und sollen sich bei den Eingebornen in vielen Fällen nützlich gezeigt haben; doch bemerkt er dabei, er wisse nicht, ob man noch andere Mittel damit verbunden habe. Auch in Russland gab man neuerlich Magnesia, namentlich bei der



Khlebnikow'schen (s. Bd. I. S. 131 u. f.) und bei der von einem Fabrikanten angegebenen, oben (S. 266 u. f.) mitgetheilten Behandlungsweise. Was man eigentlich damit bewirken wollte, ist nicht klar. Die Magnesia neutralisirt die Säure, die sie in den ersten Wegen antrifft, und wirkt dann in dieser Verbindung laxirend. Die Ausleerungen in der morgenländischen Brechruhr sind aber nach allen Angaben in der Regel durchaus nicht sauer, und wenn sie es auch wären, so könnte man offenbar nicht diese Säure als den Grund der Krankheit ansehen, sich desshalb auch nicht mit der Magnesia begnügen. In Orenburg gaben mehrere Aerzte die Magnesia gegen das Ende der Krankheit, wenn es nöthig war, die ersten Wege zu reinigen, und liessen dazu ein säuerliches Getränk nehmen; man gab hier also eigentlich nicht Magnesia, sondern ein laxirendes Mittelsalz, von dem wir nicht wissen, ob es vor dem gewöhnlich angewendeten Vorzüge besitzt.

Laxiermittel. — Ein französischer Arzt auf der Morizinsel will von wiederholten Gaben schwefelsaurer Bittererde grossen Nutzen gesehen haben. Nach Conwell wurden in einem sehr verzweifelten Falle kleine, wiederholte Gaben von Neutralsalzen mit dem glücklichsten Erfolge gegeben; jedoch fügt er hinzu, dass sie, von Laien angewandt, in verschiedenen andern Fällen tödtlich gewirkt haben. Die mohamedanischen Aerzte in Ostindien, welche in der Behandlung der Cholera der arabischen Schule folgten, gaben im Anfange der Krankheit eine saturirte Auflösung von Kochsalz und andern auflösenden Mitteln, um die ersten Wege zu reinigen, und darauf Opium und aromatische Mittel; mit welchem



Erfolg, wird nicht gesagt. Der Staatsarzt Solomon wendete im Anfang der Krankheit gegen den Druck in der Herzgrube, wenn dabei häufige Uebelkeit, gelbe Zunge, Verstopfung und Gliederschwäche verbunden waren, Salmiak mit Melissenwasser an. Diese Mittel mögen bei einer etwaigen gastrischen Komplikation mit Vortheil angewendet worden sein, die übrigens, wie Hübenthal sich ausdrückt, in dieser Krankheit noch seltener als die Aloeblüthe in unsern Gärten angetroffen wird. Ausserdem aber taugen sowohl Mittelsalze als andere abführende Mittel nicht, wenigstens nicht im Anfange der Krankheit; nach eingetretener Besserung aber wurden sie häufig wegen Verstopfung \*) oder Ansammlung von gastrischen Kruditäten nöthig gefunden, namentlich von Aerzten, welche die Krankheit von Anfang mit Calomel und Opium behandelt hatten. Man wählte dazu Rhabarber, Sennesblätter, Aloe, Jalappe, Wunderbaumöl u. s. w., auch versüßtes Quecksilber; ja selbst drastische Mittel wendete man an, Koloquinten, Gummigutt, Scammonium, was wohl nicht nachgeahmt zu werden verdient. Am besten scheint das Wunderbaumöl zu wirken, weil bei ihm der reizende abführende Stoff durch das Oel gehörig eingehüllt ist \*\*). Auch wird es von vielen Aerzten sehr

---

\*) Dagegen wurden öfters mit Nutzen blos eröffnende Klystiere angewendet.

\*\*) Sehr beachtenswerth ist das Lob, das Dr. v. Hübenthal den öligen Mitteln überhaupt ertheilt. Er gab das Opium in öligen Emulsionen oder auch in reinem Oele aufgelöst; blos bei habituellen Säufern verband er dasselbe mit geistigen Mitteln. „In dieser seltsamen Krankheit, sagt er, zeigt auch das Oel eine seltsame Wirkung; es löscht nämlich den



empfohlen, und zwar nicht bloß im letzten Stadium der Krankheit, sondern einige gaben es auch gleich im Anfang. Besonders rühmt Henderson dieses Mittel; wir sahen schon oben beim Calomel, dass dieser Arzt der Meinung ist, es komme bei der Behandlung der Cholera Alles aufs Abführen an. Bei Europäern gab er zu diesem Zwecke das versüsste Quecksilber, bei den Eingebornen das Wunderbaumöl. »Um den ausserordentlichen Erfolg zu zeigen, mit welchem ich diese Behandlung angewendet habe, sagt Henderson, kann ich versichern, dass ich niemals einen Patienten an dieser Krankheit verloren habe. (Ob sich diese Versicherung bloß auf die Eingebornen, oder auch auf Europäer bezieht, ist nicht klar.) Ich fange mit einer starken Dosis Ricinusöl an, welches in mässigen Dosen alle halbe Stunden oder vielleicht in kürzern Intervallen wiederholt werden muss, bis es wirkt. Das Erbrechen wird diese Zeit hindurch dadurch verhütet, dass des Patienten Kopf von Assistenten niedrig auf dem Kissen gehalten wird, während er auf dem Rücken liegt. Wenn diess gehörig geschieht, so wird der Patient unter hundert Fällen neunundneunzigmal die Arznei bei sich behalten. Sollte aber diess unthunlich gefunden werden, und dennoch Erbrechen

---

Durst und stillt das Erbrechen. Oft wo mir gerade nichts Anderes zu Gebote stand, habe ich Mohnöl esslöffelweise den Kranken reichen lassen und es nie zu bedauern Ursache gehabt.“ Auch in der gewöhnlichen Brechruhr werden ölige Mixturen am ehesten im Magen zurückbehalten; und man muss sich wundern, dass in der Behandlung der epidemischen Cholera so selten von der Emulsionsform Gebrauch gemacht wurde, die sich wohl als die beste bewähren möchte.



stattfinden, so werden dreissig Tropfen Laudanum sogleich gegeben und dreissig Tropfen bei jedem nachfolgenden Erbrechen. Das Erbrechen und das Purgiren hören gewöhnlich bald nachher auf, nachdem das Ricinusöl gegeben worden ist, und das letztere kehrt erst zur Zeit der Wirkung des Mittels zurück. Der Erfolg, mit welchem diese Behandlungsart angewendet wird, muss vorzüglich der Schnelligkeit und Sicherheit der Wirkungen des Ricinusöles zugeschrieben werden, während es ein Arzneimittel ist, welches den Eingebornen leichter gegeben und von ihnen jedem andern Mittel allgemein vorgezogen wird. Das Laudanum wird blos gegeben, um pro tempore das Erbrechen zu hemmen, und da seine Wirkung in andern Hinsichten nachtheilig ist, vorzüglich dadurch, dass es die Wirkung des Ricinusöls schwächt, so ist es desto besser, je weniger man davon zu geben braucht. Wenn das Ricinusöl gewirkt hat, so ist weiter Nichts erforderlich, als die Aufmerksamkeit auf die Gedärme zu richten, welche da, wo die Krankheit heftig gewesen ist, fast immer einige Zeitlang darnach in einem unregelmässigen Zustande bleiben.» Man vermisst bei dieser Anpreisung des Ricinusöls ungern eine Erörterung der Gründe, warum es nicht auch bei den Europäern dem Calomel vorzuziehen ist, um so mehr, da ja nach Henderson das Purgiren die Hauptindikation ist und er selbst sagt, das Calomel sei von allen Purgirmitteln das unsicherste. Auch hätte Henderson wohl die Zahl der ihm vorgekommenen Fälle von Cholera anführen dürfen; denn ohne diess kann man auf seine Versicherung, ihm sei kein Cholerakranker gestorben, keinen grossen Werth le-



gen. Uebrigens bezeugt auch William Scot, das Ricinusöl, besonders in Verbindung mit Mohnsaft, sei, vorzüglich bei den Eingebornen, mit grossem Erfolg gegeben worden. Dagegen wollen andere Aerzte im Anfang der Krankheit vom Wunderbaumöl keine günstigen Wirkungen beobachtet haben, und die meisten beschränken seine Anwendung auf das letzte Stadium der Krankheit. — James Ranken, der am meisten auf den Mohnsaft hielt, ist ganz gegen alle Abführmittel und hält sie in jedem Stadium unbedingt für gefährlich, indem sie nicht nur das Uebel verschlimmern, sondern auch einen Rückfall veranlassen können.

**Brechmittel.** — Damit doch fast keine Art von Arzneimitteln in der Brechrühr unversucht bliebe, suchte man auch in Brechmitteln sein Heil. Dr. Adam versuchte es einmal, aber mit unglücklichem Erfolg. William Scot sagt, von den Brechmitteln habe der Brechweinstein anfangs seine Vertheidiger gehabt, sei aber später aufgegeben worden. Es scheint überflüssig, sich auf eine Beurtheilung der Brechmittel einzulassen, insofern sie wirklich als solche zu wirken bestimmt sind; annehmbarer ist der Vorschlag, sie in refracta dosi zu geben. Nach Conwell versuchte man den Brechweinstein in Gaben von einem Gran, die in Zwischenräumen von einer halben oder einer oder zwei Stunden gereicht wurden; und man soll darauf oft mit Glück galligte Ausleerungen eintreten gesehen haben; diese Behandlung sei oft geglückt, wenn man sie gleich im Anfange bei den Eingebornen angewandt habe. Nicht zu verwerfen wäre ein Zusatz von Ipe-



cacuanhe zum Mohnsaft, um dessen krampfstillende und diaphoretische Wirkung zu erhöhen.

**Tonische Mittel.** — China, Kaskarille, Kolumbo u. dgl. wurden häufig mit Nutzen in der Rekonescenz angewendet.

Die beständige Abwesenheit der Gallenabsonderung in den ersten Wegen führte nach Conwell auf die Idee, Galle aus der Blase eines jungen Stiers genommen in den Magen und den Mastdarm einzubringen! Dieser Versuch blieb aber ohne Erfolg und erscheint als ein trauriges Beispiel, wie krass die Ansichten mancher Aerzte sind. Mit demselben Rechte hätte man auch den Urin eines Stieres in die Harnblase des Kranken einspritzen können.

Zur Linderung des brennenden Durstes reichte Dr. Livingstone einen schwachen Quassiaaufguss, mit dem Königswasser etwas gesäuert; er lobt dieses Mittel sehr zu dem genannten Zwecke sowohl, als auch in der Rekonescenz, um die Unordnungen in den Verdauungsorganen zu bessern.

**Galvanismus.** — Conwell meint, man sollte den Galvanismus in der Brechrühr nicht unversucht lassen. Dr. Livingstone wandte denselben wirklich in einem Falle an und versichert, der Kranke habe sich schnell wieder erholt; jedoch sagt er, die Temperatur des Körpers habe bereits, ehe der Galvanismus angewendet worden sei, durch die ausgedehnte Anwendung der Wärme und durch flüchtige Reizmittel sich gehoben gehabt; allein doch seien die Wirkungen des Galvanismus unstreitig sehr gross gewesen; der Puls an der Hand habe sich sogleich wieder eingestellt, der Athem sei schnell frei geworden, das



eingefallene Gesicht habe wieder mehr Turgor bekommen und das Auge sei nach und nach klar geworden.

**Narkotische Mittel.** — Ausser dem oben ausführlich abgehandelten Mohnsaft ist von den narkotischen Mitteln, vielleicht mit Unrecht, fast gar kein Gebrauch gemacht worden. Bloss Pupurew und Dr. v. Hübenthal sprechen auch von andern Narcoticis. Ersterer reichte das Calomel öfters in Verbindung mit Bilsenkrautextrakt oder *Herba Cicutae*. Hübenthal empfiehlt im Stadium der Rekonescenz bei fortwährender Neigung zu Missverhältnissen in dem Kreislaufsysteme Blausäure. Sollte man, da das Opium wirklich in manchen Fällen schädlich zu sein scheint, nicht das *Lactucarium* versuchen? —

**Schleimige Mittel** — können natürlich immer nur als Nebenmittel betrachtet werden und als Vehikel für andere Arzneistoffe; mehrere russische Aerzte fanden besonders den Salepschleim zweckmässig, der bekanntlich auch in der Ruhr gute Dienste leistet. Das versüsste Quecksilber gab man häufig mit Pulver von arabischem Gummi. Ohne Zweifel verdienen die öligen Mittel den Vorzug vor den schleimigen.

Einige weitere Mittel, die in der Cholera angewendet wurden, wie z. B. das Antimonialpulver (*James powder*), das *Capsicum*, die Tinktur von *Diosma crenatum* u. s. w. müssen wir übergehen, da uns genauere Angaben darüber fehlen; übrigens glauben wir in der vorstehenden Zusammenstellung der von europäischen Aerzten angewendeten Arzneimittel kein ir-



gend bedeutendes ausgelassen zu haben \*). Als die wichtigsten Mittel möchten nach den bisherigen Untersuchungen folgende zu betrachten sein:

1) Blutentziehungen, allgemeine sowohl als örtliche durch Blutigel und blutige Schröpfköpfe;

2) Wärme (nach Darbal das einzige entschieden wirksame Mittel) entweder in feuchter Form — Dämpfe, warme Bäder, — oder in trockener — Einhüllen in gewärmte Tücher;

3) Hautreize sowohl örtliche — heisses Wasser, Senfteige, Moxen, — als allgemeine — einfaches Frot-tiren, Einreibungen von reizenden Flüssigkeiten oder Salben; (sollte man nicht in verzweifelten Fällen von der Urtication Gebrauch machen?)

4) Opium; (Lactucarium?)

5) Kampher;

6) Moschus;

7) Castoreum;

8) Ammoniummittel;

9) Geistige Mittel;

10) Oelige Mittel;

11) Eis, kaltes Wasser;

12) Mineralsäuren.

(13) Versüßtes Quecksilber?)

Ob man mit diesen Mitteln für das erste und das zweite Stadium der Krankheit ausreicht, muss die Erfahrung entscheiden; jedoch erscheint es wünschens-

---

\*) Einen beachtenswerthen Aufsatz über einige indische Volksarzneimittel gegen die Cholera (Radix Cyperi rotundi, Rad. Stizolobii prurientis und die Ignatiusbohne) von Professor A. W. Henschel enthält der XXXIII. Bd. von Rust's Magazin für die gesammte Heilkunde (S. 464 bis 490).



werther, dass diejenigen Aerzte, welche Gelegenheit haben, Erfahrungen zu sammeln, sich bestreben, die Anzeigen und Gegenanzeigen der genannten Mittel genauer zu bestimmen, als dass sie nach neuen Mitteln haschen. Die Behandlung des dritten Stadiums muss nach dem verschiedenen Gange, den die Krankheit nimmt, nothwendig höchst verschieden ausfallen, und es lässt sich daher nichts Allgemeines darüber sagen.

Das neueste Vorrücken der morgenländischen Brechruhr nach Warschau eröffnet die traurige Aussicht, dass es den Aerzten im Laufe des gegenwärtigen Jahres nicht an Gelegenheit fehlen wird, Erfahrungen über die Krankheit zu sammeln. Möchten sie zur Lösung mancher Widersprüche in den bisherigen Ansichten über ihre Behandlung dienen, damit man in der Wahl der zur Bekämpfung der schon ausgebrochenen Krankheit dienlichen Mittel eben so sicher sei, als man in neuerer Zeit über die zur Hemmung ihrer weitern Ausbreitung nöthigen Maassregeln in's Klare gekommen ist.



## BEILAGEN.

### A.

#### Amtliche Untersuchung über die Ansteckung der Cholera durch Waaren \*).

Auf allerhöchsten Befehl Sr. Maj. des Kaisers wurde in Moskau gegen das Ende der Herrschaft der Cholera daselbst ein eigenes Comité aus den angesehensten Personen gebildet, welches über die vorgeschlagene Reinigung der in Moskau befindlichen Waaren ein Urtheil fällen sollte. Das Comité verlangte

---

\*) Dieses Aktenstück, gegen dessen Inhalt sich manche Einwendungen machen lassen, wurde zuerst durch die St. Petersburger Handelszeitung vom 23. Dec. 1830 (4. Jan. 1831) öffentlich bekannt gemacht. Wir entnehmen es der uns so eben zugekommenen Schrift: *Die asiatische Cholera in Russland in den Jahren 1830 und 1831. Nach russischen Aktenstücken und Berichten von Dr. J. R. Lichtenstädt.* (Fortsetzung des Werks: *die asiatische Cholera in Russland in den Jahren 1829 und 1830.*) Erste Lieferung. Berlin. 1831. S. 114 u. ff.



von den Mitgliedern des derzeitigen dasigen Medicinalrathes eine Begutachtung der Frage, ob und in welcher Art in Sachen und Waaren eine Ansteckung der Cholera anzunehmen sei, und ersah aus der Vergleichung der von 24 Mitgliedern jenes Rathes abgegebenen Gutachten, dass drei unter gewissen Bedingungen eine ansteckende Kraft in Sachen und Waaren zugeben, achtzehn dieselbe ableugnen, einer sie anerkennt, aber unter Aufstellung gewisser Fragen Räucherung nicht für unerlässlich hält, einer die Räucherung zur Beruhigung für die, welche die Ansteckung fürchten, für nöthig erachtet, einer keine Erfahrung über Ansteckung von Waaren und Sachen zu haben bezeugt, jedoch zur Vermeidung der Gefahr nöthig findet, einige Waaren zu räuchern, namentlich Tuche mit Chlorkalk, alles Uebrige aber auszulüften. Indem nun das Comité alles dieses mit der Aufmerksamkeit erwogen hat, welche die hohe Wichtigkeit des Gegenstandes nach allen seinen Folgen und der Befehl Sr. Maj. des Kaisers erforderten, so hat dieselbe nach genügender Untersuchung und nach Berücksichtigung aller Umstände einmüthig folgende Ansichten und Schlüsse aufgestellt:

1) Die Bestimmungen der Quarantaineordnung über Reinigung von Waaren und Sachen sind nach Grundlage der über die Ansteckung der Pest gemachten Erfahrungen festgestellt und auf die Cholera nur aus Vorsicht und in Folge von Vermuthungen und vorläufigen Schlüssen angewendet worden. Sie behalten daher nur so lange ihre Gültigkeit, bis durch sichere Erfahrungen und Beobachtungen die Art und der Grad der Ansteckung der Cholera ausgemittelt



ist; sobald diess geschehen ist, so müssen die vorläufig auf die neue Krankheit angewendeten Grundsätze mit neuen vertauscht werden, die auf den neuen Erfahrungen und Beobachtungen mit Bestimmtheit und Sicherheit beruhen.

2) Nirgends in Russland konnte man bis jetzt eine so grosse Menge von gleichmässigen, treuen und gut bezeugten Erfahrungen und Beobachtungen über die Cholera aufstellen, als innerhalb der letzten drei Monate in Moskau, wo unter Aufsicht 24 auserwählter, den derzeitigen Medicinalrath bildender Aerzte über 7500 Menschen an der Cholera behandelt und 52 Choleraleichen anatomisch und chemisch untersucht wurden. Hier also kann und muss eine Bestätigung der über die Ansteckung der Cholera aufgestellten, unter sich nicht übereinstimmenden und nur durch seltene, nicht hinlänglich geprüfte und nicht genügend bezeugte Beweise begründeten Behauptungen stattfinden.

3) Obgleich die Meinungen der Mitglieder des Medicinalraths über die Nichtansteckung der Cholera durch Waaren und Sachen nicht übereinstimmend sind, so werden, abgesehen davon, dass durch starke Stimmenmehrheit die Ansichten der abweichenden Minderzahl fast aufgehoben werden, dieselben nun noch dadurch vernichtet, dass sie sich bei genauerer Ansicht nicht übereinstimmend mit sich selbst und mit augenscheinlichen Umständen zeigen. Einer sagt: »das Ansteckungsgift der Cholera ist nicht so flüchtig, als das der Pest.« Nachher sagt er: »zahllose Beispiele überzeugen uns, dass die Lagerstätten der Kranken und Verstorbenen, so wie auch die Kleider, von Gesunden angewendet, in ihnen die Cholera erzeugt haben.«



Endlich sagt er: »man kann mehr nach Aehnlichkeit, als auf Erfahrungen begründet mit Zuversicht und Genauigkeit behaupten, dass die Waaren und Sachen, welche die Pestansteckung fortpflanzen, auch bei der Cholera anzustecken vermögen.« Wenn er seine Ansicht mehr auf Vergleichung der Cholera mit der Pest als auf Erfahrungen begründet, so folgt daraus, dass er nicht der Wahrheit gemäss von zahllosen Beispielen gesprochen hat, wie denn auch ein Arzt, der nicht mehr als 300 Cholerakranke behandelt hat, nicht zahllose Beispiele haben konnte; der Vergleichung der Cholera mit der Pest widerspricht überdiess das, was er oben selbst von dem Unterschiede von beiderlei Ansteckungen gesagt hat. Ein anderes Mitglied sagt von der Cholera: »diese epidemische Krankheit hängt weder von Witterungsveränderungen, noch von Nahrung, enger Wohnung oder schlechter Bekleidung ab.« Sodann aber sagt er sich gleichsam selbst entgegen: »Menschen von vorgerücktem Lebensalter, die ein unmässiges Leben geführt haben und der Erkältung, den Ueberladungen des Magens und andern Diätfehlern unterworfen sind, werden öfters von dieser Krankheit ergriffen.« Ein Dritter, der nicht mit der Mehrzahl stimmte, beruft sich auf Erfahrung und stellt als Beispiel der Ansteckung durch Sachen auf, dass jemand, der an der Bräune krank war, Krämpfe in den Beinen bekam, nachdem er zum Fussbade ein Gefäss angewendet, womit man Wasser aus den bei Cholerakranken angewendeten Bädern getragen hatte. Hätte eine Ansteckung dieser Art bestanden, so hätte sie unmöglich bei einer Krankenzahl von 7500 Personen nur ein einziges Mal zur Beobachtung gelangen



können; man muss daher den Schluss machen, dass die Krämpfe des obgedachten Bräunekranken aus einer andern von dem Arzte nicht bemerkten Ursache entstanden sein müssen.

4) Hingegen ist das Gutachten derer, welche die Ansteckung durch Sachen leugnen, einerseits durch Stimmenmehrheit sehr gewichtig, andererseits durch Erfahrungen und Beweise zur Bestätigung desselben überzeugend. Die Mitglieder des Medicinalrathes bezeugen sowohl von sich selbst, als von vielen andern Personen in den Krankenhäusern, dass ihre Bekleidung nach mannichfaltiger, fortgesetzter und langdauernder Verbindung mit Kranken und ohne alle Reinigung sich doch nirgends ansteckend erwiesen hat. Leute, die von der Cholera wieder hergestellt waren wendeten die zur Zeit der Krankheit gebrauchte Bekleidung, die mit Pelz gefüttert war, ohne alle Reinigung bei ihrer Wiedergenesung an und bekamen weder selbst die Cholera, noch steckten sie Andere an. Bei der Oeffnung der Choleraleichen, worauf innerhalb der letzten 4 Wochen täglich an 4 bis 5 Stunden verwendet wurden, ist weder von den die Oeffnung vollziehenden, noch von den andern gegenwärtigen Aerzten, noch endlich von den hülfeleistenden Personen irgend einer angesteckt worden, obgleich sie mit Ausnahme der ersten Tage fast gar keine Vorsicht angewendet haben. Und was noch wichtiger ist, der öffnende Arzt hat sich öfters die Hände verwundet, und nach Berührung der verletzten Stellen mit Höllenstein ohne Nachtheil seine Beschäftigung fortgesetzt. Ein Invalid, der überdiess unordentlich lebte, bekam von einer ähnlichen Verwundung ein Geschwür, welches die üble



Wirkung der Säfte des Leichnams zeigte, aber nicht die Cholera. Unter den auswärtigen Forschern der Cholera haben selbst die, welche ihr in gewissen Beziehungen Ansteckung zuerkannten, dennoch die Ansteckung durch Waaren und Sachen nicht anerkannt. (Moreau de Jonnés, Gravier.)

5) Mit Wahrheit bemerkt ein Mitglied, dass der Handel in Moskau, welcher zur Zeit der Herrschaft der Cholera daselbst stillstand, im November bei Abnahme der Krankheit wieder in Gang kam, und dass sowohl moskauische als eingeführte Waaren, zumal auf Veranlassung des bevorstehenden Winters, im Volke einen grossen Verkehr erhielten. Wäre in ihnen Ansteckung enthalten gewesen, so hätte sie sich bei den genannten Veranlassungen durch Erneuerung der Ansteckung und durch Vergrösserung der Krankenzahl erweisen dürfen. Da dieses nicht geschehen, so geht daraus ein neuer Erfahrungsbeweis hervor, dass in den Waaren keine Ansteckung vorhanden ist.

6) Nimmt man an, dass die Cholera sich durch Sachen fortpflanzt, so hätten die Sachen der 7500 Kranken, von denen gegen 1500 in den Häusern waren und daher weder ärztlich, noch polizeilich strenger Aufsicht unterlagen, die Ansteckung noch ungleich mehr verbreiten müssen, als die in Laden und Aufbewahrungsorten befindlichen Waaren, zu denen Kranke nicht Gelegenheit haben zu gelangen. Will man die Waaren räuchern, so ist es ungleich nöthiger, alle Sachen in den Häusern von ganz Moskau zu räuchern. Zum Glücke aber beweist die Erfahrung des fast vollständigen Aufhörens der Krankheit unwiderleglich, dass keine solche allgemeine Ansteckung vorhanden



ist; sonst hätte man nicht bloß eine sehr unbequeme, sondern auch zur vollständigen Vollziehung unausführbare Reinigung bedurft. Selbst nach der Pest wurden nicht alle Häuser gereinigt, sondern nur die nach zuverlässigen Zeugnissen angesteckten und ausgestorbenen.

7) Will man behaupten, wie man nach den frühern Muthmaassungen über die Cholera befürchtet hat, dass die Ansteckung in den von dem Jahrmarkte zu Nischnei-Nowgorod eingeführten Waaren haften könne, so muss man, da sie nicht bloß nach Moskau, sondern auch nach Petersburg und von dort in viele andere Städte gekommen, und in grosser Menge zum Verkehre unter dem Volke gelangt sind, entweder anerkennen, dass eine Ansteckung dieser Waaren in Moskau eben so wenig stattfindet, als sie in Petersburg stattgefunden hat, oder man muss nicht nur die Waaren in Moskau räuchern, sondern auch die in Petersburg, ja ganz Petersburg selbst, wo sie sich verbreitet haben, und sämtliche Städte, wohin Waaren von dem gedachten Jahrmarkte transportirt worden sind.

8) Endlich will man trotz der Kraft und Wichtigkeit der Beweise für die Nichtansteckung der Cholera durch Waaren, trotz dem Mangel zuverlässiger und genügend bezeugter Erfahrungen vom Gegentheile, aus überflüssiger Vorsicht dennoch die Waaren in Moskau räuchern lassen, so stellt sich dieser Maassregel eine Reihe von Folgen entgegen, welche in ungleich höherem Grade die Beachtung der Regierung erfordert. Diese Folgen sind Zerstörung der Farbe, der Schönheit, der Reinheit, folglich auch bedeutende



Verminderung des Preises der Waaren, Verlust grosser Kapitale, Verlängerung des gegenwärtigen Mangels an Thätigkeit und vollständiger Verfall vieler Fabriken, das Verfallen vieler tausend Menschen, welche Nahrung von den Fabriken haben, in Armuth, Hülfslosigkeit und Hungersnoth.

9) Aus allen diesen Betrachtungen zieht das Comité einen dahin gehenden Schluss, dass an den Orten, wo die Cholera geherrscht hat, die Waaren nicht geräuchert werden sollen, übereinstimmend mit dem allerhöchsten Befehle vom 25. August.

Diese Verhandlung des Comités ist auf allerhöchsten Befehl dem Ministercomité vorgelegt worden, welches anerkannt hat, dass dieselbe Schlüsse enthalte, die auf unwiderleglichen Beweisen ruhen, und eben desshalb verordnet, die in der gedachten Verhandlung enthaltenen Ansichten und Schlüsse zur allgemeinen Beruhigung drucken zu lassen und überall zu versenden. Dieser Beschluss hat die allerhöchste Bestätigung erhalten.



**B.**  
Instruktion für die Sanitätsbehörden und für  
das bei den Kontumazanstalten verwendete Per-  
sonale, zum Behufe die Gränzen der K. K.  
österreichischen Staaten vor dem Einbruche der  
im K. russischen Reiche herrschenden epidemi-  
schen Brechruhr (Cholera morbus) zu sichern,  
und im möglichen Falle des Eindringens ihre  
Verbreitung zu hemmen.

---

*I. Nothwendigkeit gegen die epidemische Brechruhr alle  
jene gesundheitspolizeilichen Vorsichtsmaassregeln zu tref-  
fen, welche im Allgemeinen gegen ansteckende Seuchen vor-  
geschrieben sind.*

§. 1. Obwohl die ansteckende Natur der mor-  
genländischen Brechruhr (Cholera morbus), — welche  
im Jahre 1817 an den Ufern des Ganges ausbrach  
und in den folgenden Jahren nicht nur beinahe ganz  
Ostindien verheerte, sondern sich auch bis nach Cey-  
lon (1818), Siam (1819), China (1820), Java (1821),



nach Persien und Syrien (1822), ans kaspische Meer (1823) verbreitete, und schon im Jahre 1824, besonders aber im Jahre 1829 und 1830 bei Astrachan und Orenburg in das russische Gebiet einbrach, — vielen Aerzten noch nicht bis zur vollen Evidenz erwiesen zu sein scheint, ja sogar von verschiedenen, besonders englischen Aerzten gänzlich geläugnet wird; so sind jedoch sehr viele und auffallende Beweise vorhanden, welche für das Ansteckungsvermögen dieser Krankheit sprechen, wodurch sie sich gesunden Individuen selbst auf eine gewisse Entfernung mittheilen kann.

§. 2. Bei dieser Unentschiedenheit über die bestimmte, vielleicht überall identische, vielleicht aber durch Nebenumstände modificirte Verbreitungsart dieser mörderischen Seuche, welche schon Millionen von Opfern hinwegraffte, zugleich aber bei den so laut sprechenden Beweisen für ihre contagiöse Natur gebietet es die Klugheit und der philanthropische Sinn jedes civilisirten Staates, zum Wohle seiner Unterthanen und zur Sicherstellung der angränzenden Länder immer den schlimmsten und gefahrvollsten Fall vor Augen zu haben und kein Mittel ausser Acht zu setzen, welches der ferneren Ausbreitung einer so schrecklichen Geissel Einhalt thun könnte.

§. 3. Es muss daher die morgenländische epidemische Cholera in medicinisch-politischer Hinsicht von diesem Standpunkte betrachtet, und es müssen gegen dieselbe alle jene Maassregeln eingeleitet werden, welche eine auf Erfahrung und Vernunft gestützte Gesundheitspolizei gegen pestartige Krankheiten vorschreibt.



*II. Verhütung des Eindringens der Krankheit, so lange sie noch auf den Nachbarstaat beschränkt bleibt.*

§. 4. So lange die Cholera auf die weit entfernten Provinzen des russischen Reiches beschränkt bleibt, ist dort, wo derzeit der Kordon bereits besteht, gegen alle aus jenen Gegenden, in welchen sie sich bisher geäußert hat, kommende Provenienzen, eben so wie gegen die Pestverdächtigen nach dem zweiten Grade zu verfahren. Dasselbe ist im Küstenlande gegen alle aus verdächtigen russischen Häfen anlangenden Provenienzen zu beobachten; im eintretenden Bedürfnissfalle aber gleich der Kordon zu verstärken und auf die ganze Gränze gegen Russland auszudehnen. Wenn die Gefahr sich nähern sollte, ist den Behörden, öffentlichen Sanitätsbeamten und Aerzten die sorgfältigste Ueberwachung des Gesundheitszustandes einzuschärfen und denselben aufzutragen, jeden nur den mindesten Verdacht erregenden Krankheitsfall der Landesregierung anzuzeigen, überdiess aber alles dasjenige zu verfügen, was bei Annäherung der Pest vorgeschrieben ist. Indessen sind alle Briefschaften, welche aus Russland einlangen, an der Gränze derselben Behandlung zu unterwerfen, wie jene Briefe, welche aus notorisch von der Pest angesteckten Ländern vorkommen.

*III. Verhinderung der Verbreitung im Falle sich die Cholera in den Gränzorten des kaiserlichen Staates zeigen sollte.*

§. 5. Um gleich beim ersten Erscheinen des Uebels dessen Verbreitung so schnell als möglich durch die gehörigen Vorsichtsanstalten verhindern oder we-



nigstens hemmen zu können, wird es vor Allem erforderlich, von der Krankheit genaue Kenntniss zu haben. Diese wird überdiess auch aus jenem Grunde um so unentbehrlicher, als nach der Aussage aller Aerzte, welche bisher die epidemische Brechruhr zu beobachten und zu behandeln Gelegenheit hatten, Rettung der Kranken gewöhnlich nur dann zu hoffen ist, wenn schleunige Hülfe geleistet werden kann.

Es muss daher Sorge getragen werden, nicht nur alle Aerzte sondern auch Nichtärzte mit den vorzüglichen Erscheinungen bekannt zu machen, unter welchen die Cholera einzutreten und zu verlaufen pflegt, und sie von der augenscheinlichen Gefahr bei jeder Verabsäumung augenblicklicher ärztlicher Hülfe zu unterrichten.

#### 1) *Erkenntniss der Krankheit.*

§. 6. Die gewöhnlichen Vorboten des Uebels sind: Schwäche, Zittern und Abgeschlagenheit der Glieder, heftiges Kopfweh, Schwindel, Betäubung, Appetitmangel, Unruhe, Angst, Schlaflosigkeit, Herzklopfen, Gefühl von Druck in der Herzgrube, abwechselnd überlaufender Frost und Hitze mit kaltem Schweisse.

Gleichzeitig oder bald darauf folgt ein unausgesetztes Kollern im Unterleibe mit Auftreibung desselben, Ekel, heftiges Würken und das Gefühl von Satttheit und Magenüberladung.

§. 7. Schnell geschieht der Ausbruch der Cholera selbst, welcher sich durch vermehrte, erschöpfende Stuhlentleerungen mit Abgang häufiger, wässeriger, molkenartiger, im After ein Brennen erre-



gender Flüssigkeiten, und durch Erbrechen einer ähnlichen, meist geruch- und geschmacklosen, weisslichen, mit Klumpen von Schleim vermischter Materie ausspricht. Galle bemerkt man meistens gar nicht, oder nur sehr wenig. Das Athemholen wird zu gleicher Zeit mehr und mehr beschwert, mit grosser Aengstlichkeit, Beklommenheit und Gefühl von Zusammenschnürung um die Herzgegend verbunden, von Seufzen oft unterbrochen.

Im Unterleibe wechseln Schmerzen und Hitze mit einander ab, und der Drang zum Stuhle und zum Erbrechen nimmt immer zu, mit sparsamen oder gar keinem Uriniren. Der Durst wird unauslöschlich, mit dem heftigsten Verlangen nach kaltem Wasser, um das unerträgliche Brennen in der Magengegend einigermaßen zu lindern. Die Unruhe steigt in Kurzem auf jenen Grad, dass die Kranken keinen Augenblick in derselben Lage verbleiben können. Der Mund wird trocken, die Zunge bläulich oder weiss und stammelnd. Bald darauf fangen die Extremitäten an kalt zu werden; es stellen sich Anfangs Schmerzen und Reißen in denselben ein, welchen Zuckungen und heftige Krämpfe, besonders in den Fingern, Zehen und Waden folgen; diese verbreiten sich dann über den Bauch, die Lenden und den untern Theil des Brustkorbes. Der Puls sinkt und wird zuweilen kaum fühlbar, die Augen werden geröthet, glasig, starr, sinken in ihre Höhlen ein und sind mit einem dunkeln Ringe umgeben. Das Gesicht des Kranken fällt ein und drückt unter schnell zunehmender Schwäche und Hinfälligkeit die grösste Traurigkeit und die vorschwebende



Todesangst aus. Das aus der Ader gelassene Blut ist meistens dick und schwarz.

§. 8. Der Verlauf der epidemischen Brechruhr ist so rasch, dass gewöhnlich in den ersten 24 Stunden das Schicksal der Kranken entschieden zu sein pflegt. Einige unterliegen schon nach 7, 10 oder 12 Stunden, selten dauert das Uebel über zwei Tage und lässt dann eher Genesung hoffen, welche eben so schnell erfolgt.

§. 9. Wenn die Kälte der Oberfläche des Körpers bis zur Starrheit zunimmt, sich über die Herzgegend und die Zunge verbreitet, wenn kalter Schweiss ausbricht, wenn die Haut an den Fingern und Zehen einschrumpft, die Schmerzen plötzlich aufhören und die Krämpfe in einen paralytischen Zustand übergehn; wenn mit den Zeichen einer scheinbaren Besserung vollkommene Gefühl- und Bewusstlosigkeit und stellenweise blaue Flecken im Gesicht und an den Extremitäten eintreten, dann pflegt der Tod nicht ferne zu sein.

Vor dem Eintritte heftiger Krämpfe, wenn mit den wässrigen Flüssigkeiten auch etwas Galle nach oben oder unten entleert wird, und wenn die Kälte der Gliedmaassen nicht zunimmt, kann man Hoffnung nähren, den Kranken zu retten.

## 2) *Verhütung der Gemeinschaft zwischen Cholerakranken und Gesunden.*

§. 10. Sobald sich in irgend einem Orte der Gränzstaaten ein Fall ergibt, der die oben bezeichneten Symptome insgesamt, oder nur zum Theil offenbaret, muss alsogleich ein Arzt herbei geholt und die



unmittelbare Anzeige an die Ortsobrigkeit und von dieser mittelst des Kreisamtes an die Landesregierung gemacht werden. Jede Unterlassung oder Verheimlichung ist schärfestens zu ahnden und nach Maassgabe der Gefahr, die daraus entspringt, zu bestrafen.

§. 11. Hierauf folgt die Absonderung der Kranken nach allen jenen Vorschriften, welche für die Pest gültig sind. Die Kontumazanstalt tritt nun in ihre volle Thätigkeit. Man beruft sich also hier auf die bereits bekannten und bei Pestausbrüchen anzuwendenden prophylaktischen Maassregeln, welche im gegebenen Falle in ihrer ganzen Ausdehnung und mit der gewissenhaftesten Genauigkeit in Ausführung gebracht werden müssen, um alle Kommunikation mit angesteckten Personen und Effekten zu vermeiden.

3) *Sorge für den allgemeinen Gesundheitszustand der Einwohner und besonders derjenigen, welche mit den Cholera-kranken in irgend eine Verbindung treten, um sie vor der möglichen Ansteckung zu schützen.*

§. 12. Feuchte Luft, Verkühlung, besonders des Nachts, gesperrte feuchte Wohnung, körperliche und geistige Anstrengung, schlechte Nahrung, Unmässigkeit, Herabstimmung des Gemüths, Mangel an hinlänglich schützender Bekleidung, und Alles, was Entkräftung nach sich zieht, sind die vorzüglichsten Umstände, welche die Entwicklung der Cholera begünstigen. Auch pflegt sie in sumpfigen, überschwemmten und niedrig gelegenen Gegenden leichter zu entstehen und verheerender zu seyn, als in trockenen Ebenen und hochliegenden Orten. Es ist daher von Seiten der Ortsobrigkeit, der Sanitätsbehörde und der Aerzte



alles Nöthige einzuleiten, um den nachtheiligen Einfluss der erwähnten Schädlichkeiten nach Möglichkeit zu mindern oder zu verhüten.

§. 13. Die Gebäude, welche man zur Aufnahme von Cholerakranken bestimmt, sollen wo möglich hoch gelegen und trocken sein; auch dürfen sie nie mit vielen Patienten überladen werden, damit die mit mephitischen Dünsten geschwängerte Luft weder den Kranken, noch den ihnen Hülfeleistenden nachtheilig werde.

§. 14. In den Krankenzimmern muss stets für Reinlichkeit, Trockenheit und Erneuerung der Luft, und in der rauheren Jahreszeit für einen mässigen Grad der Temperatur von beiläufig 15 Grad Reaumur Sorge getragen werden. Wenigstens zwei Mal im Tage sind die Krankenzimmer mit Essigdämpfen, oder was noch vorzüglicher ist, mit Chlordämpfen zu räuchern. Zu diesem Behufe bediene man sich entweder der Guyton Morveau'schen Mischung aus zwei Unzen Kochsalz,  $\frac{1}{2}$  Unze Braunsteinoxid, eben so viel Schwefelsäure und 1 Unze Wasser, welche auf warmen Sand gestellt und öfters umgerührt wird; oder man bespritze die Zimmer zwei Mal des Tages mit einer Auflösung von Chlorkalk (1 Unze auf 1 Pfund Wasser). Es darf jedoch die Entwicklung des Chlorgases nie bis zu dem Grade gesteigert werden, dass es die Lungen beleidige.

§. 15. Den Einwohnern jenes Ortes, wo die Cholera ausgebrochen, ist eine gesunde, nährende und leicht verdauliche Kost anzuempfehlen. Der mässige Gebrauch von Küchengewürzen, z. E. Pfeffer, spanischem Pfeffer, Kümmel, Anis, Knoblauch, Zwiebeln



u. dgl. wäre ebenfalls nicht zu vernachlässigen. Alle rohen Früchte, besonders säuerliche, wässrige, und am meisten unreife, als: Weintrauben, Melonen, Arbusen (Wassermelonen), Gurken, müssen vermieden werden, eben so Alles, was leicht der Gährung unterliegt und die Verdauung beschwert, als: Bier, Meth, saure Milch, Quass, der Barschcz der Polen (eine säuerliche Suppe mit Rüben), Pilze, gesalzene oder schlechte Fische, fette Speisen. So zuträglich es auch ist, des Morgens etwas Branntwein oder Liqueur, vorzüglich der mit Kümmel, Anis, Krausemünze oder Wachholderbeeren bereitet wird, und unter Tages ein Gläschen Wein zu sich zu nehmen, eben so nachtheilig ist jeder übermässige Gebrauch von geistigen Getränken und stark erhitzenden gewürzhaften Speisen. Jede Ueberladung des Magens mit Speisen und Getränken, besonders des Abends, wirkt nachtheilig; Nichts aber macht für die Cholera empfänglicher, als Trunkenheit. Die Ortsobrigkeit muss daher die Aufsicht über Schänken, Wirthshäuser, Viktualien und besonders über die gute Beschaffenheit des Brodes sich zur vorzüglichen Pflicht machen.

§. 16. Es soll allen Einwohnern in jenen Ortschaften, wo sich Fälle von Cholera zeigen, aufgetragen werden, ihre Wohnungen täglich zu lüften und mit Essig oder Chlor zu räuchern, nie mit nüchternem Magen auszugehen und besonders des Morgens etwas Geistiges oder Wärmendes, z. B. einen Thee von Kamillen, Melisse, Krausemünze zu sich zu nehmen.

§. 17. Jede angestrengte und andauernde Arbeit, forcirte Märsche bei Soldaten und Boten, unordentli-



cher Lebenswandel, so wie das Herumgehen des Nachts sind sorgfältig zu vermeiden.

§. 18. Vor dem schädlichen Einflusse der Verkühlung und der Feuchtigkeit muss eine angemessene hinlänglich schützende Bekleidung sichern.

Es soll daher Niemand in freier Luft schlafen, und bei Nacht besonders bald nach dem Schlafe nie ausgehen, ohne sich warm angezogen zu haben. Ueberhaupt ist es vortheilhaft, immerwährend eine mässige Transpiration des Körpers zu erhalten. Man trage daher unmittelbar auf dem Leibe eine Flanellkleidung, oder man versehe wenigstens den Unterleib mit einer tuchenen Binde und verwahre die Füße vor Feuchtigkeit, man reibe sich den ganzen Körper Morgens und Abends mit erwärmten wollenen Tüchern, oder, wenn es seyn kann, mit warmem Essig.

§. 19. Auch könnte man den wohlthätigen Einfluss der Seelsorger in Anspruch nehmen, um durch Erweckung der Zuversicht auf die Vorsehung Gottes das Gemüth der Einwohner zu beruhigen und zu stärken.

§. 20. Nie sollen Aerzte, Wundärzte, Seelsorger und Krankenwärter dem Dienste sich mit nüchternem Magen unterziehen, und ohne früher etwas Geistiges zu sich genommen zu haben. Man hüte sich so viel als möglich, die den Kranken zunächst umgebende oder von ihm ausgehauchte Luft einzuathmen, weil diese gleich den Exkrementen, als des Ansteckungsvermögens am meisten verdächtig zu sein scheint. Auch ist es rathsam, bevor man sich in das Krankenzimmer begibt, die Hände mit Essig zu waschen, ein Fläschchen mit aufgelöstem Chlorkalk oder starkem (auch aromati-



schem) Essig bei sich zu tragen, mit selbem die Gegend um die Nase herum zu befeuchten, oder öfters daran zu riechen, dann sich den Mund mit verdünntem Essig, Kölnischem oder irgend einem andern aromatischen Wasser auszuspülen. Nach beendigter Krankenvisite müssen die Kleider durchräuchert und mit andern ausgetauscht werden.

§. 21. Dieselben Vorschriften müssen auch die Todtengräber beobachten und wo möglich jede unmittelbare Berührung der Leichname vermeiden. Anatomische Zergliederungen dürfen auch nicht anders, als mit der grössten Behutsamkeit stattfinden, und nur nachdem früher der ganze Leichnam und die eröffneten Eingeweide mit Chlorkalkauflösung bespritzt oder befeuchtet worden sind.

#### 4) Zerstörung des Miasma.

§. 22. Hierzu sind die zur Ausrottung des Pest-Contagiums vorgeschriebenen Maassregeln in Anwendung zu bringen, welche sich auf die Reinigung oder Vernichtung der inficirten oder sehr verdächtigen Effekten und auf die Behandlung der angesteckten Personen und Wohngebäude beziehen.

#### IV. Behandlung der Cholerakranken.

§. 23. Nachdem die zweckmässigste Behandlungsweise der epidemischen Cholera, als einer neuen asiatischen Krankheitsform, welche Europa von der östlichen Seite bedroht, noch nicht allgemein bekannt ist, so wird es nothwendig, die Aerzte und Wundärzte der Gränzstaaten, wo ein Einbruch der Krankheit am meisten zu fürchten ist, oder wirklich sich schon er-



geben haben sollte, mit den bisherigen Erfahrungen und der bis jetzt am meisten bewährten Heilmethode englischer und russischer Aerzte bekannt zu machen.

§. 24. Wenn der Arzt beim ersten Beginnen der Krankheit, das ist vor dem Eintritt der Krämpfe und des Erkaltens der Gliedmaassen gerufen wird, so ist ein Aderlass gewöhnlich von der grössten Wirksamkeit. Es dürfen jedoch bei Erwachsenen nicht weniger als 12 bis 15 Unzen Blut entzogen werden. Sollte bei Oeffnung der Ader das Blut nur sparsam hervorquellen, so ist es nothwendig, die Oberfläche des Körpers und der Gliedmaassen mit erwärmten Tüchern zu reiben und zu bedecken und dann die Entziehung des Blutes fortzusetzen. Wenn es möglich ist, kann man auch ein warmes Bad von 30° R. gebrauchen, um die Circulation des Blutes in eine thätigere Bewegung zu bringen. Die Jahreszeit, das Klima, der epidemische Charakter, das Temperament und die Leibeskonstitution des Kranken müssen den Maassstab für die zu entziehende Blutmenge geben, wobei auch auf die Erleichterung zu sehen ist, welche der Kranke während der Aderlassens fühlt.

§. 25. Nach vorausgeschickter Blutausleerung, oder wenn diese bereits wegen schon eingetretener Magenschmerzen, Krämpfe und Kälte der Gliedmaassen, und bei einem kleinen kaum fühlbaren Pulse nicht mehr anwendbar ist (in welchem Falle sie sogar nachtheilig wäre), gehe man alsogleich zum Gebrauche des Calomels und Opiums über, welche zwei Heilmittel allen bisherigen Erfahrungen zu Folge in der epidemischen Brechruhr als die vorzüglichsten anzu-



sehen sind. Jedoch ist nur von grossen Gaben der erwünschte Erfolg zu erwarten.

§. 26. Es werden 10, 15 bis 20 Gran Calomel mit etwas Zucker und arabischem Gummi in Pulverform, und nach einer halben Stunde 40 bis 50 Tropfen Laudanum liquidum Sydenhami verabreicht, diese Gabe nach 2 oder 3 Stunden (nach Maassgabe der Gefahr) wiederholt und auf diese Art fortgeföhren, bis die Hauptzufälle, besonders das Erbrechen, die erschöpfenden Stuhlentleerungen, das Brennen im Unterleibe und die schmerzhaften Krämpfe nachlassen. Für Kinder muss die Dosis wenigstens auf die Hälfte herabgesetzt werden.

§. 27. Zu gleicher Zeit trage man Sorge, die erkalteten und sich krampfhaft zusammenziehenden Glieder, besonders aber die Herz- und Magengegend mit Brantwein, Seifen- oder Kampherspiritus, oder mit verdünntem Salmiakgeist zu reiben und den Kranken mit erwärmten Tüchern einzuhüllen. Je heftiger die Krämpfe und die Kälte der Extremitäten werden, je mehr die Schwäche und Hinfälligkeit zunimmt, desto öfters müssen die geistigen Einreibungen wiederholt werden, welchen dann auch Senfteige auf die Fusssohlen und auf die Magengegend beizugesellen wären, nebst dem Gebrauche irgend eines aromatischen, mit den oben erwähnten Mitteln abwechselnd darzureichenden Wassers oder einiger Tropfen Pfeffermünzöl auf Zucker.

§. 28. Wenn der Kranke die ihm verabreichten Medikamente ausbricht (wie dieses sich leicht ereignet, wenn der Arzt zu spät gerufen wird), müssen selbige alsogleich in etwas kleineren, aber desto schneller auf



einander folgenden Dosen wiederholt werden. Und sollte der Magen platterdings auch diese nicht vertragen, so kann man mit einem Gemische von 2 Gran Opium, 15 Gran Calomel und 3 bis 4 Drachmen Honig die Zunge und die innere Fläche der Mundhöhle bestreichen, damit der Kranke durch langsames und unmerkliches Hinabschlingen des Speichels auch die aufgetragene Arznei hinab befördere.

§. 29. Um den Stuhlzwang und die krampfhaften Schmerzen im Unterleibe zu besänftigen, bedient man sich schleimiger Klystiere mit etwas Opium, nämlich 3 bis 4 Unzen irgend eines schleimigen Absudes von Reis, Gerste, Salep- oder Eibischwurzel, oder von zerstoßenem Leinsamen, mit 20 oder 30 Tropfen Laudanum liquidum, alle 2 bis 3 Stunden wiederholt.

§. 30. Den lästigen Durst lösche man mit einem Reiss- oder Gerstendekokt, oder mit einem leichten Aufguss von Kamillenblüthen, welche jedoch lauwarm, und in kleinen öfters wiederholten Gaben gegeben werden müssen.

§. 31. Wenn durch 5 bis 6 Stunden weder Erbrechen, noch schmerzhaft erschöpfende Stuhlentleerungen eintreten, die Krämpfe nachlassen, die Oberfläche des Körpers sich erwärmt und auszudünsten anfängt, und der Kranke die Wirkung des Mohnsaftes durch Betäubung und Schläfrigkeit, oder jene des versüssten Quecksilbers durch vermehrte Speichelabsonderung oder durch breiartige gallige Stuhlgänge andeutet, so ist der fernere Gebrauch dieser Arzneien zu unterlassen und eine gelinde magenstärkende Mixture aus Krausemünzen- oder Melissenwasser mit et-



was Hoffmann'schem Geiste, oder ein Paar Tropfen Pfeffermünzöles auf Zucker zu verabreichen.

§. 32. Zum Schlusse der Kur dient etwas Rhabarbertinktur mit einem aromatischen Wasser und arabischem Gummischleim versetzt.

§. 33. Sobald das Erbrechen aufhört, suche man auch den Kranken mit Kraftsuppen, Gersten- oder Reisschleim, und manches Mal mit einem Löffel voll guten Wein zu erquicken.

§. 34. Sollte in der Konvalescenz Verstopfung des Leibes eintreten, dann bediene man sich einer Unze Ricinusöl, oder einer Mischung von einer Drachme Magnesia mit 10 bis 15 Gran Rhabarberpulver.

Die heftige Esslust, welche nach überstandener Krankheit nicht selten eintritt, darf nur mit der grössten Behutsamkeit und Mässigkeit befriedigt werden.



§. 35. Den Gränzsanitätsanstalten wird es zur Pflicht gemacht, frühzeitig Sorge zu tragen, dass in allen Apotheken die bisher erwähnten Arzneikörper, welche zur Prophylaxe und Heilung der Cholera nothwendig sind, in hinlänglicher Menge und von der besten Qualität vorhanden sind.

§. 36. Der Landesstelle wird es anheim gestellt, diesen Vorschriften die möglichste Allgemeinheit zu verschaffen, um die Einwohner der Gränzstaaten, in welchen ein Einbruch der Cholera möglich ist, oder wirklich schon stattfand, mit allen jenen Vorsichtsmaassregeln bekannt zu machen, welche zu ihrem und ihrer Mitbürger Wohl erforderlich, besonders aber



für jene, die sich dem Dienste und der unmittelbaren Pflege der Kranken widmen, von der grössten Wichtigkeit sind.

Zu demselben Behufe wäre auch eine Uebersetzung in die Landessprache, welche durch den Druck bekannt gemacht werden sollte, zu wünschen.

§. 37. Zum Gebrauche für das ärztliche Personal wird als eine wissenschaftliche Erweiterung und gleichsam Concentrirung der in dieser Instruktion enthaltenen kürzer gefassten Angaben hier noch eine besondere Abhandlung über die Cholera morbus angehängt \*).

Wien, den 18. November 1830.

---

\*) Da diese „ärztliche Abhandlung über die Cholera morbus“ nichts Neues enthält, so glauben wir, sie füglich weglassen zu können.



## Berichtigungen zum ersten Bande.

- S. VII. Z. 2 von oben statt Anspruch machen wird lies: wird  
Anspruch machen dürfen.
- 6 — 10 v. oben statt Comwell l. Conwell.
- — 11 v. oben statt immer l. in der Regel.
- 9 — 12 v. oben ist die Angabe, dass bereits Bontius  
die morgenländische Brechruhr beobachtet hat,  
zu berichtigen. Er führt unter den Symptomen  
der Krankheit gallige Ausleerungen auf und  
gibt nicht an, ob er die Krankheit sporadisch  
oder epidemisch beobachtete. (Jacobi Bontii,  
in Indiis archiatri, de medicina Indorum libri  
quatuor. Lugduni Batav. 1718. p. 69 bis 71.)
- Die auf derselben Seite befindlichen Angaben  
über frühere weitverbreitete Brechruherepidemien  
sind gleichfalls zu berichtigen. Deguignes  
(in seiner Histoire générale des Huns, des Turcs  
etc. Tome II. p. 174.) sagt bloss: Une peste  
considérable, qui vint de l'Inde et parcourut  
les provinces de Ghazna, de Khorasan, de  
Dgiordgian, de Dgebal et même la Syrie, affli-  
gea ensuite cet empire (Persien). Es ist kein  
bestimmter Grund vorhanden, anzunehmen, dass  
diese aus Indien gekommene peste considerable  
gerade die Brechruhr gewesen sei; ebenso un-  
gewiss ist es, ob die vor 500 Jahren (oder nach



Andern vor 600 Jahren, in welchem Falle offenbar der schwarze Tod gemeint ist,) von Indien aus sich verbreitende ähnliche Seuche die Brechruhr war, da diese Aehnlichkeit eben so gut auf die Verheerungen der Krankheit als auf diese selbst sich beziehen kann.

|    |    |    |    |                                                                 |
|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------|
| S. | 12 | Z. | 1  | v. oben statt Bangalpure l. Baugalpure.                         |
| —  | 13 | —  | 18 | v. oben nach Wochen ist zu setzen: im Bezirke von Dschissore.   |
| —  | 14 | —  | 8  | v. oben statt Kalcutta l. Calcutta.                             |
| —  | 16 | —  | 6  | v. unten statt vorher mehrere l. mehrere vorher.                |
| —  | 21 | —  | 15 | v. oben ist zu streichen: also nicht einmal der siebente Theil. |
| —  | 23 | —  | 7  | v. unten statt Trinconomali l. Trincomali.                      |
| —  | 24 | —  | 7  | v. unten statt Marschall l. Marshall.                           |
| —  | 28 | —  | 19 | v. unten statt vorliegen l. vorliegenden.                       |
| —  | 30 | —  | 9  | v. unten statt Maldioica l. Maldivica.                          |
| —  | 32 | —  | 2  | v. oben nach 1821 ist zu setzen: Bd. I.                         |

Der englischen Literatur über die morgenländische Brechruhr auf derselben Seite ist beizufügen:

Treatise on the epidemic Cholera of India, by James Boyle. London. 1821. 8.

Observations on the Nature and Treatment of Cholera, and on Pathology of mucous membranes. By Alex. Turnbull Christie. Edinburg. 1828.

Cholera, its nature, cause and treatment, etc. By Charles Searle, Surgeon. London. 1830.

|   |     |   |    |                                                                                     |
|---|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| — | 33  | — | 18 | v. oben nach Chisholm ist beizufügen: London.                                       |
| — | —   | — | 20 | v. oben statt prevalen Diseases l. prevalent Diseases.                              |
| — | 44  | — | 7  | v. unten nach Erzählung ist beizufügen: Glauben.                                    |
| — | 45  | — | 2  | v. oben statt Dörfer l. Hütten.                                                     |
| — | 48  | — | 14 | v. oben statt Bender-Abuscher l. Buschir.                                           |
| — | 49  | — | 2  | u. 8 v. oben statt Omaum l. Oman.                                                   |
| — | 54  | — | 11 | v. unten statt bleiben l. blieben.                                                  |
| — | 84  | — | 14 | v. oben statt Stärkmekl l. Stärkmehl.                                               |
| — | 87  | — | 8  | v. oben statt den l. der.                                                           |
| — | 95  | — | 5  | v. oben statt finden l. fanden.                                                     |
| — | 105 | — | 7  | v. unten statt zu l. im Gouvernement.                                               |
| — | —   | — | 3  | v. unten ist zu streichen: Die Einwohnerzahl von Orenburg wird zu 20,000 angegeben. |
| — | 107 | — | 10 | v. unten statt Woskoboinikow l. Moskobrinikow.                                      |



- S. 108 Z. 22 v. oben statt Püpürow l. Pupurew.  
 — 109 — 9 v. oben statt Püpürow l. Pupurew.  
 — 114 — 17 v. oben statt östliche l. westliche.  
 — 131 — 10 v. oben statt Bauern l. Bürger.  
 — 152 — 7 v. unten statt Mais l. Junis.  
 — 156 — 8 v. oben statt ansteckt l. mittheilt.  
 — 160 — 3 v. unten statt innern Garde l. innern Wache.  
 — 168 — 15 v. oben statt Kromoly l. Karamali.



## Berichtigungen zum zweiten Bande.

---

|    |    |    |                                                         |
|----|----|----|---------------------------------------------------------|
| S. | 1  | Z. | 14 v. unten nach Sommers ist beizufügen: und Herbstes.  |
| —  | —  | —  | 11 v. unten statt sehr l. ziemlich.                     |
| —  | —  | —  | 1 v. unten nach Schirvan ist beizufügen: Imerethi.      |
| —  | 2  | —  | 7 v. oben statt Die l. Auch die.                        |
| —  | —  | —  | 8 v. oben nach blieben ist beizufügen: nicht ganz.      |
| —  | —  | —  | 13 v. oben nach Kursk ist beizufügen: Riaesan, Smolenk. |
| —  | —  | —  | 14 v. oben ist zu streichen Smolensk.                   |
| —  | —  | —  | 15 v. oben ist zu streichen Riaesan.                    |
| —  | 4  | —  | 2 v. oben statt leicht l. vielleicht.                   |
| —  | —  | —  | 2 v. unten statt gewesen l. gewesene.                   |
| —  | 26 | —  | 9 v. oben statt Statthalterschaft l. Statthalterschaft. |
| —  | 42 | —  | 9 v. unten statt Gamerilow l. Gawrilow.                 |
| —  | —  | —  | 7 v. unten statt Woskobrnikow l. Moskobrnikow.          |
| —  | 43 | —  | 1 v. oben statt Woskobrnikow l. Moskobrnikow.           |
| —  | 44 | —  | 1 v. oben statt nun l. um.                              |
| —  | 45 | —  | 7 v. unten statt kostbaren l. zur Reise gehörigen.      |
| —  | 46 | —  | 4 v. oben statt oberfläche l. oberflächliche.           |
| —  | 47 | —  | 1 v. oben statt abzuwehren l. abzuwehren.               |
| —  | 52 | —  | 6 v. unten statt Solomow l. Solomon.                    |
| —  | 54 | —  | 3 v. oben statt Solomow l. Solomon.                     |
| —  | —  | —  | 4 v. unten statt Solomow l. Solomon.                    |
| —  | 56 | —  | 2 v. unten statt Solomow l. Solomon.                    |
| —  | 57 | —  | 19 v. oben statt Solomow l. Solomon.                    |
| —  | 75 | —  | 11 v. oben nach Lieben ist beizufügen: starb.           |



S. 132 Z. 5 v. unten statt Woskobrinikow l. Moskobrini-  
kow.

— 134 — 1 v. unten ist beizufügen:

Bloss Sokolow spricht von Nachkrankheiten,  
als welche er aufführt: Schwäche der Verdau-  
ungsorgane und zuweilen des ganzen Körpers,  
wozu sich Fussgeschwulst, seltener aber allge-  
meine Wassersucht geselle, so wie ein hitziges  
Fieber mit Gefühllosigkeit, das, wenn es den  
Kranken nicht in den ersten Tagen tödte, ge-  
wöhnlich in ein schleichendes Nervenfieber über-  
gehe, welches bei zeitiger Anwendung geeigne-  
ter Mittel am häufigsten sich durch Metastasen  
besonders durch Geschwülste der Parotiden,  
endige.

— 140 — 13 v. oben und 10 v. unten statt Solomow l. Solo-  
mon.

— 141 — 2 v. oben statt Geneigheit l. Geneigtheit.

— 186 — 10 v. oben statt Woskobrinikow l. Moskobrini-  
kow.

— 205 — 11 v. unten statt haben l. heben.

— 231 — 6 v. unten statt hergeführt l. herbeigeführt.

— 235 — 13 v. oben statt diesen Stadien l. diesem Stadium.

— 236 — 5 v. oben statt Quintchen l. Quentchen.

— 237 — 9 v. oben nach von ist beizufügen: den.

— 242 — 11 v. unten statt Stellen l. Stelle.

— 270 — 9 v. oben statt Solomow l. Solomon.











Riecke, Victor Adolf,

Mittheilungen über die Morgenländische Brechruhr

Bd.: 2

Stuttgart (1831)

Path. 1050 h-1/2

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10474269-7